

Analisi I

Gianmarco Davini e Alessandro Alongi Gattone
Appunti di Analisi I

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Insiemi	5
1.1	Introduzione	5
1.1.1	Rappresentazione degli insiemi	5
1.1.2	Sottoinsiemi	6
1.1.3	Insieme vuoto	6
1.1.4	Rappresentazione per proprietà caratteristica	6
1.2	Quantificatori	7
1.3	Operazioni tra insiemi	8
1.3.1	Proprietà delle operazioni tra insiemi	8
1.3.2	Il prodotto cartesiano	8
1.4	Relazioni e ordinamenti	9
1.4.1	Relazione	9
1.4.2	Massimo e minimo	10
1.4.3	Maggiorante e Minorante	11
1.4.4	Estremo Superiore ed Estremo Inferiore	11
1.4.5	Insiemi completi	12
1.5	Insiemi numerici	12
1.5.1	Proprietà dei numeri Naturali	17
1.5.2	Insiemi separati e contigui	18
1.5.3	Cardinalità	19
1.5.4	Rappresentazione geometrica di $\mathbb{R}$	20
1.6	Principio di induzione	21
1.6.1	Media aritmetica e media geometrica	23
1.6.2	Coefficiente binomiale	26
1.6.3	Binomio di Newton	26
2	Funzioni	28
2.1	Funzioni astratte	28
2.1.1	Restrizione	29
2.1.2	Funzioni composte	29
2.1.3	Funzioni suriettive	29
2.1.4	Funzioni iniettive	29
2.1.5	Funzioni biettive	30
2.1.6	Identità	30
2.2	Funzioni Numeriche	31
2.2.1	Proprietà delle funzioni numeriche	31

2.2.2	Funzioni Pari e Dispari	32
2.2.3	Funzioni Limitate	32
2.2.4	Massimo e Minimo	34
2.2.5	Funzioni Monotone	35
2.3	Funzioni Elementari	36
2.3.1	Funzioni lineari (o affini)	36
2.3.2	Funzione valore assoluto	37
2.3.3	Funzione potenza (con esponente in $\mathbb{N}$)	37
2.3.4	Funzione radice n -esima	41
2.3.5	Funzione esponenziale	43
2.3.6	Funzione Logaritmica	44
2.4	Funzioni Trigonometriche Elementari	45
2.4.1	Funzioni Seno e Coseno	46
2.4.2	Funzione Tangente	47
2.4.3	Funzioni Trigonometriche Inverse	48
2.4.4	Funzioni Iperboliche	49
2.4.5	Trasformazioni del Grafico di Funzioni	50
3	Numeri Complessi	53
3.1	Il campo dei numeri complessi	53
3.2	Forma algebrica	54
3.2.1	Operazioni	54
3.3	Piano complesso	55
3.3.1	Modulo	56
3.4	Forma trigonometrica	56
3.5	Potenze	58
3.6	Formula di De Moivre	58
3.7	Forma esponenziale	59
3.8	Radice n -esima	59
4	Successioni Numeriche	61
4.1	Limiti di successioni	63
4.1.1	Esempi di Limiti di successioni	64
4.1.2	Successioni Convergenti o Infinitesime	65
4.1.3	Successioni Divergenti	66
4.1.4	Successioni regolari o irregolari	66
4.2	Definizione di Intorno	67
4.3	Teorema di Unicit� del Limite	67
4.4	Propriet� delle successioni numeriche	69
4.5	Successioni Monotone	70
4.5.1	Propriet� definitivamente vera	72
4.6	Algebra dei Limiti	73
4.6.1	Limiti Fondamentali	73
4.6.2	Propriet� (Limiti Finiti)	73
4.6.3	Algebra dei limiti in $\overline{\mathbb{R}}$	75
4.6.4	Forme indeterminate	76
4.6.5	Esempi finali	76

4.6.6	Quoziente (in $\overline{\mathbb{R}}$)	77
4.6.7	Nuova forma indeterminata	78
4.6.8	Esponenziale	79
4.6.9	Forma generale degli esponenziali	79
4.6.10	Nuove F.I.	79
4.7	Teorema della permanenza del segno (t.p.s)	80
4.8	Teorema del confronto (Teorema dei carabinieri)	81
4.9	Continuità di Seno e Coseno	83
4.10	Limiti Notevoli Derivati	84
4.10.1	Esempi	86
4.11	Teorema sul numero di Nepero	87
4.11.1	Limite Notevole di e	89
4.12	Confronto di infiniti con i rapporti	91
4.12.1	Confronto tra Medie di Successioni	91
4.12.2	Teorema di Cesaro sulle medie Geometriche	93
4.12.3	Teorema Gerarchia degli Infiniti	95
4.13	Successioni estratte	96
4.13.1	Teorema di Bolzano Weierstrass	98
4.13.2	Teorema Criterio di Cauchy	101
5	Limiti di funzioni	102
5.1	Definizioni	102
5.1.1	Intorni	102
5.1.2	Punti d'accumulazione	102
5.1.3	Teorema di Bolzano	103
5.1.4	Insiemi Aperti, Chiusi e Compatti	104
5.1.5	Teorema di Heine-Borel	105
5.2	Teoria dei Limiti	105
5.2.1	Definizione di Limite	105
5.2.2	Limite Destro e Sinistro	111
5.3	Continuità	111
5.3.1	Funzioni Continue	111
5.3.2	Funzioni Discontinue	113
5.4	Limiti Notevoli	115
5.5	Teoremi Globali e Continuità Uniforme	117
5.5.1	Teorema di Weierstrass	117
5.5.2	Teorema di Esistenza degli Zeri	118
5.5.3	Teorema dei Valori Intermedi	120
5.5.4	Monotonia e Invertibilità	120
5.5.5	Continuità Uniforme	121
5.5.6	Lipschitziana	123
5.6	Asintoti	123
5.6.1	Asintoti Verticali	123
5.6.2	Asintoti Orizzontali	124
5.6.3	Asintoti Obliqui	125
6	Calcolo Differenziale	127

6.1	Rapporto Incrementale e Derivata	127
6.1.1	Definizione di Derivata	128
6.1.2	Derivata Destra e Sinistra	128
6.2	Derivate delle Funzioni Elementari	129
6.3	Algebra delle Derivate	132
6.4	Teoremi Fondamentali del Calcolo	133
6.4.1	Derivate delle Funzioni Inverse Trigonometriche	134
6.5	Punti di non derivabilità	135

Capitolo 1

Insiemi

1.1 Introduzione

Definizione 1.1.1: Insieme

La definizione di insieme risale a Cantor (1845-1918): Un **insieme** è una collezione di oggetti determinati e distinti, detti **elementi** dell'insieme.

Dobbiamo sempre essere in grado di determinare l'appartenenza di un elemento all'insieme. Gli insiemi si indicano con lettere maiuscole mentre gli elementi di un insieme si indicano con lettere minuscole.

Esempio.

$C = \{1, 1, 1, 2, 2, 3, 3\} \leftarrow$ Non è un insieme

$C = \{1, 2, 3\} \leftarrow$ Gli elementi di un insieme sono distinti

L'appartenenza e la non appartenenza di un elemento ad un insieme si indicano in questo modo:

$a \in A \leftarrow$ l'elemento a appartiene all'insieme A

$a \notin A \leftarrow$ l'elemento a NON appartiene all'insieme A

1.1.1 Rappresentazione degli insiemi

Esistono 3 modi diversi per rappresentare un insieme:

1. **Per elencazione:** $C = \{1, 2, 3\}$
2. **Tramite proprietà caratteristica:** $C = \{x \mid x \text{ è un numero primo}\}$
3. **Tramite diagramma di Eulero-Venn**

1.1.2 Sottoinsiemi

Dati due insiemi C ed E , se tutti gli elementi di E sono contenuti anche in C , si dice che E è un sottoinsieme di C . Esistono due tipi di sottoinsiemi:

- **Sottoinsiemi propri:** si indicano con il simbolo $\subset$. Se E è contenuto in C ma E è diverso da C , allora E è un sottoinsieme proprio di C : $E \subset C$
- **Sottoinsiemi impropri:** si indicano con il simbolo $\subseteq$. Se E è contenuto in C e E contiene esattamente gli stessi elementi di C , allora E è un sottoinsieme improprio di C : $E \subseteq C$
- Per indicare che un insieme non è contenuto in un altro insieme si utilizza il simbolo $\not\subset$

1.1.3 Insieme vuoto

L'**insieme vuoto** si indica con il simbolo $\emptyset$ ed è, per definizione, contenuto in tutti gli insiemi.

1.1.4 Rappresentazione per proprietà caratteristica

Definizione 1.1.2: Proprietà

Una **proprietà** è un'espressione a cui deve essere sempre possibile attribuire un valore di verità (vero o falso). Si indicano con le lettere greche per non confonderle con gli elementi degli insiemi.

Esempi di proprietà

"Gli n appartenenti ad $\mathbb{N}$ tale che n è un numero pari" $\leftarrow$ Ovvero tale che n renda vera la proprietà α (essere un numero pari):

$$A = \{n \in \mathbb{N} \mid \alpha\}$$

Possiamo definire questo insieme senza ricorrere ad α utilizzando la simbologia matematica:

$$A = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$$

Riconoscimento di sottoinsiemi tramite proprietà

Come riconoscere se un insieme è sottoinsieme di un altro se entrambi sono definiti per proprietà?

- β = essere multiplo di 4
- α = essere multiplo di 2
- γ = essere pari

Definiti gli insiemi:

- $A = \{n \in \mathbb{N} \mid \beta\}$

- $B = \{n \in \mathbb{N} \mid \alpha\}$
- $C = \{n \in \mathbb{N} \mid \gamma\}$

Possiamo dire che la proprietà β implica α e si scrive in questo modo:

$$\beta \Rightarrow \alpha$$

(Se è vera β è vera anche α) Questo significa che $A \subset B$, poiché ogni multiplo di 4 è anche multiplo di 2.

1.2 Quantificatori

Definizione 1.2.1: Quantificatori

I **quantificatori** trasformano gli enunciati aperti in proposizioni che possono assumere il valore di vero o falso.

Esistono due tipi di quantificatori:

- **Quantificatore esistenziale:**
 - Si indica con il simbolo $\exists$
 - Indica l'esistenza di almeno un elemento dell'insieme che gode di una particolare proprietà
 - Il simbolo $\exists!$ indica l'esistenza di uno ed un solo elemento dell'insieme che gode di una particolare proprietà
- **Quantificatore universale:**
 - Si indica con il simbolo $\forall$
 - Indica che tutti gli elementi di un insieme godono della medesima proprietà

Riprendiamo le proprietà descritte in precedenza:

- β = essere multiplo di 4
- α = essere multiplo di 2
- γ = essere pari

Definiti gli insiemi:

$$A = \{n \in \mathbb{N} \mid \alpha\}$$

$$B = \{n \in \mathbb{N} \mid \beta\}$$

Possiamo dire che:

- $\exists n \in A : n \in B \leftarrow$ Esiste almeno un numero multiplo di due che è anche multiplo di 4
- $\forall n \in B \Rightarrow n \in A \leftarrow$ Ogni multiplo di 4 è anche multiplo di 2
- $\nexists n \in B : n \notin A \leftarrow$ Non esiste multiplo di 4 che non sia anche multiplo di 2

1.3 Operazioni tra insiemi

Sia M un insieme universo e definiamo gli insiemi $A, B \subseteq M$. Possiamo definire le seguenti operazioni sugli insiemi:

Unione

Si indica con $A \cup B = \{x \in M \mid x \in A \vee x \in B\}$.

Intersezione

Si indica con $A \cap B = \{x \in M \mid x \in A \wedge x \in B\}$. Se $A \cap B = \emptyset$ allora A e B sono **disgiunti** (non hanno elementi in comune).

Complemento (Differenza)

Si indica con $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$.

Complementare

Si indica con $\overline{A} = M \setminus A = \{x \in M \mid x \notin A\}$.

1.3.1 Proprietà delle operazioni tra insiemi

Commutatività di Unione e Intersezione

- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cap B = B \cap A$

Associatività di Unione e Intersezione

- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) = A \cup B \cup C$
- $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C$

Distributività

- **Dell'unione rispetto all'intersezione:**

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

- **Dell'intersezione rispetto all'unione:**

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

1.3.2 Il prodotto cartesiano

Un insieme è un aggregato caotico di elementi. Non c'è rilevanza sull'ordine degli elementi. Per introdurre l'ordine dobbiamo ricorrere al prodotto cartesiano.

Definizione 1.3.1: Coppia Ordinata

Siano $A, B \neq \emptyset$, si chiama **coppia ordinata** di prima componente $a \in A$ e seconda componente $b \in B$ il seguente oggetto: $(a, b) \neq (b, a)$.

Definizione 1.3.2: Prodotto Cartesiano

Si definisce **prodotto cartesiano** di $A \times B$ l'insieme di tutte le possibili coppie $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$.

Esempio.

Poniamo $A = \{a, b\}$ e $B = \{c, d\}$:

$A \times B = \{(a, c), (a, d), (b, c), (b, d)\} \leftarrow$ Tutte le coppie con prima componente in A

$B \times A = \{(c, a), (c, b), (d, a), (d, b)\} \leftarrow$ Tutte le coppie con prima componente in B

Ne consegue che il prodotto cartesiano non è commutativo, difatti $A \times B \neq B \times A$.
Il prodotto cartesiano $A \times A$ si indica con A^2 .

1.4 Relazioni e ordinamenti**1.4.1 Relazione****Definizione 1.4.1: Relazione**

Siano $A, B \neq \emptyset$. Si chiama **relazione** e si indica con $\mathcal{R}$ una proprietà definita sul prodotto cartesiano $A \times B$. Per una coppia di elementi (a, b) posso stabilire se $\mathcal{R}$ assume valore vero o falso. Ci sarà quindi un sottoinsieme di $A \times B$ contenente le coppie che soddisfano la relazione.

Per dire che una coppia (a, b) verifica la relazione $\mathcal{R}$, scriveremo $a\mathcal{R}b$ (a è in relazione con b). La relazione $\mathcal{R}$ su A^2 si dice **binaria**. Una relazione binaria è quindi definita su un unico insieme A . Formalmente: $\mathcal{R} \subseteq A \times A$.

Sulle relazioni binarie è possibile definire alcune proprietà.

Proprietà delle Relazioni Binarie

Sia $A \neq \emptyset$ e $\mathcal{R}$ una relazione binaria su A^2 (cioè $A \times A$). Allora valgono le seguenti definizioni:

- $\mathcal{R}$ si dice **riflessiva** se e solo se $\forall x \in A, x\mathcal{R}x$. **Esempio:**

Sull'insieme $A = \{1, 2, 3\}$, la relazione " $\leq$ " è riflessiva perché $1 \leq 1, 2 \leq 2, 3 \leq 3$.

- $\mathcal{R}$ si dice **simmetrica** se e solo se $\forall x, y \in A, x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x$. **Esempio:**

Sull'insieme $\mathbb{Z}$ dei numeri interi, la relazione "è congruo modulo 2 a" (ovvero " $x \equiv y \pmod{2}$ ") è simmetrica: se $3 \equiv 5 \pmod{2}$, allora $5 \equiv 3 \pmod{2}$.

- $\mathcal{R}$ si dice **transitiva** se e solo se $\forall x, y, z \in A, x\mathcal{R}y \text{ e } y\mathcal{R}z \implies x\mathcal{R}z$. **Esempio:**

Sull'insieme dei numeri, la relazione " $\leq$ " è transitiva: se $1 \leq 2$ e $2 \leq 3$, allora $1 \leq 3$.

- $\mathcal{R}$ si dice **antisimmetrica** se e solo se $\forall x, y \in A, x\mathcal{R}y \text{ e } y\mathcal{R}x \implies x = y$. **Esempio:**

La relazione " $\leq$ " sui numeri naturali è antisimmetrica: se $x \leq y$ e $y \leq x$, allora necessariamente $x = y$.

Definizione 1.4.2: Relazione d'Ordine

Una relazione $\mathcal{R}$ su A^2 si dice **relazione d'ordine** se è:

- Riflessiva
- Transitiva
- Antisimmetrica

In questo caso si indica con il simbolo $\leq$.

Definizione 1.4.3: Relazione di Equivalenza

Una relazione $\mathcal{R}$ su A^2 si dice **relazione di equivalenza** se è:

- Riflessiva
- Transitiva
- Simmetrica

Si indica con il simbolo $\sim$.

1.4.2 Massimo e minimo

Sia M un insieme non vuoto ($M \neq \emptyset$) su cui sia definita la relazione $\leq$. Sia $A \subseteq M$, $A \neq \emptyset$. $\underline{m} \in A$ si dice **MINIMO** di A se $\underline{m} \leq a \forall a \in A$. Analogamente, $\overline{m} \in A$ si dice **MASSIMO** di A se $a \leq \overline{m}, \forall a \in A$.

Non è detto che esistano ($\exists$), ma se esistono, sono unici. Si denotano come segue:

$$\min A \in A \quad \text{e} \quad \max A \in A$$

Dimostrazione. Procediamo per assurdo, supponendo che il minimo $\underline{m}$ (che esiste per ipotesi) **non sia unico**:

1. Sia $\underline{a} \in A$ un altro candidato minimo
2. Per definizione di minimo: $\underline{a} \leq a, \forall a \in A$
3. In particolare: $\underline{a} \leq \underline{m}$
4. Ma essendo $\underline{m}$ minimo: $\underline{m} \leq \underline{a}$

5. Essendo la relazione $\leq$ **antisimmetrica**, segue che $\underline{a} = \underline{m} \rightarrow$ Dimostrata l'unicità del minimo

Dimostrazione dell'unicità del massimo

Procediamo per assurdo, supponendo che il massimo $\overline{m}$ (che esiste per ipotesi) **non sia unico**:

1. Sia $\overline{a} \in A$ un altro candidato massimo
2. Per definizione di massimo: $a \leq \overline{a}, \forall a \in A$
3. In particolare: $\overline{m} \leq \overline{a}$
4. Ma essendo $\overline{m}$ massimo: $\overline{a} \leq \overline{m}$
5. Essendo la relazione $\leq$ **antisimmetrica**, segue che $\overline{a} = \overline{m} \rightarrow$ Dimostrata l'unicità del massimo

□

1.4.3 Maggiorante e Minorante

Sia M un insieme ordinato dove è definita la relazione d'ordine $\leq$, sia $A \subseteq M$, $A \neq \emptyset$: $\underline{x} \in M$ si dice **minorante** di A se $\underline{x} \leq a \forall a \in A$, esempio:

- Nell'intervallo $] -1, 2]$ il minorante è -1 , mentre 2 è il massimo

Analogamente, $\overline{x} \in M$ si dice **maggiorante** di A se $a \leq \overline{x} \forall a \in A$

Osservazione: Maggiorante e minorante, se esistono, non è detto che siano unici.

Definizione 1.4.4: Insieme Limitato

$A \subseteq M$ si dice:

- **Inferiormente limitato** se ammette minoranti.
- **Superiormente limitato** se ammette maggioranti.
- **Limitato** se è sia inferiormente che superiormente limitato.

1.4.4 Estremo Superiore ed Estremo Inferiore

Definizione 1.4.5: Estremo Inferiore e Superiore

Sia $A \subseteq M$, $A \neq \emptyset$, con A **inferiormente limitato** (cioè esiste almeno un minorante). Se l'insieme dei minoranti ammette massimo, esso si chiama $\inf A$ (**estremo inferiore** di A). Analogamente, se A è **superiormente limitato** e l'insieme dei maggioranti ammette minimo, esso si chiama $\sup A$ (**estremo superiore** di A).

Se esistono $\min A$ e $\max A$, allora si ha:

$$\min A = \inf A \quad \text{e} \quad \max A = \sup A$$

Questo implica:

- Se $\max A$ esiste, allora $\sup A = \max A$ e A è superiormente limitato.
- Se $\min A$ esiste, allora $\inf A = \min A$ e A è inferiormente limitato.

1.4.5 Insiemi completi

Definizione 1.4.6: Insieme Completo

Sia M un insieme ordinato. M si dice **completo** se ogni suo sottoinsieme non vuoto e superiormente limitato ammette $\sup$. In maniera equivalente, M è completo se ogni sottoinsieme non vuoto e inferiormente limitato ammette $\inf$.

1.5 Insiemi numerici

Per introdurre gli insiemi numerici si possono seguire due approcci:

- partire da $\mathbb{N}$ e costruire progressivamente $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$;
- partire da $\mathbb{R}$ come corpo ordinato completo e definire a posteriori $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ come suoi sottoinsiemi.

Partendo da $\mathbb{N}$

Si postula l'esistenza dell'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali, su cui sono definite due operazioni fondamentali: l'addizione e la moltiplicazione.

Definizione 1.5.1: Operazione

Si chiama *operazione* una funzione

$$\sigma : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad (n, m) \mapsto n \sigma m.$$

Le operazioni di base che assumiamo in $\mathbb{N}$ sono

$$(\mathbb{N}, +, \cdot).$$

La sottrazione e la divisione non sono sempre definite in $\mathbb{N}$; per introdurle occorre ampliare l'insieme.

- Estendendo $\mathbb{N}$ si ottiene l'insieme degli interi:

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N}_0 \cup (-\mathbb{N}),$$

in cui sono ben definite le operazioni $+$ e $-$. - Per permettere la divisione si introduce l'insieme dei razionali:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\}.$$

Tuttavia $\mathbb{Q}$ non è ancora sufficiente: ad esempio $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Proposizione 1.5.2

Non esiste alcun $c \in \mathbb{Q}$ tale che $c^2 = 2$.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che $c = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{N}$ primi tra loro e $c^2 = 2$. Allora $p^2 = 2q^2$, quindi p^2 è pari $\implies p$ è pari. Scriviamo $p = 2k$:

$$p^2 = 4k^2 = 2q^2 \implies q^2 = 2k^2,$$

quindi anche q è pari. Ma se p e q sono entrambi pari, non possono essere primi tra loro. Contraddizione. $\square$

Segue che $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, e quindi è necessario introdurre l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$.

Costruzione dei numeri reali

Si postula l'esistenza di un insieme $\mathbb{R}$ che soddisfa una lista di assiomi. Gli assiomi si dividono in tre categorie:

- A) assiomi relativi alle operazioni $(+, \cdot)$;
- B) assiomi relativi all'ordinamento;
- C) assioma di completezza.

Un insieme con queste proprietà è detto *corpo ordinato completo* e, a meno di isomorfismo, è unico: lo identifichiamo con $\mathbb{R}$.

Assiomi relativi alle operazioni

In $\mathbb{R}$ sono definite due operazioni:

- Somma $+: (a, b) \in \mathbb{R}^2 \mapsto a + b \in \mathbb{R}$
- Prodotto $\cdot: (a, b) \in \mathbb{R}^2 \mapsto a \cdot b \in \mathbb{R}$

Queste operazioni verificano le seguenti proprietà:

a1 Proprietà commutativa

$$a + b = b + a \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$a \cdot b = b \cdot a \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

a2 Proprietà associativa

$$a + (b + c) = (a + b) + c \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

a3 Proprietà distributiva

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

a4 Esistenza degli elementi neutri

$$\exists 0 \in \mathbb{R} \text{ tale che } a + 0 = a \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

$$\exists 1 \in \mathbb{R} \text{ tale che } a \cdot 1 = a \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

a5 Esistenza degli opposti e degli inversi

$$\forall a \in \mathbb{R}, \exists (-a) \in \mathbb{R} \text{ tale che } a + (-a) = 0$$

$$\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \exists a^{-1} \in \mathbb{R} \text{ tale che } a \cdot a^{-1} = 1$$

Al momento, la struttura $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ forma un campo.

Osservazione. Alcune conseguenze degli assiomi relativi alle operazioni: possiamo definire due nuove operazioni come derivate da $+$ e $\cdot$:

- Sottrazione $a - b := a + (-b) \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$
- Divisione $a : b := a \cdot b^{-1} \quad \forall a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Proposizione 1.5.3

Per ogni $a \in \mathbb{R}$ vale

$$a \cdot 0 = 0.$$

Dimostrazione. Sia $x \in \mathbb{R}$. Per la proprietà dell'elemento neutro additivo (a4) abbiamo

$$x \cdot 0 = x \cdot (0 + 0).$$

Per la distributività (a3):

$$x \cdot (0 + 0) = x \cdot 0 + x \cdot 0.$$

Sottraiamo $x \cdot 0$ da entrambi i membri (per l'esistenza dell'opposto, a5):

$$x \cdot 0 = x \cdot 0 + x \cdot 0 \implies 0 = x \cdot 0.$$

Quindi $a \cdot 0 = 0$ per ogni $a \in \mathbb{R}$. □

Assiomi relativi all'ordinamento

Si assume che in $\mathbb{R}$ esista una relazione d'ordine $\leq$, cioè una relazione d'ordine riflessiva, antisimmetrica, transitiva e totale. In altre parole, per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ vale $a \leq b$ oppure $b \leq a$.

Questa relazione è definita su $\mathbb{R}$ e verifica i seguenti assiomi:

b1 Compatibilità rispetto alla somma:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a \leq b \implies a + c \leq b + c.$$

b2 Compatibilità rispetto al prodotto:

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall c \in \mathbb{R}, a \leq b \wedge 0 \leq c \implies a \cdot c \leq b \cdot c.$$

L'oggetto $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$ prende il nome di *campo ordinato*.

Altre importanti conseguenze

Le altre due conseguenze fondamentali legate al fatto che abbiamo una relazione d'ordine totale sono le seguenti proprietà:

Proposizione 1.5.4

Caratterizzazione di sup e inf

1. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ con $A \neq \emptyset$. Allora $C \in \mathbb{R}$ è il supremo di A ($C = \sup A$) se e solo se valgono le seguenti proprietà:
 - (a) $\forall a \in A, a \leq C$
 - (b) $\forall \epsilon > 0, \exists a_\epsilon \in A \mid C - \epsilon < a_\epsilon$
2. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ con $A \neq \emptyset$. Allora $c \in \mathbb{R}$ è l'infimo di A ($c = \inf A$) se e solo se valgono le seguenti proprietà:
 - (a) $\forall a \in A, c \leq a$
 - (b) $\forall \epsilon > 0, \exists a_\epsilon \in A \mid a_\epsilon < c + \epsilon$

Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare la doppia implicazione. Per definizione di sup (??) la 1 è ovvia (dato che sup è il minimo dei maggioranti).

Dimostrazione $\implies$:

Per dimostrare la 2, prendiamo $\epsilon > 0$ arbitrario e consideriamo $C - \epsilon \in \mathbb{R}$. È chiaro che $C - \epsilon < C$, dato che la relazione d'ordine è totale.

Poiché C è il minimo dei maggioranti, $C - \epsilon$ non può essere un maggiorante di A . Dunque $\exists a_\epsilon \in A$ tale che $C - \epsilon < a_\epsilon \leq C$. Attenzione però: questo non significa che a_ϵ sia un maggiorante, ma solo che “si avvicina” a C dal basso.

Dimostrazione $\longleftarrow$:

Dimostriamo che se $C \in \mathbb{R}$ verifica la 1 e la 2, allora C è il sup di A , cioè:

1. C è un maggiorante di A ,
2. C è il minimo dei maggioranti.

Come prima, la 1 è ovvia. Dimostriamo la 2 per assurdo.

Supponiamo che esista $C' < C$ che sia un maggiorante di A . Allora $C' = C - \epsilon$ con $\epsilon > 0$. Ma per la condizione 2 sappiamo che $\exists a_\epsilon \in A$ tale che $C - \epsilon < a_\epsilon$, cioè $C' < a_\epsilon$. Questo contraddice il fatto che C' sia un maggiorante di A .

Quindi C è il minimo dei maggioranti, cioè $C = \sup A$. □

Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare l'analogo per l'inf. Per definizione di inf la 1 è ovvia (dato che inf è il massimo dei minoranti).

Dimostrazione $\implies$:

Sia $C = \inf A$. Per mostrare la 2 prendiamo $\epsilon > 0$ arbitrario e consideriamo $C + \epsilon \in \mathbb{R}$. È chiaro che $C < C + \epsilon$.

Poiché C è il massimo dei minoranti, $C + \epsilon$ non può essere un minorante di A . Dunque $\exists a_\epsilon \in A$ tale che $C \leq a_\epsilon < C + \epsilon$. Attenzione: questo non significa che a_ϵ sia un minorante, ma solo che “si avvicina” a C dall'alto.

Dimostrazione $\Leftarrow$:

Dimostriamo che se $C \in \mathbb{R}$ verifica la 1 e la 2, allora C è l'inf di A , cioè:

1. C è un minorante di A ,
2. C è il massimo dei minoranti.

La 1 è ovvia. Dimostriamo la 2 per assurdo. Supponiamo che esista $C' > C$ che sia un minorante di A . Allora $C' = C + \epsilon$ con $\epsilon > 0$. Ma per la condizione 2 sappiamo che $\exists a_\epsilon \in A$ tale che $a_\epsilon < C + \epsilon = C'$, con $a_\epsilon \geq C$. Quindi $a_\epsilon \not\geq C'$, contraddicendo il fatto che C' fosse un minorante.

Quindi C è il massimo dei minoranti, cioè $C = \inf A$. □

Assioma di completezza

Per $\mathbb{R}$ vale il seguente assioma:

Fatto 1.5.5

$\mathbb{R}$ è un insieme completo: ogni $A \subseteq \mathbb{R}$ superiormente limitato ammette estremo superiore $\iff$ ogni $A \subseteq \mathbb{R}$ inferiormente limitato ammette estremo inferiore (??).

Denotiamo con $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq, \text{Assioma di completezza})$ il campo dei numeri reali.

Costruiamo i sottoinsiemi numerici:

- $\mathbb{N}$: insieme dei numeri naturali, il più piccolo sottoinsieme di $\mathbb{R}$ che contiene l'unità e il successivo di ogni suo elemento:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n + 1 \in \mathbb{N}.$$

- $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$.
- $\mathbb{Z} = \mathbb{N}_0 \cup (-\mathbb{N})$.
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{n}{m} \mid n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\}$.

Si ha la catena di inclusioni:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{N}_0 \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

Proposizione 1.5.6

L'insieme $\mathbb{Q}$ non è completo; ne consegue che $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ (inclusione propria), ovvero $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \neq \emptyset$.

Dimostrazione. Questa è una dimostrazione costruttiva, ovvero ci darà altre informazioni oltre a verificare la tesi. Per dimostrare che $\mathbb{Q}$ non soddisfa l'assioma di completezza, basta costruire un controesempio:

Voglio costruire un insieme superiormente limitato dove il sup è uguale a $\sqrt{2}$

Consideriamo l'insieme

$$A = \{r \in \mathbb{Q} \mid r > 0, r^2 \leq 2\}.$$

A è limitato superiormente, sia visto come sottoinsieme di $\mathbb{Q}$ che di $\mathbb{R}$.

In $\mathbb{R}$, per l'assioma di completezza, esiste $c = \sup A$. È facile vedere che $c = \sqrt{2}$. Poiché $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, concludiamo già che $\sup A \notin \mathbb{Q}$.

Ora analizziamo i maggioranti di A in $\mathbb{Q}$:

$$B = \{p \in \mathbb{Q} \mid p > 0, p^2 > 2\}.$$

B è l'insieme dei maggioranti razionali di A . Dimostriamo che B non ha minimo.

Dato un qualsiasi $p \in B$, costruiamo

$$q = p - \frac{p^2 - 2}{p + 2}.$$

Ovvero un elemento più piccolo di p .

Allora:

- $q < p$;
- $q \in \mathbb{Q}$ (perché è ottenuto da operazioni razionali su p);
- $q^2 - 2 = \frac{2(p^2 - 2)}{(p + 2)^2} > 0 \implies q^2 > 2$.

Quindi $q \in B$ ed è più piccolo di p . Dunque B non ammette minimo.

Conclusione: l'insieme $A \subseteq \mathbb{Q}$ è superiormente limitato ma non ha sup in $\mathbb{Q}$. Quindi $\mathbb{Q}$ non è completo, mentre in $\mathbb{R}$ lo stesso insieme ha estremo superiore $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. $\square$

1.5.1 Proprietà dei numeri Naturali**Proposizione 1.5.7**

$\mathbb{N}$ non è superiormente limitato.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che $\mathbb{N}$ sia superiormente limitato. Allora, essendo $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$, per l'assioma di completezza esiste $c = \sup \mathbb{N}$.

Per le proprietà del $\sup$, preso $\varepsilon = 1$, esiste $S \in \mathbb{N}$ tale che

$$c - 1 < S \leq c.$$

Ma allora $S + 1 \in \mathbb{N}$ e vale $S + 1 > c$, in contraddizione con il fatto che c sia un maggiorante.

Dunque $\mathbb{N}$ non è superiormente limitato. $\square$

Corollario 1.5.8

Poiché $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$, anche $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ non sono superiormente limitati.

Se $A \subseteq \mathbb{R}$ non è superiormente limitato, poniamo $\sup A = +\infty$. Analogamente, se A non è inferiormente limitato, poniamo $\inf A = -\infty$.

*L'insieme $\mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ si chiama **reale esteso**.*

Proposizione 1.5.9

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. Allora

$$\sup A = +\infty \iff \forall k > 0, \exists a_k \in A \text{ tale che } a_k > k.$$

Proposizione 1.5.10

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. Allora

$$\inf A = -\infty \iff \forall k > 0, \exists a_k \in A \text{ tale che } a_k < -k.$$

1.5.2 Insiemi separati e contigui

Per completare il discorso su $\inf$ e $\sup$, introduciamo due definizioni fondamentali.

Definizione 1.5.11: Insiemi separati

Siano $A, B \subseteq \mathbb{R}$, $A, B \neq \emptyset$. Diremo che A e B sono **separati** se

$$\forall a \in A, \forall b \in B \implies a \leq b.$$

Definizione 1.5.12: Insiemi contigui

Diremo che A e B sono **contigui** se sono separati e, in più, per ogni $\varepsilon > 0$ esistono $a_\varepsilon \in A$, $b_\varepsilon \in B$ tali che


$$b_\varepsilon - a_\varepsilon < \varepsilon.$$

Esempio con i seguenti intervalli:

- $]1, 2[$
- $]2, 3[$

- $]3, 4[$

Gli intervalli $]1, 2[$ e $]3, 4[$ sono separati, mentre $]2, 3[$ è contiguo sia a $]1, 2[$ che a $]3, 4[$.



Possiamo quindi dire che due insiemi sono contigui quando il sup del primo coincide con l'inf del secondo.

Teorema 1.5.13: Elemento di separazione

Siano $A, B \subseteq \mathbb{R}$, $A, B \neq \emptyset$. Allora A e B sono contigui $\iff \sup A = \inf B = c$. Tale c si dice **elemento di separazione**.

Dimostrazione. $\implies$:

Se A e B sono contigui, allora sono anche separati. Quindi A è superiormente limitato da ogni $b \in B$ e B è inferiormente limitato da ogni $a \in A$. Per completezza di $\mathbb{R}$ esistono $\sup A = c$ e $\inf B = c'$. Per definizione di contiguità: per ogni $\varepsilon > 0$ esistono $a_\varepsilon \in A$, $b_\varepsilon \in B$ con $b_\varepsilon - a_\varepsilon < \varepsilon$. Ma allora $0 \leq c' - c \leq b_\varepsilon - a_\varepsilon < \varepsilon$. Poiché ε è arbitrario, segue $c = c'$.

$\impliedby$:

Viceversa, se $\sup A = \inf B = c$, allora per ogni $\varepsilon > 0$:

$$\exists a_\varepsilon \in A : c - \frac{\varepsilon}{2} < a_\varepsilon \leq c, \quad \exists b_\varepsilon \in B : c \leq b_\varepsilon < c + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Dunque

$$0 \leq b_\varepsilon - a_\varepsilon < \varepsilon.$$

Quindi A e B sono contigui. □

1.5.3 Cardinalità

Definizione 1.5.14: Equipotenza

Due insiemi A e B si dicono **equipotenti** se esiste una biiezione $f : A \rightarrow B$ (cioè f è iniettiva e suriettiva).

Definizione 1.5.15: Insieme finito

Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice **finito** se esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che A è equipotente all'insieme $\{1, 2, \dots, n\}$. In tal caso n si dice **cardinalità** di A .

Definizione 1.5.16: Insieme infinito e numerabile

Un insieme A si dice **infinito** se è equipotente ad una sua parte propria. Ad esempio, $\mathbb{N}$ è infinito: infatti è equipotente all'insieme $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$ tramite la funzione $f(n) = 2n$.

La cardinalità di $\mathbb{N}$ si chiama **numerabile**.

*L'insieme $\mathbb{R}$ non è numerabile. Più precisamente, l'intervallo $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ non è numerabile (dimostrazione di Cantor). La cardinalità di $\mathbb{R}$ si dice **potenza del continuo**.*

Proposizione 1.5.17

Per ogni $x > 0$ e $y \in \mathbb{R}$ esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $nx > y$. Equivalentemente, per ogni $y > 0$ esiste $n \in \mathbb{N}$ con $1/n < y$.

Definizione 1.5.18: Densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$

Dati $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, esiste $r \in \mathbb{Q}$ tale che $a < r < b$.

L'insieme $\mathbb{N}$ non ha la proprietà di densità: ad esempio tra 1 e 2 non ci sono infiniti naturali, mentre tra due reali ci sono sempre infiniti razionali.

Dimostrazione.

□

1.5.4 Rappresentazione geometrica di $\mathbb{R}$

In $\mathbb{R}$ ci sono sottoinsiemi particolarmente importanti chiamati **intervalli**. Essi rappresentano insiemi di numeri compresi tra due estremi, eventualmente inclusi o esclusi.

Intervalli limitati

- $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ (aperto)
- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ (chiuso)
- $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ (semiaperto a sinistra)
- $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ (semiaperto a destra)

Intervalli illimitati

- $]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$ (aperto a sinistra, illimitato a destra)
- $[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$ (chiuso a sinistra, illimitato a destra)
- $] - \infty, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$ (illimitato a sinistra, aperto a destra)
- $] - \infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$ (illimitato a sinistra, chiuso a destra)
- $] - \infty, +\infty[= \mathbb{R}$ (illimitato su entrambi i lati)

1.6 Principio di induzione

Se volessi dimostrare:

- formule su $n!$,
- proprietà su x^n ,
- monotonia: $0 < x_1 < x_2 \implies x_1^n < x_2^n$,

è complicato dimostrare una proposizione per infiniti casi. Abbiamo bisogno del principio di induzione per dimostrare affermazioni che dipendono dagli indici naturali.

Ci sono due variazioni, vedremo la versione classica.

Sia $I \subseteq \mathbb{N}$ che verifica le seguenti proprietà:

1. $1 \in I$ (base di induzione);
2. se $n \in I \implies n + 1 \in I$, allora $I = \mathbb{N}$ (principio di induzione).

Proposizione 1.6.1

Progressione aritmetica

Per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

cioè

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Proposizione 1.6.2

Potenza n-esima

Per ogni $n \in \mathbb{N}$ e $x \in \mathbb{R}$ si definisce x^n come:

- $x^1 = x$,
- $x^n = x \cdot x^{n-1}$ per $n > 1$.

Proposizione 1.6.3

Progressione geometrica

Per ogni $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 1$, si ha

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x},$$

cioè

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

Dimostrazione. Vogliamo dimostrare che per ogni $n \in \mathbb{N}$ e $x \in \mathbb{R}$ con $x \neq 1$ si ha

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

Base di induzione: per $n = 0$ vale

$$1 = \frac{1 - x^{0+1}}{1 - x} = \frac{1 - x}{1 - x} = 1.$$

Quindi la formula è verificata per $n = 0$.

Passo induttivo: supponiamo che la formula sia vera per un certo $n \geq 0$, cioè

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

Dimostriamo che vale anche per $n + 1$:

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n + x^{n+1} = \left(\frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \right) + x^{n+1}.$$

Portando tutto allo stesso denominatore:

$$\frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} + x^{n+1} = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} + \frac{x^{n+1}(1 - x)}{1 - x}.$$

Sviluppiamo il numeratore:

$$= \frac{1 - x^{n+1} + x^{n+1} - x^{n+2}}{1 - x} = \frac{1 - x^{n+2}}{1 - x}.$$

Dunque la formula vale anche per $n + 1$.

Per il principio di induzione, la formula è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$. □

Proposizione 1.6.4

Siano $x, y \in \mathbb{R}$ con $0 < x < y$. Allora

$$x^n < y^n \quad \text{per ogni } n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

Cioè, la funzione $f(t) = t^n$ è strettamente crescente per $t > 0$.

Dimostrazione. Dimostriamo l'implicazione $\implies$. Supponiamo $0 < x < y$.

Base di induzione: per $n = 1$ si ha direttamente $x < y$, che è vero per ipotesi.

Passo induttivo: supponiamo $x^{n-1} < y^{n-1}$ e dimostriamo $x^n < y^n$. Si ha:

$$x^n = x \cdot x^{n-1} < x \cdot y^{n-1} < y \cdot y^{n-1} = y^n,$$

perché $0 < x < y$ e $x^{n-1} < y^{n-1}$. Per la transitività, $x^n < y^n$.

Dimostriamo ora l'implicazione $\Leftarrow$. Supponiamo $x^n < y^n$ con $x > 0$, $y > 0$. Per assurdo, se non fosse $x < y$, dovremmo avere $y \leq x$. Ma se $y < x$ allora, dal passo precedente, $y^n < x^n$, in contraddizione con l'ipotesi. Quindi necessariamente $x < y$. $\square$

Proposizione 1.6.5

Sia $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, e sia $a \in \mathbb{N}$, $a > 0$. Allora esiste ed è unico $x \in \mathbb{R}^+$ tale che

$$x^n = a.$$

Questo x si chiama *radice n -esima di a* e si indica con

$$x = \sqrt[n]{a}.$$

1.6.1 Media aritmetica e media geometrica

Siano $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ con $x_i \geq 0$ per $i = 1, \dots, n$.

- Si definisce *media aritmetica*:

$$A = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

- Si definisce *media geometrica*:

$$G = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n} = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}}.$$

Proposizione 1.6.6

Siano $x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$. Si ha

$$G \leq A,$$

dove

$$G = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i}, \quad A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Inoltre, l'uguaglianza $G = A$ vale se e solo se $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Dimostrazione. Dimostrazione della disuguaglianza tra media geometrica e media aritmetica.

Siano $x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$. Vogliamo dimostrare che

$$G = \sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n} \leq A = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n},$$

con uguaglianza se e solo se $x_1 = \dots = x_n$.

Passo 0: caso $x_i = 0$.

Se esiste qualche $x_i = 0$, allora $G = 0 \leq A$, e la disuguaglianza è immediata. Quindi possiamo supporre $x_i > 0$ per ogni $i = 1, \dots, n$.

Passo 1: normalizzazione.

Normalizziamo la media:

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = 1.$$

Se la media originale $A \neq 1$, dividiamo tutti i x_i per A . La disuguaglianza generale si riduce quindi al caso normalizzato.

Passo 2: base $n = 2$.

Vogliamo dimostrare

$$\sqrt{x_1 x_2} \leq \frac{x_1 + x_2}{2} = 1.$$

Poiché $\frac{x_1 + x_2}{2} = 1$, possiamo esprimere x_2 in funzione di x_1 :

$$x_2 = 2 - x_1.$$

Allora la disuguaglianza diventa:

$$x_1 x_2 = x_1(2 - x_1) \leq 1.$$

Lasciando 1 a destra e sviluppando la parentesi:

$$x_1(2 - x_1) \leq 1 \iff 2x_1 - x_1^2 \leq 1.$$

Spostiamo tutto a sinistra:

$$-x_1^2 + 2x_1 - 1 \leq 0 \iff x_1^2 - 2x_1 + 1 \geq 0.$$

Infine:

$$(x_1 - 1)^2 \geq 0.$$

Chiaramente vero per ogni x_1 , con uguaglianza solo se $x_1 = x_2 = 1$.

Passo 3: passo induttivo.

Ipotesi induttiva: la disuguaglianza vale per ogni insieme di n numeri positivi $x_1, \dots, x_n$ con media

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = 1.$$

Tesi: la disuguaglianza vale per $n + 1$ numeri positivi $x_1, \dots, x_{n+1}$ con media

$$\frac{x_1 + \dots + x_{n+1}}{n + 1} = 1.$$

Se tutti i numeri sono uguali, la disuguaglianza è ovvia. Altrimenti, introduciamo:

$$x_1 = 1 - a, \quad 0 \leq a < 1, \quad x_2 = 1 + b, \quad b > 0.$$

Gli altri termini $x_3, \dots, x_{n+1}$ sono scelti in modo da soddisfare la media, così che la somma totale sia

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{n+1} = n + 1.$$

Sviluppo della disuguaglianza per i primi due termini.

Consideriamo la media geometrica dei primi due termini:

$$\sqrt{x_1 x_2} = \sqrt{(1-a)(1+b)}.$$

La media aritmetica normalizzata dei due termini è:

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{(1-a) + (1+b)}{2} = 1 + \frac{b-a}{2}.$$

Quindi la disuguaglianza diventa:

$$(1-a)(1+b) \leq 1-a+b.$$

Sviluppando il prodotto a sinistra:

$$1-a+b-ab \leq 1-a+b.$$

Sottraendo $1-a+b$ da entrambi i membri:

$$-ab \leq 0 \iff ab \geq 0.$$

Condizione di uguaglianza.

Inoltre, vale

$$G = A \iff x_1 = x_2 = \dots = x_n.$$

Infatti:

- Se $ab > 0$, allora $(1-a)(1+b) < 1-a+b$, quindi la media geometrica è strettamente minore della media aritmetica.
- L'unico caso in cui $ab = 0$ corrisponde a $a = 0$ e $b = 0$, cioè

$$x_1 = x_2 = 1.$$

Applicando lo stesso ragionamento a tutti i termini nel passo induttivo, otteniamo che **tutti** i x_i **devono essere uguali** per avere uguaglianza tra media geometrica e media aritmetica.

Conclusione finale.

Abbiamo quindi dimostrato che per ogni insieme di numeri positivi $x_1, \dots, x_n$:

$$\sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n},$$

con uguaglianza se e solo se

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n.$$

□

1.6.2 Coefficiente binomiale

Siano $n \in \mathbb{N}_0$ e $k \in \{0, 1, \dots, n\}$. Il **coefficiente binomiale** si indica con

$$\binom{n}{k}$$

ed è definito come

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Proprietà:

- $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!n!} = 1$
- $\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!0!} = 1$

Questa definizione è alla base dello sviluppo binomiale e delle formule combinatorie.

1.6.3 Binomio di Newton

Siano $n \in \mathbb{N}$ e $a, b \in \mathbb{R}$. Allora vale la formula del **binomio di Newton**:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Dimostrazione. Dimostrazione per induzione del binomio di Newton.

Vogliamo dimostrare che per ogni $n \in \mathbb{N}$ e $a, b \in \mathbb{R}$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Base dell'induzione: per $n = 1$:

$$(a+b)^1 = a+b = \binom{1}{0} a^1 b^0 + \binom{1}{1} a^0 b^1.$$

Quindi la formula è vera per $n = 1$.

Passo induttivo: supponiamo che la formula valga per un certo $n \geq 1$ (ipotesi induttiva):

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Vogliamo dimostrare che vale per $n+1$ (tesi):

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k.$$

Sviluppiamo:

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n = (a+b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Moltiplichiamo $(a+b)$ all'interno della sommatoria:

$$(a+b)^{n+1} = \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k}_{\text{moltiplicando per } a} + \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}}_{\text{moltiplicando per } b}.$$

Per chiarezza, riscriviamo le due sommatorie isolando i termini estremi:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k &= \binom{n}{0} a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k, \\ \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} + \binom{n}{n} b^{n+1}. \end{aligned}$$

Facciamo il **cambio di indice** nella seconda sommatoria: $j = k + 1$, quindi $k = j - 1$. Allora:

$$\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} = \sum_{j=1}^n \binom{n}{j-1} a^{n+1-j} b^j.$$

Ora possiamo **combinare le due somme centrali** (da $k = 1$ a n) usando la relazione dei coefficienti binomiali:

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}.$$

Così otteniamo:

$$(a+b)^{n+1} = \underbrace{\binom{n+1}{0} a^{n+1}}_{\text{termine iniziale}} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k + \underbrace{\binom{n+1}{n+1} b^{n+1}}_{\text{termine finale}}.$$

Infine, **incorporando i termini estremi nella sommatoria completa**, otteniamo la forma della tesi:

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k.$$

Conclusione: per il principio di induzione matematica, la formula del binomio di Newton vale per ogni $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Capitolo 2

Funzioni

2.1 Funzioni astratte

Definizione 2.1.1: Funzione

Siano $A, B \neq \emptyset$. Si chiama **funzione** $f : A \rightarrow B$ una legge che associa **ad ogni elemento di A uno ed un solo elemento di B** . Si può anche scrivere:

$$f : x \in A \mapsto y = f(x) \in B$$

dove y è l'**immagine** di x mediante f .

- A si dice **dominio** di f (insieme di esistenza)
- B si dice **codominio** di f
- L'insieme

$$f(A) = \{ y \in B \mid \exists x \in A : y = f(x) \}$$

si chiama **immagine** di A

- Sia $y \in B$, con $f^{-1}(y)$ indichiamo il seguente insieme:

$$f^{-1}(y) = \{ x \in A \mid f(x) = y \}$$

Questo insieme può avere, a seconda dei casi, nessuno ($\emptyset$), uno o più elementi.

- L'insieme

$$G(f) = \{ (x, f(x)) \mid x \in A \}$$

si chiama **grafico** di f

2.1.1 Restrizione

Definizione 2.1.2: Restrizione

Sia $f : A \rightarrow B$ con $A, B \neq \emptyset$. Sia $E \subseteq A$, $E \neq \emptyset$. La funzione

$$g : E \rightarrow B, \quad g(x) = f(x) \text{ per ogni } x \in E$$

si chiama **restrizione di f su E** e si indica con $f|_E$.

2.1.2 Funzioni composte

Siano $A, B, C \neq \emptyset$ e siano $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$. Allora si definisce la **funzione composta** $g \circ f : A \rightarrow C$ mediante

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad \forall x \in A$$

dove $(g \circ f)(x)$ è l'immagine di x tramite la composizione di f e g .

Esempio.

$$f(x) = x + 1, \quad f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad g(x) = x^3, \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Allora:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (x + 1)^3, \quad x \in \mathbb{R} \quad (f \circ g)(x) = f(g(x)) = x^3 + 1, \quad x \in \mathbb{R}$$

Questi esempi mostrano chiaramente che la composizione **non è commutativa**.

2.1.3 Funzioni suriettive

Una funzione $f : A \rightarrow B$ si dice **suriettiva** se l'immagine coincide con il codominio, cioè:

$$\forall b \in B, \exists a \in A \mid f(a) = b$$

In una funzione suriettiva la controimmagine di ogni elemento del codominio **non può essere vuota**.

2.1.4 Funzioni iniettive

Una funzione $f : A \rightarrow B$ si dice **iniettiva** se elementi distinti del dominio hanno immagini distinte, cioè:

$$\forall x_1, x_2 \in A, \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

oppure equivalentemente:

$$x_1, x_2 \in A, \quad x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

In una funzione iniettiva la controimmagine di ogni elemento del codominio può avere **al massimo un elemento**.

2.1.5 Funzioni biettive

Una funzione $f : A \rightarrow B$ si dice **biettiva** se è sia iniettiva che suriettiva.

- Esiste quindi una **corrispondenza biunivoca** tra gli elementi del dominio e del codominio.
- La controimmagine di ogni elemento del codominio possiede **esattamente un elemento**.
- In simboli:

$$f(A) = B, \quad x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

2.1.6 Identità

Definizione 2.1.3: Funzione Identità

Sia $A \neq \emptyset$. La **funzione identità** su A , indicata con i_A , è definita da:

$$i_A : x \in A \mapsto x \in A$$

Se la funzione è biettiva si definisce la funzione inversa

$$f^{-1} : B \rightarrow A, \quad y \in B \mapsto x = f^{-1}(y)$$

Avendo $f : A \rightarrow B$ e $f^{-1} : B \rightarrow A$ possiamo comporle per ottenere le funzioni identità di A e identità di B (i_A e i_B):

- $f \circ f^{-1} : y \in B \mapsto y \in B = i_B$
- $f^{-1} \circ f : x \in A \mapsto x \in A = i_A$

Una funzione biettiva è anche **invertibile**, cioè esiste $f^{-1} : B \rightarrow A$ tale che:

$$f^{-1}(f(x)) = x, \quad \forall x \in A$$

L'esistenza della funzione inversa è ciò che ci permette di risolvere le disequazioni, prendiamo ad esempio la disequazione $x^2 \leq 8$:

- La funzione potenza $f(x) = x^2$ non è invertibile su tutto $\mathbb{R}$, ma diventa invertibile se ristretta al dominio $\mathbb{R}_0^+$ (numeri reali non negativi). La sua inversa è la funzione radice quadrata $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$, definita per $y \geq 0$.
- Utilizzando la funzione inversa, possiamo risolvere la disequazione $x^2 \leq 8$ applicando la radice quadrata a entrambi i membri. Tuttavia, dobbiamo considerare che x^2 è definita per tutti gli $x \in \mathbb{R}$, quindi dobbiamo separare i casi in base al segno di x :
 - Se $x \geq 0$, allora $x = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.
 - Se $x \leq 0$, allora $x = -\sqrt{x^2} \geq -\sqrt{8} = -2\sqrt{2}$.
- Combinando i due casi, otteniamo la soluzione finale:

$$-2\sqrt{2} \leq x \leq 2\sqrt{2}.$$

Questo significa che tutti i valori di x compresi tra $-2\sqrt{2}$ e $2\sqrt{2}$ soddisfano la disequazione $x^2 \leq 8$.

2.2 Funzioni Numeriche

2.2.1 Proprietà delle funzioni numeriche

Grafico della Funzione

Definizione 2.2.1: Grafico

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, con $A \neq \emptyset$. Si chiama *grafico* di f l'insieme

$$G(f) = \{(x, f(x)) \mid x \in A\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Nel piano cartesiano non esiste una relazione d'ordine. Ad ogni funzione corrisponde un grafico.




Figura 2.1: Grafico della funzione

Dal grafico di una funzione possiamo ricavare informazioni come il dominio e il codominio anche senza conoscere la legge precisa:

$$A = [1, 6], \quad f(A) = B = [1, 5].$$

Dal grafico possiamo capire anche se la funzione è iniettiva.

Funzione Inversa

Una funzione è invertibile se e solo se, fissato un valore y , esiste una sola x tale che $f(x) = y$.

Se la funzione è invertibile, il grafico della sua inversa è

$$G(f^{-1}) = \{(y, f^{-1}(y)) \mid y \in f(A)\}.$$




Figura 2.2: Grafico della funzione inversa

2.2.2 Funzioni Pari e Dispari

Definizione 2.2.2: Proprietà di simmetria

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La funzione f si dice *pari* se

$$f(-x) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

cioè se ha simmetria rispetto all'asse y .

La funzione f si dice *dispari* se

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

La funzione f si dice *periodica* di periodo $t \in \mathbb{R}$ se

$$f(x) = f(x + t), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

2.2.3 Funzioni Limitate

Definizione 2.2.3: Funzione superiormente limitata

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $A \neq \emptyset$. La funzione f si dice *superiormente limitata* se $f(A)$ è superiormente limitata, cioè se

$$\exists K \in \mathbb{R} \text{ tale che } f(x) \leq K, \quad \forall x \in A.$$

Definizione 2.2.4: Funzione inferiormente limitata

La funzione f si dice *inferiormente limitata* se $f(A)$ è inferiormente limitata, cioè se

$$\exists c \in \mathbb{R} \text{ tale che } c \leq f(x), \quad \forall x \in A.$$




Figura 2.3: Esempio di funzione pari




Figura 2.4: Esempio di funzione dispari

Definizione 2.2.5: Funzione limitata

La funzione f si dice *limitata* se è sia inferiormente che superiormente limitata, cioè se

$$\exists c, K \in \mathbb{R} \text{ tali che } c \leq f(x) \leq K, \quad \forall x \in A.$$

Definizione 2.2.6: Estremo superiore

Si definisce *estremo superiore* di $f(A)$ e si indica con $\sup f(A)$.

Definizione 2.2.7: Estremo inferiore

Si definisce *estremo inferiore* di $f(A)$ e si indica con $\inf f(A)$.




Figura 2.5: Esempio di funzione periodica

2.2.4 Massimo e Minimo

Definizione 2.2.8: Massimo

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $A \neq \emptyset$. Se $f(A)$ ha un massimo M , diremo che f ha un massimo e scriveremo

$$M = \max f(A).$$

Essendo $M \in f(A)$, esiste $x_M \in A$ tale che $f(x_M) = M$, che si chiama *punto di massimo*. Il punto di massimo non è necessariamente unico.




Figura 2.6: Esempio di funzione con due punti di massimo

Definizione 2.2.9: Minimo

Se $f(A)$ ha un minimo m , diremo che f ha un minimo e i punti $x_m \in A$ tali che $f(x_m) = m$ si chiamano *punti di minimo*.

2.2.5 Funzioni Monotone**Definizione 2.2.10: Monotona crescente**

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $A \neq \emptyset$. La funzione f si dice *monotona crescente* se

$$x_1 < x_2, x_1, x_2 \in A \implies f(x_1) \leq f(x_2),$$

e *strettamente monotona crescente* se

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2).$$




Figura 2.7: Esempio di funzioni crescenti

Definizione 2.2.11: Monotona decrescente

La funzione f si dice *monotona decrescente* se

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2),$$

e *strettamente monotona decrescente* se

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2).$$

Inoltre valgono le seguenti proprietà:

- Una funzione strettamente monotona è iniettiva.
- Se f è invertibile e monotona, anche f^{-1} è monotona della stessa tipologia.




Figura 2.8: Esempio di funzioni decrescenti

2.3 Funzioni Elementari

2.3.1 Funzioni lineari (o affini)

Sia

$$f(x) = ax + b, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0.$$




Figura 2.9: Grafico della funzione lineare

Proprietà della funzione lineare:

- Se $a > 0$, la funzione è crescente.
- Se $a < 0$, la funzione è decrescente.
- Se $f(x) = x$ o $f(x) = -x$, la funzione coincide con una bisettrice.

2.3.2 Funzione valore assoluto

Sia

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0, \\ -x, & \text{se } x < 0, \end{cases} \quad x \in \mathbb{R}, \quad |x| : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty).$$




Figura 2.10: Grafico della funzione valore assoluto

Proprietà della funzione valore assoluto:

1. $|x| \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
2. $|x| = 0 \iff x = 0$.
3. $|-x| = |x|$, quindi la funzione è pari.
4. $|x_1 \cdot x_2| = |x_1| \cdot |x_2|$.
5. $|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a$.
6. $|x| \geq a \iff x \leq -a \text{ o } x \geq a$.
7. Per ogni $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ vale la *disuguaglianza triangolare*:

$$|x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2|.$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} -|x_1| &\leq x_1 \leq |x_1|, & -|x_2| &\leq x_2 \leq |x_2| \\ \implies -(|x_1| + |x_2|) &\leq x_1 + x_2 \leq |x_1| + |x_2| \\ \implies |x_1 + x_2| &\leq |x_1| + |x_2|. \end{aligned}$$

2.3.3 Funzione potenza (con esponente in $\mathbb{N}$)

Sia

$$f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^n$$

Allora:

- $f(x) \in [0, +\infty)$ per n pari
- $f(x) \in \mathbb{R}$ per n dispari

La funzione è quindi:

$$f(x) = x^n$$

Caso n pari





Figura 2.11: Grafico della funzione potenza per n pari

- La funzione è pari
- $x^n \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, e $x^n = 0 \iff x = 0$
- Non è globalmente monotona:
 - x^n è strettamente crescente per $x \geq 0$
 - x^n è strettamente decrescente per $x \leq 0$
- $\sup_{x \in \mathbb{R}} x^n = +\infty$
- $\inf_{x \in \mathbb{R}} x^n = \min_{x \in \mathbb{R}} x^n = 0$

Caso n dispariFigura 2.12: Grafico della funzione per n dispari

- La funzione è dispari
- La funzione è strettamente monotona crescente (quindi è iniettiva $\implies$ invertibile)
- $\inf_{x \in \mathbb{R}} x^n = -\infty$
- $\sup_{x \in \mathbb{R}} x^n = +\infty$

Proprietà comuni

Proprietà valide per entrambi i casi:

- $x^{n_1} \cdot x^{n_2} = x^{n_1+n_2} \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall n_1, n_2 \in \mathbb{N}$
- $\frac{x^{n_1}}{x^{n_2}} = x^{n_1-n_2} \quad \text{se } x \neq 0 \text{ e } n_1 \geq n_2$
- $(x^{n_1})^{n_2} = x^{n_1 \cdot n_2} \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall n_1, n_2 \in \mathbb{N}$
- $(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}$
- $|x^n| = |x|^n \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}$

Funzione potenza con esponente negativo**Definizione 2.3.1: Potenza inversa**

Si definisce x^{-n} (con $x \neq 0$) come $x^{-n} := \frac{1}{x^n}$. Poniamo $x^0 = 1$ se $x \neq 0$. A questo punto abbiamo definito la funzione x^n con $n \in \mathbb{Z}$.

La funzione potenza con n negativo è definita in:

- $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ per n dispari
- $(0, +\infty)$ per n pari

Grafico della funzione $f(x) = x^n$ con n negativo pari:



Figura 2.13: Grafico della funzione per n negativo pari

Grafico della funzione $f(x) = x^n$ con n negativo dispari:

Figura 2.14: Grafico della funzione per n negativo dispari

Funzione potenza con esponente reale

La funzione potenza con esponente reale è definita come:

$$x^\alpha :]0, +\infty[\mapsto]0, +\infty[, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

e può essere espressa come:

$$x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$$

A seconda del valore di α , la funzione presenta diversi comportamenti:

- Se $\alpha > 1$, la funzione è **strettamente crescente** e **convessa**.

- Se $0 < \alpha < 1$, la funzione è **strettamente crescente** e **concava**.
- Se $\alpha < 0$, la funzione è strettamente decrescente.




Figura 2.15: Grafico della funzione x^α per diversi valori di α : -1 , 0.5 , e 2 .

Nel caso di α positivo e frazionario (ad esempio $\alpha = \frac{1}{2}$), il dominio può essere esteso anche a $x = 0$, ossia $[0, +\infty[$.

2.3.4 Funzione radice n -esima

Con esponente dispari

La funzione potenza con esponente dispari è dotata di inversa: la radice n -esima.

$$\sqrt[n]{x} : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R} \quad \text{inversa di } x^n$$




Figura 2.16: Grafico della funzione radice n -esima con n dispari

Proprietà:

- È strettamente crescente
- È dispari
- $\sqrt[n]{x^n} = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $(\sqrt[n]{x})^n = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Con esponente pari

La funzione potenza con esponente pari non è globalmente invertibile. Non la possiamo invertire in tutto $\mathbb{R}$; ci serve ridurre il dominio alla parte della funzione strettamente monotona crescente:

$$x^n|_{[0, +\infty[} : [0, +\infty[\mapsto [0, +\infty[$$





Figura 2.17: Grafico della restrizione della funzione potenza con n pari

La funzione inversa della restrizione è la radice n -esima:

$$\sqrt[n]{x} : [0, +\infty[\mapsto [0, +\infty[$$

Figura 2.18: Grafico della funzione radice n -esima con n pari

Come cambiano le relazioni tra la funzione potenza e la sua inversa:

- $\sqrt[n]{x^n} = |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $(\sqrt[n]{x})^n = x \quad \forall x \geq 0$

Proprietà comuni

Proprietà valide per entrambi i casi:

- $\sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{x \cdot y}$ (con $x, y \geq 0$ per n pari)
- $x < y \implies \sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{y}$ (con $x, y \geq 0$ per n pari)
- $\sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} = \sqrt[n \cdot m]{x}$ (con $x \geq 0$ per n o m pari)
- $\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$ con $x \geq 0, m, n > 0$

2.3.5 Funzione esponenziale

Sia

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad a \in \mathbb{R}$$

la base di una funzione esponenziale del tipo

$$f(x) = a^x \quad \text{con} \quad x \in \mathbb{R}, \quad f(x) \in (0, +\infty)$$

Per $a > 1$ si ha $a^b > 0 \quad \forall b \in \mathbb{R}$

Per $0 < a < 1$ si ha $a^b = \left(\frac{1}{a}\right)^b \quad \forall b \in \mathbb{R}$




Figura 2.19: Grafico della funzione esponenziale per $a > 1$ e $0 < a < 1$

Proprietà della funzione esponenziale:

- Se $a > 1$, la funzione è strettamente crescente.
- Se $0 < a < 1$, la funzione è strettamente decrescente.
- $a^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.
- $a^0 = 1$.
- $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$.
- $(a^x)^y = a^{x \cdot y}$.

2.3.6 Funzione Logaritmica

La funzione logaritmica è l'inversa della funzione esponenziale a^x con $a > 0$ e $a \neq 1$:

$$\log_a(x) :]0, +\infty[\mapsto \mathbb{R}$$

a prende il nome di *base del logaritmo*, x prende il nome di *argomento del logaritmo*.




Figura 2.20: Grafico della funzione logaritmica per $a > 1$ e $0 < a < 1$

Relazioni di passaggio tra funzione esponenziale e logaritmica:

$$\begin{cases} a^{\log_a(x)} = x \\ \log_a(a^x) = x \end{cases} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Proprietà dei logaritmi:

- $\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$
- $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$
- $\log_a(x^\alpha) = \alpha \cdot \log_a(x)$
- $\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)} \quad \forall b > 0, b \neq 1$

2.4 Funzioni Trigonometriche Elementari

Le funzioni trigonometriche sono funzioni di un angolo. Per definirle rigorosamente, si introduce il **radiante** come unità di misura e si utilizza la **circonferenza goniometrica**, ovvero una circonferenza di raggio unitario centrata nell'origine degli assi.




Figura 2.21: Circonferenza goniometrica con angoli notevoli.


Dato un angolo α in radianti, si identifica un punto $P(x_p, y_p)$ sulla circonferenza. Dato che gli angoli in radianti sono adimensionali, posso ora definire funzioni reali: le funzioni seno e coseno sono definite come le coordinate di questo punto.

2.4.1 Funzioni Seno e Coseno

Definizione 2.4.1: Seno e Coseno

Dato un punto $P(x_p, y_p)$ sulla circonferenza goniometrica associato a un angolo α , si definisce:

- **Coseno:** $\cos(\alpha) = x_p$ (ascissa di P)
- **Seno:** $\sin(\alpha) = y_p$ (ordinata di P)

Figura 2.22: Grafici delle funzioni $y = \sin(x)$ (blu) e $y = \cos(x)$ (arancione).

Proprietà di Seno e Coseno

- **Dominio e Codominio:** Entrambe hanno dominio $\mathbb{R}$ e codominio $[-1, 1]$. Sono quindi funzioni **limitate**.
- **Periodicità:** Sono periodiche di periodo $T = 2\pi$.

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin(x), \quad \cos(x + 2k\pi) = \cos(x), \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

- **Simmetrie:** Il coseno è una funzione **pari** ($\cos(-x) = \cos(x)$), mentre il seno è **dispari** ($\sin(-x) = -\sin(x)$).
- **Relazione Fondamentale:** Dal Teorema di Pitagora sulla circonferenza goniometrica si ottiene:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

Formule

- Addizione e sottrazione:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

- Duplicazione:

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \quad \text{oppure} \quad 2 \cos^2 \alpha - 1 \quad \text{oppure} \quad 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

- Bisezione:

$$\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos \alpha}{2}$$

$$\cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

2.4.2 Funzione Tangente

Definizione 2.4.2: Tangente

La funzione tangente è definita come il rapporto tra seno e coseno:

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

Il suo dominio esclude i punti in cui il coseno è nullo: $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \right\}$.




Figura 2.23: Grafico della funzione tangente con i suoi asintoti verticali.

Proprietà della Tangente

- **Periodicità:** È periodica con periodo $T = \pi$.
- **Simmetrie:** È una funzione **dispari** ($\tan(-x) = -\tan(x)$).

2.4.3 Funzioni Trigonometriche Inverse

Per definire le funzioni inverse, è necessario restringere il dominio delle funzioni di partenza per renderle biettive.

Arcoseno e Arcocoseno

- **Arcoseno** ($\arcsin$): È l'inversa della funzione seno ristretta a $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

- **Arcocoseno** ($\arccos$): È l'inversa della funzione coseno ristretta a $[0, \pi]$.

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$




Figura 2.24: Grafici delle funzioni $y = \arcsin(x)$ (blu) e $y = \arccos(x)$ (arancione).

Arcotangente

È l'inversa della funzione tangente ristretta a $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

$$\arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$




Figura 2.25: Grafico della funzione arcotangente con i suoi asintoti orizzontali.


2.4.4 Funzioni Iperboliche

Definiamo il Seno Iperbolico ($\sinh x$) e il Coseno Iperbolico ($\cosh x$):

- **Seno Iperbolico** ($\sinh x$) (Dispari):

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$


Dominio: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.



- **Coseno Iperbolico** ($\cosh x$) (Pari):

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Dominio: $\mathbb{R} \rightarrow [1, +\infty[$.




Le funzioni iperboliche sono connesse all'iperbole $x^2 - y^2 = 1$. L'inversa del seno iperbolico è $\text{settsinh } x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. L'inversa del coseno iperbolico è $\text{settcosh } x : [1, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$.

Usiamo la stessa notazione delle funzioni trigonometriche perché $\sinh$ e $\cosh$ sono rispettivamente l'ascissa e l'ordinata di un punto P che si sta muovendo su un ramo di iperbole.


2.4.5 Trasformazioni del Grafico di Funzioni

Le trasformazioni includono traslazioni verticali ($f(x) \pm K$), traslazioni orizzontali ($f(x \pm K)$), dilatazioni/contrazioni, e ribaltamenti.

- Traslazione verticale: $f_1(x) = f(x) \pm K$.




- Traslazione orizzontale: $f_2(x) = f(x \pm K)$.




- Dilatazione/Contrazione: $f_3(x) = Kf(x)$ o $f(Kx)$.


3. Dilatazione/Contrazione




- Ribaltamento rispetto all'asse x : $f_4(x) = -f(x)$.




- Ribaltamento rispetto all'asse y : $f_5(x) = f(-x)$ (simmetria di specie).



- Valore assoluto esterno: $f_6(x) = |f(x)|$.



- Valore assoluto interno: $f_7(x) = f(|x|)$.



Capitolo 3

Numeri Complessi

L'equazione

$$x^2 + 1 = 0$$

non ha soluzioni in $\mathbb{R}$. Dobbiamo quindi ampliare l'insieme $\mathbb{R}$ per fare in modo che le equazioni algebriche di questo tipo ammettano soluzioni.

3.1 Il campo dei numeri complessi

Chiamiamo $\mathbb{C}$ l'insieme formato dalle coppie ordinate di numeri reali appartenenti al prodotto $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Definiamo su questo insieme due operazioni binarie interne (rispettivamente somma e prodotto):

- **Somma:** $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$
- **Prodotto:** $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$

La struttura $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ soddisfa tutti gli assiomi di campo e prende il nome di *campo complesso*:

1. $\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$ valgono le proprietà commutativa, associativa e distributiva.
2. $(0, 0)$ costituisce l'elemento neutro rispetto alla somma (zero), mentre $(1, 0)$ è l'elemento neutro rispetto al prodotto (unità).
3. L'opposto della coppia (a, b) è la coppia $(-a, -b)$. Per ogni $(a, b) \neq (0, 0)$, il reciproco (o inverso) è la coppia:

$$(a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right)$$

Indichiamo con R il sottoinsieme di $\mathbb{C}$ formato dalle coppie $(a, 0)$, con $a \in \mathbb{R}$. L'applicazione

$$\phi : R \rightarrow \mathbb{R}$$

definita da $\phi((a, 0)) = a$ è un isomorfismo tra il campo $(R, +, \cdot)$ e il campo $(\mathbb{R}, +, \cdot)$.

R è quindi un sottocampo di $\mathbb{C}$ isomorfo a $\mathbb{R}$. Per convenzione, si identifica $\mathbb{R}$ con questo sottocampo e si scrive $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Consideriamo adesso il numero complesso $(0, 1)$ che viene denotato con il simboli i (unità immaginaria). Notiamo che:

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$$

Questa risulta essere proprio una soluzione dell'equazione $x^2 + 1 = 0$.

3.2 Forma algebrica

I numeri complessi possono essere espressi in forma algebrica. Osserviamo ad esempio che:

$$(0, b) = (b, 0) \cdot (0, 1) = b \cdot i \quad \forall b \in \mathbb{R}$$

Quindi un qualsiasi numero complesso (a, b) può essere espresso nella forma $a + b \cdot i$:

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + ((b, 0) \cdot (0, 1)) = a + b \cdot i$$

La forma algebrica è molto comoda perché ci permette di operare sui numeri complessi con le comuni regole del calcolo letterale.

Dato un numero complesso $\alpha = a + bi$, valgono le seguenti definizioni:

- $a = \operatorname{Re}(\alpha)$ prende il nome di *parte reale*.
- $b = \operatorname{Im}(\alpha)$ prende il nome di *parte immaginaria*.
- $\bar{\alpha} = a - bi$ prende il nome di *coniugato* di α .

Esempio.

$$\frac{3 - 2i}{5 + i} \cdot \frac{\bar{z}}{\bar{z}} = \frac{(3 - 2i)(5 - i)}{(5 + i)(5 - i)} = \frac{(3 - 2i)(5 - i)}{26}$$

- Per ottenere la parte reale di un numero complesso α :

$$\operatorname{Re}(\alpha) = \frac{\alpha + \bar{\alpha}}{2}$$

- Per ottenere la parte immaginaria di un numero complesso α :

$$\operatorname{Im}(\alpha) = \frac{\alpha - \bar{\alpha}}{2i}$$

- Ne deriva che α è un numero reale se e solo se coincide con il suo coniugato:

$$\alpha = \bar{\alpha} \iff \alpha \in \mathbb{R} \text{ (ovvero, } b = 0)$$

3.2.1 Operazioni

Dati due numeri complessi $z_1 = x_1 + y_1i$ e $z_2 = x_2 + y_2i$:

- Somma:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)i$$

- Prodotto:

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + (x_1y_2 + x_2y_1)i$$

- Per effettuare la divisione di due numeri complessi dobbiamo effettuare un processo simile alla razionalizzazione delle radici. Moltiplichiamo numeratore e denominatore per il *complesso coniugato* del denominatore:


$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{\overline{z_2}}{\overline{z_2}} = \frac{z_1 \overline{z_2}}{|z_2|^2}$$

dove il coniugato di $z_2 = x_2 + y_2i$ è $\overline{z_2} = x_2 - y_2i$, e $|z_2|^2 = x_2^2 + y_2^2$.

3.3 Piano complesso

Così come $\mathbb{R}$ può essere identificato come l'insieme dei punti di una retta, il campo complesso può essere identificato come l'insieme dei punti di un piano che prende il nome di *piano di Gauss*, dove:

- L'asse delle ordinate prende il nome di asse immaginario
- L'asse delle ascisse prende il nome di asse reale



3.3.1 Modulo

Geometricamente nel piano di Gauss la lunghezza del segmento che congiunge un punto del piano identificato da un numero complesso $z = x + yi$ con l'origine si indica con $|z|$:

$$\sqrt{(x^2 + y^2)} = |z|$$

Esempio.

$$\begin{aligned} z_1 &= 2i & z_2 &= 3 - i \\ |z_1 - z_2| &= |2i - 3 + i| = |-3 + 3i| = 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

3.4 Forma trigonometrica

Definizione 3.4.1: Forma trigonometrica

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \theta, & y &= \rho \sin \theta \\ \tan \theta &= \frac{y}{x} \\ \text{ALLORA } z &= \rho[\cos \theta + i \sin \theta] \end{aligned}$$

La forma trigonometrica (o in coordinate polari) di un numero complesso ci permette di identificare un qualsiasi $z \in \mathbb{C}$ mediante due valori detti *modulo* e *argomento*.

Abbiamo già visto che il modulo di un numero complesso rappresenta la distanza del punto P identificato dalla coppia (x, y) dall'origine.


L'*argomento* di un numero complesso (necessariamente diverso da 0) è il numero reale θ che esprime la misura, in radianti, dell'angolo che il semiasse positivo delle ascisse forma con la semiretta OP . Si indica con:

$$\arg(z) = \{\theta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

Definizione 3.4.2: Argomento principale

θ non è univocamente determinato. Si chiama **argomento principale** $\theta \in]-\pi, \pi]$, che diventa univocamente determinato.

Abbiamo così un cambio in **coordinate polari**, ρ e θ .



Come si può notare dalla figura, siamo in grado di individuare qualsiasi numero complesso $z = x + yi$ conoscendo la misura del segmento $\overline{OP}$ (modulo di z , che indicheremo con ρ) e l'ampiezza dell'angolo θ che $\overline{OP}$ forma con l'asse delle ascisse (argomento di z).

Dai teoremi sui triangoli rettangoli risulta che:

- $x = \rho \cdot \cos(\theta)$
- $y = \rho \cdot \sin(\theta)$

Se ρ e θ sono rispettivamente il modulo e l'argomento, otteniamo la seguente forma trigonometrica del numero complesso:

$$z = \rho \cos(\theta) + \rho \sin(\theta)i = \rho(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

Per convertire un numero complesso dalla forma algebrica alla forma trigonometrica basta ricordare che:

- $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$
- L'argomento θ si calcola nel seguente modo:

$$\theta = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & \text{se } x > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi, & \text{se } x < 0 \\ \frac{\pi}{2}, & \text{se } x = 0 \text{ e } y > 0 \\ \frac{3\pi}{2}, & \text{se } x = 0 \text{ e } y < 0 \end{cases}$$

3.5 Potenze

Rappresentare i numeri complessi in forma trigonometrica risulta particolarmente utile quando dobbiamo calcolare potenze o prodotti tra numeri complessi.

Per comprendere come avviene l'elevamento a potenza, consideriamo innanzitutto il prodotto tra due numeri complessi espressi in forma trigonometrica. Siano

$$z_1 = \rho_1(\cos(\theta_1) + i \sin(\theta_1)) \quad \text{e} \quad z_2 = \rho_2(\cos(\theta_2) + i \sin(\theta_2)).$$

Allora:

$$z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \rho_2 [\cos(\theta_1) \cos(\theta_2) - \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) + i(\sin(\theta_1) \cos(\theta_2) + \cos(\theta_1) \sin(\theta_2))].$$

Applicando le formule goniometriche di somma per seno e coseno, otteniamo:

$$z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \rho_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)].$$

3.6 Formula di De Moivre

Proposizione 3.6.1

Per ogni numero complesso $z = \rho(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$ e per ogni intero n , vale la seguente relazione:

$$z^n = \rho^n [\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)]$$

che prende il nome di *formula di De Moivre*.

Esempio.

$$\begin{aligned} (-1 + i)^5 \quad (-1 + i) &= z \\ \rho &= \sqrt{2} \\ \text{Arg}(z) &= \frac{3}{4}\pi \\ z &= \sqrt{2} \left[\cos \frac{3}{4}\pi + i \sin \frac{3}{4}\pi \right] \\ z^5 &= \sqrt{2} \left[\cos \frac{15}{4}\pi + i \sin \frac{15}{4}\pi \right] = 4\sqrt{2} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right] = \\ &= 4(1 - i) \end{aligned}$$

3.7 Forma esponenziale

Definizione 3.7.1: Formula di Eulero

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Non conosciamo ancora il significato di questa funzione, lo vedremo in *Metodi Matematici per la Fisica (Analisi 3)*.

Un numero complesso espresso in forma trigonometrica è rappresentabile anche in forma esponenziale facendo uso della formula di Eulero:

$$z = \rho(\cos(\theta) + i \sin(\theta)) = \rho e^{i\theta}$$

Il coniugato si indica con $\rho e^{-i\theta}$. Inoltre $e^{-1\pi} + 1 = 0$.

3.8 Radice n-esima

Definizione 3.8.1: Definizione

Sia $n \in \mathbb{N}$ e $z \in \mathbb{C}$. Si chiama **radice n-esima di z** ogni numero complesso w tale che:

$$\boxed{w^n = z}$$

Scriviamo

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta),$$

e cerchiamo w tale che

$$w^n = r(\cos \phi + i \sin \phi)$$

Applicando la **formula di de Moivre**, le radici si possono scrivere come:

$$w_k = r(\cos \phi_k + i \sin \phi_k), \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

dove ϕ_k è definito dal sistema:

$$w^n = z \iff \begin{cases} r = \sqrt[n]{\rho} \\ \phi_k = \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \quad k = [0, 1, 2, \dots, n-1] \end{cases}$$

Esempio.

$$z^4 = 1 \Rightarrow z = \sqrt[4]{1}$$

Dobbiamo calcolare le **radici quarte di 1**:

$$1 = 1 \cdot e^{i0} \text{ con } \rho = 1 \text{ e } \theta = 0.$$

$$|w_k| = \sqrt[4]{1} = 1$$

$$\phi_k = \frac{\theta + 2k\pi}{4} = \frac{k\pi}{2}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

k	ϕ_k (angolo)	w_k (radice)
0	0	$w_0 = \cos 0 + i \sin 0 = 1$
1	$\frac{\pi}{2}$	$w_1 = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i$
2	π	$w_2 = \cos \pi + i \sin \pi = -1$
3	$\frac{3\pi}{2}$	$w_3 = \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} = -i$

Le radici, quando le troviamo, risultano tutte **sulla circonferenza**.

Capitolo 4

Successioni Numeriche

Definizione 4.0.1: Definizione Successione Numerica

Si chiama **successione numerica** una funzione con dominio in $\mathbb{N}$

$$f : n \in \mathbb{N} \rightarrow f(n) \in \mathbb{R}$$

Si utilizza la seguente notazione: $f(n) = a_n \rightarrow$ Termine generale della successione.
Una successione si indica o con il suo termine generale a_n oppure $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$.

Esempio.

1: $a_n = \frac{1}{n}$

$$a_n = \frac{1}{n} \quad \text{allora} \quad 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}$$

Esempio.

2: $a_n = (-1)^n$

$$a_n = (-1)^n \rightarrow -1, 1, -1, 1, \dots$$

Esempio.

3: $a_n = n$

$$a_n = n \rightarrow 1, 2, 3, \dots$$

Esempio.

4: $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n} = -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}$$

Esempio.

5: $a_n = -n^2$

$$a_n = -n^2 = -1, -4, -9, -16$$

Esempio.

6: $a_n = \arctan n$


Esempio.

7: $a_n = 2^n$

$$a_n = 2^n = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots$$

Esempio.

8: Formula per il perimetro di un poligono inscritto



$$\alpha = \frac{360^\circ}{n}$$


$$\alpha = \frac{2\pi}{n}$$

$$P_n = n \cdot l$$

$$l = 2R \sin \frac{\pi}{n}$$

$$a_n = P_n = 2nR \sin \frac{\pi}{n}$$

$$n \geq 3$$



$$P_n = n \cdot l$$

$$\alpha = \frac{2\pi}{n}$$

$$l = 2R \sin \frac{\pi}{n}$$

$$a_n = P_n = 2nR \sin \frac{\pi}{n}$$

$$n \geq 3$$

4.1 Limiti di successioni




Figura 4.1: Rappresentazione grafica del limite di una successione.

Definizione 4.1.1: Limite di una successione numerica (Convergenza)

Assegnata una successione di termine generale a_n , diremo che a_n tende ad $l \in \mathbb{R}$ o che a_n converge ad $l \in \mathbb{R}$ se:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu > 0 : l - \epsilon < a_n < l + \epsilon \quad \forall n > \nu$$

equivale a dire che:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu > 0 : |a_n - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu$$

e scriveremo:

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l}$$

(Posso omettere $+\infty$ nel limite). (IN PAROLE POVERE):

- ϵ è la larghezza dell'imbuto
- ν è la soglia
- $l - \epsilon < a_n < l + \epsilon$ è il filtro

Appunto scollegato: (a volte con ν) $x > 0$, $x \in \mathbb{R}$ $[x] = \text{parte intera (funzione floor())}$

4.1.1 Esempi di Limiti di successioni

Esempio.

1 — Limite della successione $a_n = \frac{1}{n}$




Figura 4.2: Successione $a_n = 1/n$.

Proposizione 4.1.2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Dimostrazione. Devo dimostrare che:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu > 0 \text{ tale che } l - \epsilon < a_n < l + \epsilon \quad \forall n > \nu$$

Nel nostro caso $l = 0$ e $a_n = \frac{1}{n}$, quindi la condizione diventa:

$$-\epsilon < \frac{1}{n} < \epsilon$$

Poiché $\frac{1}{n} > 0$ per ogni n , la disuguaglianza di sinistra è sempre vera.

Rimane quindi da imporre:

$$\frac{1}{n} < \epsilon$$

da cui segue:

$$n > \frac{1}{\epsilon}$$

Poniamo quindi:

$$\nu = \frac{1}{\epsilon}$$

Allora, per ogni $n > \nu$, risulta verificata la disuguaglianza

$$-\epsilon < \frac{1}{n} < \epsilon$$

per ogni $\epsilon > 0$.

Quindi:

$$\lim_n \frac{1}{n} = 0$$

□

4.1.2 Successioni Convergenti o Infinitesime

Definizione 4.1.3: Definizione

Se a_n tende ad $l \in \mathbb{R}$ scriviamo anche che: $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$

- Se $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$ diremo che la successione è **Convergente**.
- Se $l = 0$ diremo che è **Infinitesima**.

(Non completa tutti i casi):

Esempio.

3: $a_n = n$

$$a_n = n$$




Figura 4.3: Successione $a_n = n$.

4.1.3 Successioni Divergenti

Definizione 4.1.4: Definizione divergenza a ∞

Assegnata una successione a_n diremo che a_n diverge **POSITIVAMENTE** oppure che diverge o tende a $+\infty$ se:

$$\forall M > 0 \exists \nu > 0 : a_n > M \quad \forall n > \nu$$

e scriveremo che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \quad \text{oppure che} \quad a_n \rightarrow +\infty$$

Diremo che a_n diverge **NEGATIVAMENTE** oppure che diverge o tende a $-\infty$ se:

$$\forall M > 0 \exists \nu > 0 : a_n < -M \quad \forall n > \nu$$

e scriveremo che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \quad \text{oppure che} \quad a_n \rightarrow -\infty$$

4.1.4 Successioni regolari o irregolari

Esempio.

2 - Successione oscillante $a_n = (-1)^n$




Figura 4.4: Successione oscillante $a_n = (-1)^n$.

Immaginate, per assurdo, che la successione

$$a_n = (-1)^n$$

ammetta un limite. Allora il limite dovrebbe essere contemporaneamente 1 (per i termini pari) e -1 (per i termini dispari), il che è impossibile. Quindi:

- La successione **non è convergente**.
- Non diverge a $+\infty$ né a $-\infty$.
- Questa successione è detta **irregolare** o **oscillante**.

Definizione 4.1.5: Definizione (successione irregolare / oscillante)

Sia a_n una successione numerica:

- Se a_n **ammette il limite**, è **convergente** o **regolare**.
- Se a_n **non ammette limite** (né finito né infinito), è **irregolare** o **oscillante**.

4.2 Definizione di Intorno

Definizione 4.2.1: Intorno

Sia $l \in \mathbb{R}$. Si chiama **intorno di l** qualsiasi intervallo aperto di $\mathbb{R}$ contenente l .

Esempio: l'intervallo aperto $]1, \frac{5}{2}[$ è un intorno di 2.

Un **intorno di $+\infty$** è, per definizione, una semiretta dx aperta: **Esempio:** $]2, +\infty[$.

Analogamente, un **intorno di $-\infty$** è una semiretta sx aperta: **Esempio:** $] -\infty, 2[$.

Gli intorni si possono indicare anche come $I(l)$, $I(+\infty)$, $I(-\infty)$.

Proposizione 4.2.2

Sia a_n una successione numerica. Allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \overline{\mathbb{R}} \iff \forall I(l) \exists \nu \in \mathbb{N} : a_n \in I(l) \quad \forall n > \nu.$$

Dimostrazione. La dimostrazione segue direttamente dalla definizione di limite ed è quindi ovvia. $\square$

4.3 Teorema di Unicità del Limite

Teorema 4.3.1: Teorema di Unicità del Limite

Ogni successione regolare ammette **UNO e UN SOLO** limite.

Dimostrazione. Si procede per assurdo:

Supponiamo che:

- $a_n \rightarrow l_1 \in \overline{\mathbb{R}}$
- $a_n \rightarrow l_2 \in \overline{\mathbb{R}}$

con $l_1 \neq l_2$. Essendo $\mathbb{R}$ un campo ordinato, supponiamo senza perdita di generalità che $l_1 < l_2$.




Figura 4.5: Intervalli disgiunti per la dimostrazione per assurdo.

Poiché $l_1 < l_2$, esiste $a \in \mathbb{R}$ tale che $l_1 < a < l_2$. Consideriamo gli intorni disgiunti:

$$I(l_1) =]-\infty, a[, \quad I(l_2) =]a, +\infty[$$

L'intersezione tra questi due intorni è ovviamente vuota:

$$I(l_1) \cap I(l_2) = \emptyset$$

Per ipotesi, $a_n \rightarrow l_1$, allora per questo intorno $I(l_1)$:

$$\exists \nu_1 \in \mathbb{N} : a_n \in I(l_1) \quad \forall n > \nu_1$$

Analogamente, $a_n \rightarrow l_2$ allora per questo intorno $I(l_2)$:

$$\exists \nu_2 \in \mathbb{N} : a_n \in I(l_2) \quad \forall n > \nu_2$$

Poniamo:

$$\nu = \max(\nu_1, \nu_2)$$

Allora $\forall n > \nu$, dovremmo avere:

$$a_n \in I(l_1) \cap I(l_2)$$

Ma $I(l_1) \cap I(l_2) = \emptyset$, ASSURDO. Quindi la nostra ipotesi iniziale era falsa e il limite, se esiste, è **unico**. $\square$

4.4 Proprietà delle successioni numeriche

Definizione 4.4.1: Successione Limitata

Sia assegnata una successione a_n diremo che è:

- **superiormente limitata** se:

$$\exists B \in \mathbb{R} : a_n \leq B \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- **inferiormente limitata** se:

$$\exists A \in \mathbb{R} : A \leq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- **limitata** se lo è sia inferiormente che superiormente.

In quest'ultimo caso:

$$\boxed{A \leq a_n \leq B} \quad \text{oppure} \quad |a_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Osservazione.

Osservazione: Una successione Limitata non per forza converge!!

Esempio.

$$(-1)^n$$

$(-1)^n$ è limitata ma oscillante.

Proposizione 4.4.2

Proposizione 1 (Convergenza $\implies$ Limitatezza)

Sia a_n una successione **convergente**, allora a_n è **limitata**.

$$(a_n \text{ convergente} \implies a_n \text{ limitata}) \not\implies (a_n \text{ limitata} \implies a_n \text{ convergente})$$

Dimostrazione. Poichè $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$ per ipotesi, allora $\forall \epsilon > 0 \exists \nu > 0$ tale che:

$$\boxed{l - \epsilon < a_n < l + \epsilon \quad \forall n > \nu}$$

Sia $\epsilon = 1 \implies \exists \nu > 0$:

$$l - 1 < a_n < l + 1 \quad \forall n > \nu$$

Ma a noi serve $\forall n \in \mathbb{N}$. Allora:

$$E = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{\lfloor \nu \rfloor}, l - 1, l + 1\}$$

Sia $A = \min E$ e $B = \max E$. Allora:

$$A \leq a_n \leq B \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

□

Proposizione 4.4.3**Proposizione 2 (Divergenza positiva)**

Se $a_n \rightarrow +\infty$, allora la successione a_n è **inferiormente limitata**.

Dimostrazione. Per hp $a_n \rightarrow +\infty$ quindi:

$$\forall M > 0 \exists \nu > 0 : a_n > M \quad \forall n > \nu$$

Considero :

$$E = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{[\nu]}, M\}$$

Sia $A = \min E$. Allora per costruzione:

$$a_n \geq A \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Ovvero è inferiormente limitata.

□

Proposizione 4.4.4**Proposizione 3 (Divergenza negativa)**

Se $a_n \rightarrow -\infty$, allora la successione a_n è **superiormente limitata**.

La dimostrazione è lasciata come **esercizio**.

4.5 Successioni Monotone**Definizione 4.5.1: Definizione — Successioni Monotone**

Diremo che una successione a_n è:

- **crescente** ($\nearrow$) se $a_n \leq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$.
- **strettamente crescente** ($\nearrow_S$) se $a_n < a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$.
- **decrescente** ($\searrow$) se $a_n \geq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$.
- **strettamente decrescente** ($\searrow_S$) se $a_n > a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Esempio.

- $\frac{1}{n} \searrow_S$
- $n \nearrow_S$
- $\frac{(-1)^n}{n}$ NON è MONOTONA
- $2^n \nearrow_S$
- $a^n \searrow_S$ se $0 < a < 1$ $\nearrow_S$ se $a > 1$

Proposizione 4.5.2**Teorema di Regolarità delle Successioni Monotone**

Se a_n è una successione **monotona**, allora a_n è **regolare** (ammette limite finito o infinito).

Definizione 4.5.3: Limite di Successioni Monotone

Sia a_n una successione monotona. Allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} \sup_n a_n & \text{se } a_n \text{ è crescente } (\nearrow) \\ \inf_n a_n & \text{se } a_n \text{ è decrescente } (\searrow) \end{cases}$$

Esempio.

1. $a_n = \arctan n$

$a_n \nearrow$, quindi

$$\lim_n \arctan n = \sup a_n = \frac{\pi}{2}$$

2. $a_n = \frac{1}{n}$

$a_n \searrow$, quindi

$$\lim_n \frac{1}{n} = \inf a_n = 0$$

3. $a_n = 2^n$

$a_n \nearrow$, quindi

$$\lim_n 2^n = \sup a_n = +\infty$$

Osservazione.

Osservazione sulla Dimostrazione: La dimostrazione si basa sulle proprietà di $\sup$ e $\inf$ e sull'assioma di completezza di $\mathbb{R}$.

Dimostrazione. Per ipotesi $\boxed{a_n \leq a_{n+1}} \forall n$ e dobbiamo dimostrare che detto $l = \sup_n a_n$ allora $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$.

DUE CASI:

1. **Caso 1** ($l < +\infty$): Dobbiamo dimostrare che:

$$\boxed{\forall \epsilon > 0 \exists \nu : l - \epsilon < a_n < l + \epsilon \quad \forall n > \nu}$$

Sia ϵ fissato. Per la proprietà dell'estremo superiore, si ha che $\exists \nu \in \mathbb{N}$ tale che $l - \epsilon < a_\nu$. Poiché a_n è crescente, per ogni $n > \nu$ si ha $a_n \geq a_\nu$. Inoltre, l è l'estremo superiore, quindi $a_n \leq l$. Quindi, per $\forall n > \nu$:

$$l - \epsilon < a_\nu \leq a_n \leq l < l + \epsilon \quad (\text{tesi})$$

2. **Caso 2** ($l = +\infty$): Dobbiamo dimostrare che:

$$\boxed{\forall M > 0 \exists \nu > 0 : a_n > M \quad \forall n > \nu}$$

Usiamo la proprietà del $\sup a_n = +\infty$: $\forall M > 0 \exists \nu \in \mathbb{N}$ tale che $a_\nu > M$. Poiché a_n è crescente, $\forall n > \nu$ si ha $a_n \geq a_\nu > M$, da cui la tesi.

La dimostrazione per $a_n \searrow$ è analoga. □

Osservazione.

Osservazione sulla Convergenza: a_n è monotona + limitata $\implies a_n$ convergente

4.5.1 Proprietà definitivamente vera

Definizione 4.5.4: Definizione Proprietà Definitivamente Vera

Una proprietà che dipende da $n \in \mathbb{N}$ si dice **DEFINITIVAMENTE** vera se vale da un certo indice n in poi.

Osservazione.

Osservazione sulla Regolarità: Nel Teorema di Regolarità, posso scrivere: "Se a_n è una successione definitivamente **monotona**, allora a_n è **regolare**."

Proposizione 4.5.5

Proposizione (Valore Assoluto)

Se a_n è una successione **convergente** e $a_n \rightarrow l$, allora vale:

$$|a_n| \rightarrow |l|.$$

Dimostrazione. Si usa la disuguaglianza triangolare inversa: $|a - b| \geq ||a| - |b||$.

$$||a_n| - |l|| < |a_n - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu$$

□

Proposizione 4.5.6

Proposizione (Infinitesima)

Si ha che:

$$a_n \rightarrow 0 \iff |a_n| \rightarrow 0.$$

Dimostrazione.

$$||a_n| - |l|| < |a_n - l| \rightarrow ||a_n| - |l|| \leq |a_n|$$

□

Esempio.

Quindi $\frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0$

Perchè:

$$\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{|(-1)^n|}{n} = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

4.6 Algebra dei Limiti

4.6.1 Limiti Fondamentali

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = \begin{cases} +\infty & \alpha > 0 \\ 1 & \alpha = 0 \\ 0 & \alpha < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \begin{cases} +\infty & a > 1 \\ 1 & a = 1 \\ 0 & 0 < a < 1 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log_a n = \begin{cases} +\infty & a > 1 \\ -\infty & 0 < a < 1 \end{cases}$$

Vogliamo sostituire a_n ad n per generalizzare.

4.6.2 Proprietà (Limiti Finiti)

Siano a_n e b_n due successioni **convergenti** tali che:

$$a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}, \quad b_n \rightarrow b \in \mathbb{R}$$

Allora valgono le seguenti proprietà:

1. Somma e differenza

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b$$

Dimostrazione: si utilizza la **disuguaglianza triangolare**.

Dimostrazione.

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| = |(a_n - a) + (b_n - b)|$$

$$|(a_n - a) + (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b|$$

$$\text{Per ipotesi: } |a_n - a| < \frac{\epsilon}{2} \quad \forall n > \nu_1, \quad |b_n - b| < \frac{\epsilon}{2} \quad \forall n > \nu_2$$

Sia $\nu = \max \nu_1, \nu_2$, Allora $\forall n > \nu$

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

QUINDI:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \nu : |(a_n + b_n) - (a + b)| < \epsilon \quad \forall n > \nu$$

□

2. Prodotto

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$$

3. Rapporto

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$$

a patto che $b_n \neq 0$ e $b \neq 0$.

4. Potenza

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n)^{b_n} = a^b$$

con $a_n > 0$ (e quindi $a > 0$).

Tuttavia, **questa non è una condizione necessaria**: in alcuni casi il limite può esistere anche se $a \leq 0$.

Esempi

Esempio.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1-1}{n+1} = \frac{n+1}{n+1} - \frac{1}{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 1 - 0 = 1$$

Esempio.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n + \sqrt{n}}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{n} + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}}{n} = 0 + 0 = 0$$

Esempio.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 3n - 1}{2n - 3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \left(1 + \frac{3}{n} - \frac{1}{n^2}\right)}{n \left(2 - \frac{3}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \left(1 + \frac{3}{n} - \frac{1}{n^2}\right)}{2 - \frac{3}{n}} = +\infty$$

4.6.3 Algebra dei limiti in $\overline{\mathbb{R}}$

Somma e differenza

Siano a_n e b_n due successioni tali che:

$$a_n \rightarrow a \in \overline{\mathbb{R}}, \quad b_n \rightarrow b \in \overline{\mathbb{R}}$$

Allora:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b \text{ (Fatta eccezione del caso } \infty - \infty)$$

e dove si sottintende che:

$$+\infty \pm b = +\infty$$

$$-\infty \pm b = -\infty$$

$$+\infty + +\infty = +\infty$$

$$-\infty - \infty = -\infty$$

Esempi Esempio.

oppure

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n + n = +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n + \frac{1}{n} = +\infty$$

Esempio.

$$a_n = n^2 \text{ e } b_n = n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 - n = n^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - 0) = +\infty$$

$$a_n = n + 1 \text{ e } b_n = n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n - b_n = 1$$

Prodotto

Siano a_n e b_n due successioni tali che:

$$a_n \rightarrow a \in \overline{\mathbb{R}}, \quad b_n \rightarrow b \in \overline{\mathbb{R}}$$

Allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab$$

Fatta eccezione il caso $+\infty \cdot 0$ dove si sottintende $\pm\infty \cdot a = \infty$ con la regola dei segni e $\pm\infty \cdot \pm\infty = \infty$ (con la regola dei segni).

Proposizione 4.6.1

Se a_n è limitata inferiormente e $b_n \rightarrow +\infty$ Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = +\infty$$

Esempio $a_n = n \rightarrow +\infty$ e $b_n = \frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0$

$$a_n b_n = (-1)^n = \text{Indeterminata}$$

Proposizione 4.6.2

Sia a_n limitata e b_n infinitesima. Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$$

Dimostrazione. Sia a_n **limitata**. Ciò implica che:

$$\exists M > 0 : |a_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Sia inoltre $b_n \rightarrow 0$, cioè:

$$\forall \varepsilon_0 > 0 \exists \nu > 0 : |b_n| < \varepsilon_0 \quad \forall n > \nu$$

Vogliamo mostrare che $a_n b_n \rightarrow 0$, ovvero:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \nu_1 > 0 : |a_n b_n| < \varepsilon \quad \forall n > \nu_1$$

Sia $\varepsilon > 0$. Scegliamo $\varepsilon_0 = \frac{\varepsilon}{M}$. Dalla definizione di $b_n \rightarrow 0$, esiste ν tale che $|b_n| < \varepsilon_0$ per $n > \nu$. Scegliendo $\nu_1 = \nu$, abbiamo:

$$|a_n b_n| = |a_n| \cdot |b_n| < M \cdot \varepsilon_0 = M \cdot \left(\frac{\varepsilon}{M}\right) = \varepsilon \quad \forall n > \nu_1$$

Quindi $a_n b_n \rightarrow 0$. □

4.6.4 Forme indeterminate

- $\infty - \infty$
- $\infty \cdot 0$

4.6.5 Esempi finali

Esempio.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + \sqrt{n} - 2(-1)^n + \arctan(n)}{n^3 - 1 + n^2 \cos(n) - n \sin(n)} = 0$$

Esempio.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 3\sqrt{n} + (-1)^n - 2n^2 \arctan(n)}{\sqrt{n} - 3n + n^2} = 1 - \pi$$

Esempio.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\arctan(-n) + \frac{3\sqrt{n} \sin(n)}{\sqrt[3]{n^2 + 1}} + \frac{\pi n + (-1)^n}{n + 1} \right) &= \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(-n) + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3\sqrt{n} \sin(n)}{\sqrt[3]{n^2 + 1}} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi n + (-1)^n}{n + 1} &= \\ = -\frac{\pi}{2} + 0 + \pi &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

4.6.6 Quoziente (in $\overline{\mathbb{R}}$)

Proposizione 4.6.3

Sia $b_n \rightarrow \pm\infty$ allora $\boxed{\frac{1}{b_n} \rightarrow 0}$

Dimostrazione. Supponiamo che $b_n \rightarrow +\infty \implies$

$$\forall M > 0 \exists \nu > 0 : \boxed{b_n > M \forall n > \nu}$$

Per dimostrare la proposizione devo dimostrare che:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu' > 0 : \frac{1}{|b_n|} < \epsilon \forall n > \nu'$$

Scegliendo $M = 1/\epsilon$, dall'ipotesi $\exists \nu$ tale che $\forall n > \nu$

$$b_n > M = \frac{1}{\epsilon}$$

Essendo b_n e ϵ positivi (definitivamente),

$$0 < \frac{1}{b_n} < \epsilon$$

Quindi $\left| \frac{1}{b_n} \right| < \epsilon$ scegliendo $\nu' = \nu$. Quindi $\frac{1}{\infty} = 0$ (IMPORTANTE!!!)

□

Proposizione 4.6.4

Sia $b_n \rightarrow 0$

Dimostrazione. Se $b_n \rightarrow 0 \implies \forall \epsilon > 0 \exists \nu > 0 : |b_n| < \epsilon \quad \forall n > \nu$

$$\forall M > 0 \exists \nu' > 0 : \begin{cases} \frac{1}{b_n} > M \forall n > \nu' & \left(\frac{1}{b_n} \rightarrow +\infty \right) \\ \frac{1}{b_n} < -M \forall n > \nu' & \left(\frac{1}{b_n} \rightarrow -\infty \right) \end{cases}$$

Non posso dire qual è il caso. □

Proposizione 4.6.5

Sia $b_n \rightarrow 0$ e definitivamente **positiva** $\implies \frac{1}{b_n} \rightarrow +\infty$

Sia $b_n \rightarrow 0$ e definitivamente **negativa** $\implies \frac{1}{b_n} \rightarrow -\infty$

Se $b_n \rightarrow 0$ e definitivamente positiva:

$$\exists \nu_1 : b_n > 0 \quad \forall n > \nu_1$$

In sintesi:

$$b_n \rightarrow 0^+$$

Osservazione.

Convenzioni sul Quoziente

$$\begin{aligned} \frac{1}{\infty} &= 0 \\ \frac{1}{0^+} &= +\infty \\ \frac{1}{0^-} &= -\infty \end{aligned}$$

Proposizione 4.6.6

Siano $a_n \rightarrow a \in \overline{\mathbb{R}}, b_n \rightarrow b \in \overline{\mathbb{R}}$

Allora:

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$$

secondo le convenzioni adottate ad eccezione dei casi $\frac{\infty}{\infty}$

4.6.7 Nuova forma indeterminata

Da $0 \cdot \infty$:

- $\frac{\infty}{\infty}$
- $\frac{0}{0}$

4.6.8 Esponenziale

Proposizione 4.6.7

Sia $a > 1$ e sia $a_n \rightarrow l \in \overline{\mathbb{R}}$

Allora:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^{a_n} = \begin{cases} a^l & l \in \mathbb{R} \\ +\infty & l = +\infty \\ 0 & l = -\infty \end{cases}$$

Osservazione.

Convenzioni su Esponenziali e Logaritmi

Caso $a > 1$:

$$\begin{aligned} a^{+\infty} &= +\infty & a^{-\infty} &= 0 \\ \log_a(+\infty) &= +\infty & \log_a(0^+) &= -\infty \end{aligned}$$

Caso $0 < a < 1$:

$$\begin{aligned} a^{+\infty} &= 0 & a^{-\infty} &= +\infty \\ \log_a(+\infty) &= -\infty & \log_a(0^+) &= +\infty \end{aligned}$$

4.6.9 Forma generale degli esponenziali

$$a_n^{b_n} = e^{b_n \log a_n} \quad \text{se } a_n > 0$$

Proposizione 4.6.8

$$a_n^{b_n} \rightarrow \begin{cases} a^b & \text{se } a \in]0, +\infty[\text{ e } b \in \mathbb{R} \\ \uparrow \text{TRANNE F.I. : } (e^{b \log a} \text{ con } b \log a = 0 \cdot \infty) \end{cases}$$

4.6.10 Nuove F.I.

- ∞^0

Esempio.

$$e^{\log a_n} = e^{0 \cdot \infty} = a_n^{b_n} = +\infty^0$$

Proposizione 4.6.9

Se $a_n > 0$ e $a > 0$ allora $a_n^{b_n} \rightarrow a^b$ con le convenzioni adottate tranne:

$$\infty^0 \quad 1^\infty \quad 0^0$$

Osservazione.

Riepilogo: Algebra Estesa dei Limiti ($\overline{\mathbb{R}}$)

Rapporti

$$\begin{aligned}\frac{1}{\infty} &= 0 \\ \frac{1}{0^+} &= +\infty \\ \frac{1}{0^-} &= -\infty\end{aligned}$$

Esponenziali Caso $a > 1$:

$$\begin{aligned}a^{+\infty} &= +\infty \\ a^{-\infty} &= 0\end{aligned}$$

Caso $0 < a < 1$:

$$\begin{aligned}a^{+\infty} &= 0 \\ a^{-\infty} &= +\infty\end{aligned}$$

Logaritmi Caso $a > 1$:

$$\log_a(+\infty) = +\infty$$

Caso $0 < a < 1$:

$$\log_a(+\infty) = -\infty$$

4.7 Teorema della permanenza del segno (t.p.s)

Teorema 4.7.1: Teorema della permanenza del segno

Sia a_n regolare: $a_n \rightarrow a \in \overline{\mathbb{R}}$.

- Se $a > 0$, allora a_n è definitivamente positiva:

$$\exists \nu > 0 : a_n > 0 \quad \forall n > \nu$$

- Se $a < 0$, allora a_n è definitivamente negativa:

$$\exists \nu > 0 : a_n < 0 \quad \forall n > \nu$$

Dimostrazione. Dimostrazione (t.p.s). Sia $a > 0$. Allora per la definizione di limite con gli intorno si ha:

$$\forall I(a) \exists \nu > 0 : a_n \in I(a) \quad \forall n > \nu$$

Scelto come intorno di a la semiretta $]0, +\infty[$, allora si ha la tesi. □

Proposizione 4.7.2**Corollario 1**

Sia a_n regolare e $a_n \rightarrow a \in \overline{\mathbb{R}}$.

- se $a > l$ con $l \in \mathbb{R}$ allora $a_n > l$ definitivamente.
- se $a < l$ con $l \in \mathbb{R}$ allora $a_n < l$ definitivamente.

Dimostrazione. Se prendo $b_n = a_n - l$, questa tende a $a - l > 0$. Basta applicare il t.p.s. alla successione b_n . $\square$

Proposizione 4.7.3**Corollario 2**

Siano $a, b \in \mathbb{R}$, $a_n \rightarrow a$ e $b_n \rightarrow b$.

- Se $a < b$, allora $a_n < b_n$ definitivamente.
- Se $a > b$, allora $a_n > b_n$ definitivamente.

Proposizione 4.7.4**Corollario 3**

Sia $a_n \rightarrow a \in \overline{\mathbb{R}}$. Se $a_n \geq 0$ definitivamente, allora $a \geq 0$. (Analogamente, se $a_n \leq 0$ definitivamente, allora $a \leq 0$).

Dimostrazione. Se per assurdo fosse $a < 0$, allora per il t.p.s. $a_n < 0$ definitivamente, il che è un ASSURDO. $\square$

Proposizione 4.7.5**Corollario 4**

Se $a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$ e $a_n \geq l \in \mathbb{R}$ definitivamente, allora: $a \geq l$.

4.8 Teorema del confronto (Teorema dei carabinieri)**Teorema 4.8.1: Teorema del confronto (Teorema dei carabinieri)**

Valgono le seguenti affermazioni:

1. Siano a_n, b_n, c_n tali che

$$a_n \geq b_n \geq c_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{se } a_n \rightarrow l \in \mathbb{R} \text{ e } c_n \rightarrow l \in \mathbb{R} \implies b_n \rightarrow l$$

2. Se $a_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ e $a_n \rightarrow +\infty$ allora $b_n \rightarrow +\infty$
3. Se $a_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ e $b_n \rightarrow -\infty$ allora $a_n \rightarrow -\infty$

Esempio.

Posso calcolare:

$$\lim_n n! = +\infty$$

perchè $n! > n$

Dimostrazione. (1) Hp:

- $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$
- $c_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$
- $a_n \leq b_n \leq c_n$

Per hp:

$$\begin{aligned} a_n \rightarrow l \in \mathbb{R} &\implies \forall \epsilon > 0 \exists \nu_1 > 0 : l - \epsilon < a_n < l + \epsilon \forall n > \nu_1 \\ c_n \rightarrow l \in \mathbb{R} &\implies \forall \epsilon > 0 \exists \nu_2 > 0 : l - \epsilon < c_n < l + \epsilon \forall n > \nu_2 \\ \forall n > \nu_1 \quad l - \epsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < l + \epsilon \quad \forall n > \nu_2 &\implies \\ l - \epsilon < b_n < l + \epsilon \quad \forall n > \nu = \max\{\nu_1, \nu_2\} & \end{aligned}$$

□

Dimostrazione. (2) Per hp: $a_n \rightarrow +\infty$

$$\forall M > 0 \exists \nu_1 > 0 : a_n > M \quad \forall n > \nu_1$$

Th: $b_n \rightarrow +\infty$ ovvero:

$$\forall M > 0 \exists \nu > 0 : b_n > M \quad \forall n > \nu$$

Per hp: $b_n \geq a_n > M$

$$\forall n \in \mathbb{N}$$

$$\forall n > \nu_1$$

$$\forall n > \nu_2$$

$$\text{Quindi } \forall n > \nu = \max\{\nu_1, \nu_2\}$$

□

4.9 Continuità di Seno e Coseno

Proposizione 4.9.1

Sia $a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$ allora:

- $\sin a_n \rightarrow \sin a$
- $\cos a_n \rightarrow \cos a$

In particolare se $a_n \rightarrow 0$ si ha:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos a_n = 1$$

Dimostrazione. (Continuità del Seno in 0)

Sia $a_n \rightarrow 0$. Th:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = 0$$

Ricordiamo le disuguaglianze notevoli:

$$\text{Se } 0 < x < \frac{\pi}{2} : \quad 0 < \sin x < x$$

$$\text{Se } -\frac{\pi}{2} < x < 0 : \quad x < \sin x < 0$$

Prendendo il valore assoluto in entrambi i casi:

$$\boxed{|\sin x| \leq |x|} \quad \text{per } x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$$

Poiché $a_n \rightarrow 0$, a_n è definitivamente in $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Allora possiamo applicare la disuguaglianza e vale definitivamente: $0 \leq |\sin a_n| \leq |a_n|$

Dato che (per ipotesi) $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$, per il Teorema del Confronto (Carabinieri) anche la successione centrale converge a 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\sin a_n| = 0$$

Questo implica $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = 0$. □

Dimostrazione. (Continuità del Seno in $a \in \mathbb{R}$)

Vogliamo dimostrare che se $a_n \rightarrow a$, allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = \sin a$$

Definiamo una nuova successione $b_n = a_n - a$. Poiché $a_n \rightarrow a$, allora $b_n \rightarrow 0$.

Riscriviamo $a_n = b_n + a$ e usiamo la formula di addizione del seno:

$$\sin a_n = \sin(b_n + a) = \sin(b_n) \cos(a) + \cos(b_n) \sin(a)$$

Calcoliamo il limite di entrambi i membri (notando che $\sin a$ e $\cos a$ sono costanti):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sin(b_n) \cos(a) + \cos(b_n) \sin(a))$$

Per l'algebra dei limiti:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(b_n) \right) \cdot \cos(a) + \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(b_n) \right) \cdot \sin(a)$$

Poiché $b_n \rightarrow 0$, usiamo i risultati già dimostrati per la continuità in 0:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(b_n) = 0$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(b_n) = 1$

Sostituendo questi limiti, otteniamo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin a_n = (0) \cdot \cos(a) + (1) \cdot \sin(a) = \sin a$$

(Nota: La dimostrazione per $\cos a_n \rightarrow \cos a$ è analoga, usando la formula di addizione del coseno). $\square$

4.10 Limiti Notevoli Derivati

1) Sia $a > 0$ allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$$

Dimostrazione: Se $a = 1$ è ovvio. Sia $a > 1$ consideriamo $a_1 = a$ e $a_2 = 1 = a_3 = \dots = a_n$

$$G \leq A \implies \sqrt[n]{a} < \frac{a+n-1}{n} \text{ Quindi}$$

$$1 < \sqrt[n]{a} < \frac{a+n-1}{n}$$

Se $0 < a < 1$:

$$\sqrt[n]{a} = \left(\frac{1}{\sqrt[n]{a}} \right)^{-1} = \left(\sqrt[n]{\frac{1}{a}} \right)^{-1} \rightarrow 1 > \left(\sqrt[n]{\frac{1}{a}} \right)^{-1} > \frac{n}{a+n-1}$$

2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

Dimostrazione:

$$G \leq A$$

$$a_1 = n \quad a_2 = 1 = a_3 = \dots = a_n$$

$$G = \sqrt[n]{n} < \frac{n + n - 1}{n} \rightarrow \text{NO}$$

$$a_1 = \sqrt{n} = a_2 \quad a_3 = \dots = a_n = 1$$

$$G = \sqrt[n]{n} < \frac{2\sqrt{n} + n - 2}{n} = A$$

3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^b} = 1$$

Perchè $(\sqrt[n]{n})^b$ e se $\sqrt[n]{n} = 1$ Allora $(\sqrt[n]{n})^b = 1^b = 1$

4) Se $a_n \rightarrow 0$ allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin a_n}{a_n} = 1$$

Dimostrazione. Sia x un angolo:

$$\boxed{0 < x < \frac{\pi}{2}}$$

$$\sin x < x < \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \implies \boxed{\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1}$$

$$\implies \text{è pari quindi } |x| < \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Allora } \cos a_n < \frac{\sin a_n}{a_n} < 1$$

Calcolando il limite, sia $a \rightarrow dx$ che $a \rightarrow sx$ è 1.

□

5) Se $a_n \rightarrow 0$ allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan a_n}{a_n} = 1$$

Dimostrazione.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin a_n}{\cos a_n} \cdot \frac{1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin a_n}{a_n} \cdot \frac{1}{\cos a_n} = 1 \cdot 1 = 1$$

□

6) Se $a_n \rightarrow 0$ allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos a_n}{a_n} = 0$$

Dimostrazione. (Usa dimostrazione del 7)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos a_n}{a_n} \cdot \frac{a_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos a_n}{a_n^2} \cdot a_n = \frac{1}{2} \cdot 0 = 0$$

□

7) Se $a_n \rightarrow 0$ allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos a_n}{a_n^2} = \frac{1}{2}$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos a_n}{a_n^2} \cdot \frac{1 + \cos a_n}{1 + \cos a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos^2 a_n}{a_n^2(1 + \cos a_n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 a_n}{a_n^2(1 + \cos a_n)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin a_n}{a_n} \right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos a_n} = 1^2 \cdot \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

4.10.1 Esempi

Esempio.

Se $a_n \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$ allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tan a_n = \frac{\sin a_n}{\cos a_n} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

Esempio.

Se $a_n \rightarrow \frac{\pi}{2}$ allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tan a_n = \cancel{\exists}$$

Esempio.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + (-1)^n + n^2 \sin\left(\frac{1}{n}\right) - \sqrt{n}}{\sqrt{n} \arctan n - n + \sqrt{n} \sin n + n \tan\left(\frac{1}{n}\right)} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left(2 + \frac{(-1)^n}{n} + n \sin\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)}{n \left(\frac{\arctan n}{\sqrt{n}} - 1 + \frac{\sin n}{\sqrt{n}} + \tan\left(\frac{1}{n}\right) \right)} \\ = \frac{2 + 0 + 1 - 0}{0 - 1 + 0 + 0} = -3 \end{aligned}$$

Esempio.

$$\begin{aligned}
& \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n+1) - \log(n^3 - 2) - \sqrt[3]{n+1}}{\log n - 2 \log(n^2 - 1) + (-1)^n} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log\left(n\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) - \log\left(n^3\left(1 - \frac{2}{n^3}\right)\right) - \sqrt[3]{n+1}}{\log n - 2 \log\left(n^2\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)\right) + (-1)^n} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\log n + \log\left(1 + \frac{1}{n}\right)] - [3 \log n + \log\left(1 - \frac{2}{n^3}\right)] - \sqrt[3]{n+1}}{\log n - 2 [2 \log n + \log\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)] + (-1)^n} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2 \log n + \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \log\left(1 - \frac{2}{n^3}\right) - \sqrt[3]{n+1}}{-3 \log n - 2 \log\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) + (-1)^n} \\
&= \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}
\end{aligned}$$

Esempio.

Grazie al Teorema del confronto possiamo dimostrare l'esempio 8 delle successioni numeriche

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = 2Rn \sin \frac{\pi}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2Rn \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} \frac{\pi}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2R\pi \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} = 2R\pi \cdot 1 = 2R\pi$$

4.11 Teorema sul numero di Nepero

La successione $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ è convergente e si pone:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

e si chiama numero di nepero e: $e \sim 2.718\dots$

Per calcolarlo, pongo 3 successioni: $a_n < b_n < c_n$ con a_n e c_n rispettivamente leggermente più o meno grandi di e . Più “stringo”, più trovo b_n precisamente. (Metodo di Esaustione).

Dimostrazione. Bisogna dimostrare che $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ è convergente: 1. $a_n \nearrow_S$ 2. a_n è limitata

Per dimostrare che è $\nearrow_S$: devo dimostrare che $a_n < a_{n+1}$ ovvero:

$$\boxed{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}$$

Allora: uso $G \leq A$ oppure il principio di induzione + la disuguaglianza di Bernoulli.

$$G \leq A \quad x_1 = 1 + \frac{1}{n} = x_2 = \cdots = x_n \quad x_{n+1} = 1$$

Posso scrivere $<$ stretto perchè i termini non sono tutti uguali

$$G = \sqrt[n+1]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} < \frac{n\left(1 + \frac{1}{n}\right) + 1}{n+1} = A$$

$$\sqrt[n+1]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} < \frac{n+1+1}{n+1}$$

$$\sqrt[n+1]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} < 1 + \frac{1}{n+1}$$

$$\boxed{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}$$

È definitivamente crescente. Quindi “ e ” è il sup quindi $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e$ e il sup è un maggiorante.

Si consideri la successione:

$$b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) > a_n$$

Voglio dimostrare che b_n è decrescente, quindi il suo limite sarebbe il suo inf, $\sup a_n = \inf b_n$ quindi l'elemento separatore = e .

$$\textcolor{brown}{b_1} > \underset{(\searrow_S)}{b_n} > e > \underset{(\nearrow_S)}{a_n} > \textcolor{brown}{a_1}$$

$$b_n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} \quad \text{deve essere decrescente.}$$

$$\text{Consideriamo } c_n = \frac{1}{b_{(n-1)}} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n. \quad \text{Dimostreremo che } c_n \nearrow_S.$$

$$\text{Verifica: } b_{(n-1)} = \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n = \left(\frac{n-1+1}{n-1}\right)^n = \left(\frac{n}{n-1}\right)^n$$

$$\Rightarrow \frac{1}{b_{(n-1)}} = \left(\frac{n-1}{n}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = c_n.$$

Se $c_n \nearrow_s$ allora $b_n \searrow_S$ Considero:

$$\begin{aligned}
x_1 &= \left(1 - \frac{1}{n}\right) = x_2 = \dots = x_n, \quad x_{n+1} = 1 \\
G &< A \quad \sqrt[n+1]{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n} < \frac{n\left(1 - \frac{1}{n}\right) + 1}{n+1} \\
\sqrt[n+1]{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n} &< \frac{n-1+1}{n+1} \\
\sqrt[n+1]{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n} &< \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \\
\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n &< \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \implies \nearrow_S \\
b_1 &> \underset{(\searrow_S)}{b_n} > e > \underset{(\nearrow_S)}{a_n} > a_1
\end{aligned}$$

Quindi:

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} b_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e \\
\inf b_n &= e = \sup a_n \\
\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} &= b_n > \inf b_n = e = \sup a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\
\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} &> e > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \forall n \in \mathbb{N}
\end{aligned}$$

Calcolo una stima (n a dx e a sx non devono essere necessariamente uguali):

$$\left(1 + \frac{1}{400}\right)^{401} > e > \left(1 + \frac{1}{200}\right)^{200} \rightarrow 2,722 > e > 2,711$$

□

4.11.1 Limite Notevole di e

Proposizione 4.11.1

Sia $a_n \rightarrow a$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$$

Dimostrazione. Sia $a_n \rightarrow +\infty$:

$$[a_n] \leq a_n \leq [a_n] + 1$$

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{[a_n] + 1}\right)^{[a_n]} &\leq \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} \leq \left(1 + \frac{1}{[a_n]}\right)^{[a_n] + 1} \\ \left(1 + \frac{1}{[a_n] + 1}\right)^{-1} \left(1 + \frac{1}{[a_n] + 1}\right)^{[a_n] + 1} &\leq \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} \leq \left(1 + \frac{1}{[a_n]}\right)^{[a_n]} \left(1 + \frac{1}{[a_n]}\right) \end{aligned}$$

Calcolando il limite:

$$1 \cdot e \leq \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} < e \cdot 1$$

Idem per $-\infty$

□

Limiti Derivati dal limite notevole di e

Con $a_n \rightarrow 0$

•

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}} = e$$

•

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(1 + a_n)}{a_n} = \log(1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}} = \log e = 1$$

•

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{a_n} - 1}{a_n} \implies e^{a_n} - 1 = y \implies \frac{y}{\log(y + 1)} = 1$$

Proposizione 4.11.2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + a_n)^\alpha - 1}{a_n} = \alpha \quad (\text{Perch ?})$$

Dimostrazione.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + a_n)^\alpha - 1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\log((1 + a_n)^\alpha)} - 1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\alpha \log(1 + a_n)} - 1}{a_n}$$

Moltiplichiamo e dividiamo per $\alpha \log(1 + a_n)$:

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{\alpha \log(1 + a_n)} - 1}{\alpha \log(1 + a_n)} \right] \cdot \left[\frac{\alpha \log(1 + a_n)}{a_n} \right]$$

Poich  $a_n \rightarrow 0$, anche $\alpha \log(1 + a_n) \rightarrow 0$. Per i limiti notevoli:

$$\begin{aligned} &= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\alpha \log(1 + a_n)} - 1}{\alpha \log(1 + a_n)} \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha \frac{\log(1 + a_n)}{a_n} \right) \\ &= 1 \cdot (\alpha \cdot 1) = \alpha \end{aligned}$$

□

Dimostrazione.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+a_n)^\alpha - 1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\log((1+a_n)^\alpha)} - 1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\alpha \log(1+a_n)} - 1}{a_n}$$

Moltiplichiamo e dividiamo per $\alpha \log(1+a_n)$:

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{\alpha \log(1+a_n)} - 1}{\alpha \log(1+a_n)} \right] \cdot \left[\frac{\alpha \log(1+a_n)}{a_n} \right]$$

Poiché $a_n \rightarrow 0$, anche $\alpha \log(1+a_n) \rightarrow 0$. Per i limiti notevoli:

$$= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\alpha \log(1+a_n)} - 1}{\alpha \log(1+a_n)} \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha \frac{\log(1+a_n)}{a_n} \right) \\ = 1 \cdot (\alpha \cdot 1) = \alpha$$

□

4.12 Confronto di infiniti con i rapporti

Confrontiamo i vari tipi di successioni utilizzando i rapporti

4.12.1 Confronto tra Medie di Successioni

Definizione 4.12.1: Media Aritmetica di una successione

Sia a_n una successione tale che $a_n \geq 0$. Si definisce **successione delle medie aritmetiche** la successione A_n definita come:

$$A_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

Esempio.

Se $a_n = n$, i termini della successione sono $1, 2, 3, 4, \dots$

- $A_1 = \frac{a_1}{1} = \frac{1}{1} = 1$
- $A_2 = \frac{a_1 + a_2}{2} = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2}$
- $A_3 = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} = \frac{1+2+3}{3} = \frac{6}{3} = 2$

Definizione 4.12.2: Media Geometrica

Sia a_n una successione tale che $a_n \geq 0$. Si definisce **successione delle medie geometriche** la successione G_n definita come:

$$G_n = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \cdots \cdot a_n}$$

Esempio.

Se $a_n = n$, allora:

$$G_3 = \sqrt[3]{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3} = \sqrt[3]{1 \cdot 2 \cdot 3} = \sqrt[3]{6}$$

Teorema di Cesaro sulle medie Aritmetiche**Proposizione 4.12.3**

Se a_n una successione regolare, anche A_n è regolare e risulta:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$$

Dimostrazione. Sia $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$. (Primo Caso)

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu_1 > 0 : |a_n - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu_1$$

(Th) Tesi:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu > 0 : |A_n - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu$$

Sia $\epsilon > 0$ e sia $[\nu_1]$ che trovo per ipotesi. Vado a stimare $|A_n - l|$:

$$\begin{aligned} |A_n - l| &= \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - l \right| = \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n - nl}{n} \right| \\ &= \left| \frac{(a_1 - l) + (a_2 - l) + \cdots + (a_n - l)}{n} \right| \end{aligned}$$

Spezziamo la somma (per $n > [\nu_1]$) e usiamo la disuguaglianza triangolare:

$$|A_n - l| \leq \left| \frac{(a_1 - l) + \cdots + (a_{[\nu_1]} - l)}{n} \right| + \left| \frac{(a_{[\nu_1]+1} - l) + \cdots + (a_n - l)}{n} \right|$$

Ora analizziamo i due addendi:

1. **Primo Addendo:** Il numeratore $K = |a_1 - l| + \cdots + |a_{[\nu_1]} - l|$ è una quantità fissa (una costante), dato che ν_1 è fisso. Il termine $\frac{K}{n} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$. Per la definizione di limite, $\exists \nu_2 > 0$ tale che:

$$\frac{|a_1 - l| + \cdots + |a_{[\nu_1]} - l|}{n} < \epsilon \quad \forall n > \nu_2$$

2. **Secondo Addendo:** Per ipotesi, $\forall n > [\nu_1]$ si ha $|a_n - l| < \epsilon$. I termini da $[\nu_1] + 1$ a n sono $(n - [\nu_1])$.

$$\frac{|a_{[\nu_1]+1} - l| + \cdots + |a_n - l|}{n} < \frac{(n - [\nu_1])\epsilon}{n} \leq \frac{n\epsilon}{n} = \epsilon$$

Questo vale $\forall n > [\nu_1]$.

Conclusione: Scelgo $\nu = \max\{\nu_1, \nu_2\}$. Per ogni $n > \nu$ valgono entrambe le maggiorazioni:

$$|A_n - l| \leq (\text{Primo Addendo}) + (\text{Secondo Addendo}) < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon$$

Data l'arbitrarietà di ϵ , questo dimostra la tesi. □

4.12.2 Teorema di Cesaro sulle medie Geometriche

Proposizione 4.12.4

Se $a_n > 0 \forall n$ e a_n è regolare, anche G_n è regolare e risulta:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} G_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$$

Dimostrazione.

$$G_n = \sqrt[n]{a_1 \dots a_n}$$

$$\log G_n = \log \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} = \frac{\log a_1 + \log a_2 + \dots + \log a_n}{n}$$

$$b_n = \log a_n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log G_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} G_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$$

□

Esempio.

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ è dispari} \\ 2 & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \quad (\text{non ha limite})$$

$$G_n = \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} = \begin{cases} \sqrt[n]{2^{\frac{n-1}{2}}} \rightarrow \sqrt{2} \\ \sqrt[n]{2^{\frac{n}{2}}} \rightarrow \sqrt{2} \end{cases}$$

Esempio.

$$A_n = \begin{cases} \frac{3n-1}{2n} & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \frac{3}{2} & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \rightarrow \frac{3}{2}$$

Teorema criterio Rapporto Radice**Proposizione 4.12.5**

Sia a_n una successione $a_n > 0 \forall n$ Se $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ è regolare allora anche $\sqrt[n]{a_n}$ è regolare e risulta:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n}$$

Esempio.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1!}{n!} = n+1 = +\infty$$

Dimostrazione. Consideriamo

$$a_1, \frac{a_2}{a_1}, \frac{a_3}{a_2}, \dots, \frac{a_n}{a_{n-1}}$$

$$G_n = \sqrt[n]{a_1 \cdot \frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdot \dots \cdot \frac{a_n}{a_{n-1}}} = \sqrt[n]{a_n}$$

Per Cesaro:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} G_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$$

□

Esempio.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} &= \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{(n+1)}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \\ &= \frac{n!(n+1)}{(n+1)^n(n+1)} \cdot \frac{n^n}{n!} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n} \right)^n} = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

Teorema criterio della Radice

Proposizione 4.12.6

Criterio della radice (per le successioni) Sia $a_n \geq 0$ una successione.

Se $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l \implies$ si ha:

1. $l > 1 \implies a_n$ diverge pos $\implies \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$
2. $l < 1 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0 \implies a_n$ infinitesima

Dimostrazione. Dimostriamo 1 ($l > 1$) Se $l > 1$ $a_n \rightarrow +\infty$. Scelto ϵ t.c. $l - \epsilon > 1 \implies \exists \nu$ t.c. $\forall n > \nu \implies \sqrt[n]{a_n} > l - \epsilon > 1$. $a_n > (l - \epsilon)^n \rightarrow +\infty$. per il tes. del conf diverge. □

Dimostrazione. Dimostriamo 2 ($l < 1$) Sia $l < 1$. Th: $a_n \rightarrow 0$. Sappiamo che $a_n \geq 0$. Scegliamo ϵ t.c. $l + \epsilon < 1$. $\exists \nu$ t.c. $\forall n > \nu \implies \sqrt[n]{a_n} < l + \epsilon < 1$. Dunque $0 \leq a_n < (l + \epsilon)^n$. Per $n \rightarrow +\infty$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (l + \epsilon)^n = 0$. Dunque per i carabinieri $a_n \rightarrow 0$. □

Teorema criterio del Rapporto

Proposizione 4.12.7

Criterio del rapporto (per le succ)

Sia $a_n > 0$ una successione tale che $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \implies$

1. se $l > 1 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$
2. se $l < 1 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

Dimostrazione. Banale!! Si applica il criterio R-R. □

4.12.3 Teorema Gerarchia degli Infiniti

Proposizione 4.12.8

Teorema: Gerarchia degli Infiniti (Siano $a > 1, b > 0$) Vale la seguente gerarchia degli infiniti:

$$\boxed{\log_a n; n^b; a^n; n!; n^n}$$

Ovvero:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n^b} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^b}{a^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

(1) (2) (3) (4)

Esempio.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + n^2 - 3 \sin n + \log n}{3^n + \sqrt[n]{n} - n! + n^2} = 0$$

La Gerarchia **NON VALE PER LE COMPOSTE**

Esempio.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log(n^3 + 1) - \log(n^2 + 2)}{3 \log n} = ?$$

Dimostrazione. Dimostrazione Teorema Gerarchia degli Infiniti Dimostriamo nell'ordine:
(4) $\rightarrow$ (1)

- (4) = 0 Utilizzo Criterio Radice

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e} \implies l = \frac{1}{e} < 1$$

Allora per il criterio della radice:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

- (3) = 0 Utilizzo Criterio Radice

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{a^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{\sqrt[n]{n!}} \rightarrow \frac{a}{+\infty} = 0 = l < 1 \quad \text{Allora (3) = 0}$$

- (2) = 0 Utilizzo Criterio Radice

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^b}}{a^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^b}}{a} = \frac{1}{a} = l < 1 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^b}{a^n} = 0$$

- (1) = 0 Sia $b = 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \log_a(n^{\frac{1}{n}}) = \log_a \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \right) = \log_a 1 = 0$$

Sia $b > 0$; $a = 2$ (posso dimostrarlo per $a = 2$ e poi fare il cambiamento di base.)

Th.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{n^b} = 0$$

Osserviamo che per ogni $x > 0$ vale la disuguaglianza $x \geq \log_2 x$. Poniamo $x = n^{b/2}$. Poiché $b > 0$, per $n \geq 1$, $x > 0$. Dalla disuguaglianza $x \geq \log_2 x$ otteniamo:

$$n^{b/2} \geq \log_2(n^{b/2})$$

Ora manipoliamo la frazione di cui vogliamo il limite:

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{\log_2 n}{n^b} &= \frac{\log_2 ((n^{b/2})^{2/b})}{(n^{b/2})^2} = \frac{\frac{2}{b} \log_2(n^{b/2})}{(n^{b/2})^2} \\ &= \frac{2}{b} \cdot \frac{\log_2(n^{b/2})}{n^{b/2} \cdot n^{b/2}} \\ &= \frac{2}{b} \cdot \frac{1}{n^{b/2}} \cdot \left(\frac{\log_2(n^{b/2})}{n^{b/2}} \right) \end{aligned}$$

Usando la disuguaglianza $n^{b/2} \geq \log_2(n^{b/2})$, sappiamo che $\left(\frac{\log_2(n^{b/2})}{n^{b/2}} \right) \leq 1$. Quindi possiamo migliorare:

$$0 \leq \frac{\log_2 n}{n^b} \leq \frac{2}{b} \cdot \frac{1}{n^{b/2}} \cdot (1) = \frac{2}{b} \cdot \frac{1}{n^{b/2}}$$

Poiché $b > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{b} \frac{1}{n^{b/2}} = 0$. Per il Teorema dei Carabinieri, si conclude:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{n^b} = 0$$

□

4.13 Successioni estratte

Definizione 4.13.1: Successione Estratta

Sia a_n una successione. Sia n_k una successione di indici in $\mathbb{N}$ strettamente crescente. Allora la successione a_{n_k} si chiama **Estratta** o **Sottosuccessione di a_n** :

$$a_{n_k} : k \in \mathbb{N} \rightarrow a_{n_k} \in \mathbb{R}$$

Osservazione.

Per gli indici vale la relazione:

$$n_k \geq k$$

Proposizione 4.13.2

Se a_n è una successione regolare allora ogni sua estratta tende allo stesso limite.

Esempio.

Consideriamo $a_n = (-1)^n$.

$$(-1)^n = \begin{cases} a_{2n} \rightarrow 1 \\ a_{2n+1} \rightarrow -1 \end{cases}$$

Poiché i limiti sono diversi, $(-1)^n$ non converge.

Dimostrazione. Supponiamo che $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$.

$$\forall \epsilon > 0, \exists \nu > 0 : |a_n - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu$$

Sia n_k una successione di indici strettamente crescenti e consideriamo una estratta $\{a_{n_k}\}_k$. Scelto ϵ devo dimostrare che $|a_{n_k} - l| < \epsilon \quad \forall k > \nu$.

Poiché $n_k \geq k$, basta prendere il ν della convergenza di a_n . □

Proposizione 4.13.3

Se a_{2n} e a_{2n+1} hanno lo stesso limite allora a_n è regolare e ha come limite lo stesso limite.

Esempio.

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \left(\frac{1}{2}\right)^n & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \rightarrow 0$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} a_{2n} \rightarrow l \in \mathbb{R} &\implies \exists \nu_1 : |a_{2n} - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu_1 \\ a_{2n+1} \rightarrow l \in \mathbb{R} &\implies \exists \nu_2 : |a_{2n+1} - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu_2 \end{aligned}$$

Quindi:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \nu > 0 : |a_n - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu \quad \text{con } \nu = \max\{\nu_1, \nu_2\}$$

□

4.13.1 Teorema di Bolzano Weierstrass

Teorema 4.13.4: Teorema di Bolzano Weierstrass

Sia a_n limitata. Allora:

$$\exists a_{n_k} \text{ convergente}$$

Dimostrazione. Per Hp a_n è limitata. Quindi $\exists A, B \in \mathbb{R}$:

$$A < a_n < B \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Se considero la successione:

$$b_n = \inf_{k \geq n} a_k < +\infty \quad \nearrow$$

Allora $\exists l' = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \sup_n b_n \in \mathbb{R}$ e posso chiamarlo **Minimo Limite di a_n** oppure: $\liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

Analogamente, se considero la successione:

$$c_n = \sup_{k \geq n} a_k < +\infty \quad \searrow$$

Allora $\exists l'' = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \inf_n c_n \in \mathbb{R}$ e posso chiamarlo **Massimo Limite di a_n** oppure: $\limsup_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

Dimostriamo che si può costruire $\{a_{n_k}\}_k$ tale che $a_{n_k} \rightarrow l'$ con $k \rightarrow +\infty$ (la stessa cosa si può fare per l''). Per definizione di l' questo significa che scelto:

$$\epsilon > 0 \quad \exists \nu : |a_{n_k} - l'| < \epsilon \quad \forall k > \nu$$

oppure

$$z_k \leq a_{n_k} \leq d_k \quad (\text{Con } z_k, d_k \rightarrow l')$$

Allora l' e l'' sono in $\mathbb{R}$.

Dimostriamo che si possono costruire $z_k, d_k \rightarrow l'$. Essendo $l' = \sup b_n = \lim_n b_n$, allora:

$$\begin{aligned} \forall \epsilon > 0 \exists \nu_1 > 0 : \forall n > \nu_1 \quad |b_n - l'| < \epsilon &\implies \\ \implies \left| \inf_{k \geq n} a_k - l' \right| < \epsilon &\implies \\ \implies l' - \epsilon < \inf_{k \geq n} a_k < l' + \epsilon \quad \forall n > \nu & \end{aligned}$$

Sia $\epsilon = 1$. Allora:

$$\exists \nu_1 : l' - 1 < \inf_{k \geq n} a_k < l' + 1 \quad \forall n > \nu_1 \implies \exists \substack{n_1 \\ (\text{Più piccolo})} > \nu_1 : \boxed{l' - 1 < a_{n_1} < l' + 1}$$

Sia $\epsilon = \frac{1}{2}$. Allora:

$$\exists \nu_2 : l' - \frac{1}{2} < \inf_{k \geq n} a_k < l' + \frac{1}{2} \quad \forall n > \nu_2$$

Sia $n_2 > n_1$ tale che $l' - \frac{1}{2} < a_{n_2} < l' + \frac{1}{2}$. Iterando, costruisco a_{n_k} :

$$l' - \frac{1}{k} < a_{n_k} < l' + \frac{1}{k} \quad \forall k$$

□

Corollario 4.13.5

Se a_n è limitata $\exists$ due estratte che convergono a l' e l'' .

$a_n \rightarrow l \in \mathbb{R} \iff \exists 2$ estratte che si complementano (Spesso, pari e dispari).

Esempio.

$$a_n = \arctan((-1)^n n)$$

$$\liminf_n a_n = -\frac{\pi}{2}$$

$$\limsup_n a_n = \frac{\pi}{2}$$

Proposizione 4.13.6

Ipotesi: Sia a_n limitata. Tesi:

$$a_n \rightarrow l \iff \liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow +\infty} a_n = l$$

Osservazione.

La seguente dimostrazione è una classica domanda all'orale.

Dimostrazione. ($\implies$)

$$a_n \rightarrow l \implies \forall a_{n_k} \implies a_{n_k} \rightarrow l$$

Poiché $\exists a_{n_k} \rightarrow l'$ e $a_{n_k} \rightarrow l'' \implies l' = l'' = l$.

($\impliedby$) Per Hp:

$$l' = \liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup_{b_n} \left(\inf_{k \geq n} a_k \right) = l$$

$$l'' = \limsup_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf_{c_n} \left(\sup_{k \geq n} a_k \right) = l$$

Per la caratterizzazione dell'inf e del sup:

$$\begin{aligned}
&\forall \epsilon > 0 \quad \exists \nu_1, \nu_2 > 0 : \\
&\exists c_{\nu_2}, b_{\nu_1} : \\
&l'' + \epsilon > c_{\nu_2} = \sup_{k \geq \nu_2} a_k \geq a_k \quad \forall k > \nu_2 \\
&l' - \epsilon < b_{\nu_1} = \inf_{k \geq \nu_1} a_k \leq a_k \quad \forall k > \nu_1 \\
&\nu > \max\{\nu_1, \nu_2\}
\end{aligned}$$

Quindi:

$$\liminf_n a_n \leq \lim_n a_n \leq \limsup_n a_n$$

(Nota: ν come indice è un abuso di notazione, si dovrebbe usare $[\nu]$). □

Proposizione 4.13.7

Seno e Coseno non hanno limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos n = \nexists$$

Dimostrazione. (Usa Prostaferesi: $\sin x - \sin y = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$).

Pongo $x = n + 1$ e $y = n - 1$. Supponiamo per assurdo che il limite $\exists s \in \mathbb{R}$. Quindi per Hp:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n = s$$

$$\sin(n + 1) - \sin(n - 1) = 2 \cos n \sin 1$$

Queste quantità tendono a:

$$s - s = 0$$

$$\text{Se } \lim_{n \rightarrow \infty} \sin n = s \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \cos n = 0 \text{ e } \cos(n + 1) \rightarrow 0 \text{ essendo estratta da } \cos n$$

$$(\cos n \cos 1 - \sin n \sin 1) \rightarrow 0 - s \sin 1 \rightarrow 0 \implies s = 0$$

$$\forall n, \sin^2 n + \cos^2 n = 1 \rightarrow 0 + 0 = 1 \quad \text{ASSURDO.}$$

□

4.13.2 Teorema Criterio di Cauchy

Teorema 4.13.8: Criterio di Cauchy

Sia a_n una successione. a_n convergente a $l \in \mathbb{R} \iff a_n$ verifica la seguente condizione (detta di Cauchy):

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu > 0 : |a_n - a_m| < \epsilon \quad \forall n, m > \nu$$

$$|a_n - a_m| = \boxed{a_m - \epsilon < a_n < \epsilon + a_m}$$

Dimostrazione. a_n convergente $\iff a_n$ è di Cauchy.

($\implies$)

$$a_n \rightarrow l \in \mathbb{R} \implies \forall \epsilon > 0 \exists \nu > 0 : |a_n - l| < \epsilon \quad \forall n > \nu$$

Preso $\epsilon > 0$ vado a stimare:

$$a_n - a_m = |a_n - l + l - a_m| \leq |a_n - l| + |a_m - l| < 2\epsilon \quad \text{Se } n, m > \nu$$

($\impliedby$) $\boxed{a_m - \epsilon < a_n < \epsilon + a_m} \implies$ Se prendo $\epsilon = 1 \implies \exists \nu_1 :$

$$a_m - 1 < a_n < 1 + a_m \quad \forall n, m > \nu_1$$

Fissando $\bar{m} > \nu_1$ allora:

$$a_{\bar{m}} - 1 < a_n < 1 + a_{\bar{m}} \quad \forall n > \nu_1$$

Allora $a < a_n < b \quad \forall n > \nu_1 \implies a_n$ LIMITATA $\implies \exists a_{n_k}$ convergente.

Sfruttando la convergenza della sottosuccessione e la proprietà di Cauchy si conclude la dimostrazione (nota: l'ultima riga del tuo testo originale sembrava tronca, ho chiuso logicamente il pensiero). $\square$

Capitolo 5

Limiti di funzioni

5.1 Definizioni

5.1.1 Intorni

Definizione 5.1.1: Intorni

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$, un Intorno $I(x_0)$ di x_0 è un intervallo aperto contenente x_0 .

- Un intorno **Simmetrico** di x_0 di ampiezza $\delta > 0$ è un intervallo del tipo:

$$]x_0 - \delta, x_0 + \delta[= I_\delta(x_0)$$

- Un intorno **Sinistro** di x_0 è un intervallo del tipo:

$$]x_1, x_0[\text{ con } x_1 < x_0 = I^-(x_0)$$

- Un intorno **Destro** di x_0 è un intervallo del tipo:

$$]x_0, x_2[\text{ con } x_2 > x_0 = I^+(x_0)$$

5.1.2 Punti d'accumulazione

Definizione 5.1.2: Punti d'Accumulazione

Se $A \subseteq \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Diremo che x_0 è un **punto di accumulazione** per A se $\forall I(x_0) \exists$ almeno un punto di A diverso da x_0 ovvero:

$$\forall I(x_0) \implies I(x_0) \cap A \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$$

Un modo equivalente è:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \bar{x} \in A : 0 < |\bar{x} - x_0| < \epsilon \implies x_0 - \epsilon < \bar{x} < x_0 + \epsilon$$

Osservazione.

- $+\infty$ è un pto di accumulazione per $A \iff A$ non è superiormente limitato
- $-\infty$ è un pto di accumulazione per $A \iff A$ non è inferiormente limitato

Esempio.

- $A = \{\frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}\} \quad x_0 = 0 \notin A$
- $A = \mathbb{N} \quad +\infty$
- $A =]0, 1[\quad [0, 1]$
- $A = \mathbb{Q} \quad \overline{\mathbb{R}}$ (Per il lemma di densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$)

Proposizione 5.1.3

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$.

x_0 è di acc. per A
(1)

$\iff$

$\exists x_n$ una successione :
 $x_n \in A$
 $x_n \neq x_0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
 $x_n \rightarrow x_0$

(2)

Dimostrazione. ($\Leftarrow$) (2) Per Hp:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu : |x_n - x_0| < \epsilon \quad \forall n > \nu \implies x_0 \text{ di acc}$$

oppure

$$\forall I(x_0) \exists \nu : x_n \in I(x_0) \quad \forall n > \nu$$

($\implies$) (1) Per Hp:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \bar{x} \in A : 0 < |\bar{x} - x_0| < \epsilon$$

Preso $\epsilon = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{\exists x_n \in A \forall n} \text{ e } \boxed{x_n \neq x_0 \forall n} : 0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n} \implies x_n \rightarrow x_0$$

□

5.1.3 Teorema di Bolzano

Teorema 5.1.4: Teorema di Bolzano

Ogni insieme **Limitato** e **infinito** di $\mathbb{R}$ ammette almeno un punto di accumulazione.

Dimostrazione. Poiché l'insieme A è infinito, contiene una successione x_n di punti tutti diversi tra loro. Per il **Teorema di Bolzano-Weierstrass** (vedi capitolo Successioni) $\exists x_{n_k} \in A : x_{n_k} \rightarrow l \in \mathbb{R}$ e l è di accumulazione. □

5.1.4 Insiemi Aperti e Chiusi e Compatto

Definizione 5.1.5: Aperto

Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice aperto se:

$$\forall x_0 \in A \exists I(x_0) \subseteq A$$

Esempio.

$]0, 1[$ SÌ
 $[0, 1[$ NO

Definizione 5.1.6: Chiuso

$C \subseteq \mathbb{R}$ si dice chiuso se il suo complementare $\mathbb{R} \setminus C$ è aperto.

Esempio.

$C : [0, 1]$
 $\mathbb{R} \setminus C =]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[$

Proposizione 5.1.7

$C \subseteq \mathbb{R}$ è chiuso $\iff$ contiene tutti i suoi punti di accumulazione

Dimostrazione. ($\implies$) Se C è chiuso $\implies \mathbb{R} \setminus C = A$ è aperto. Sia $x_0 \in \mathbb{R}, x_0$ di accumulazione per C . Se per assurdo $x_0 \notin C$ allora $x_0 \in A$; essendo A aperto:

$$\exists I(x_0) \subseteq A \implies I(x_0) \cap C = \emptyset \text{ ASSURDO}$$

($\impliedby$) Sia $A = \mathbb{R} \setminus C$. Se per assurdo A non è aperto, $\exists x_0 \in A : \forall n \in \mathbb{N}$, preso $\epsilon = \frac{1}{n}$:

$$\exists x_n : |x_n - x_0| < \frac{1}{n} \text{ ma } x_n \in C \text{ (} x_n \neq x_0 \text{)} \quad x_n \rightarrow x_0 \in C$$

ASSURDO. Allora A è aperto. □

Proposizione 5.1.8

$C \subseteq \mathbb{R}$ è chiuso $\iff$ contiene i limiti di tutte le sue successioni

Dimostrazione. Per esercizio. □

Definizione 5.1.9: Compatto

$K \subseteq \mathbb{R}$ si dice compatto se da ogni sua successione se ne può estrarre una convergente ad un elemento di K .

5.1.5 Teorema di Heine-Borel**Teorema 5.1.10: Teorema di Heine-Borel**

$K \subseteq \mathbb{R}$ è compatto $\iff K$ è chiuso e limitato.

Dimostrazione. ($\Leftarrow$) Sia $x_n \in K$. La limitatezza ci dice che $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in \mathbb{R}$. La chiusura ci dice che $\exists x_{n_k} \rightarrow x_0 \in K$.

($\Rightarrow$) Sia $x_n \in K$ convergente a $x_0 \in K$. K è chiuso. Se per assurdo K non è limitato, allora $\exists x_n \rightarrow +\infty$. Ma $x_n \in K$ deve ammettere una sottosuccessione convergente ad un elemento di K (per l'ipotesi di compattezza), il che è assurdo. $\square$

Esempio.

$[1, 2] \cup [3, 5] \cup [6, 7]$

5.2 Teoria dei Limiti**5.2.1 Dai Limiti di Successioni a quelli di Funzioni****Definizione 5.2.1: Limite di Funzione**

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto di accumulazione per A . Diremo che f converge o tende ad $l \in \mathbb{R}$ per $x \rightarrow x_0$ e scriveremo:


$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

Se $\forall x_n \in A \forall n, x_n \neq x_0 \forall n, x_n \rightarrow x_0$ risulta:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$$

Esempio.

$A =]0, +\infty[, x_0 = 0$ p.a.



$$\forall x_n \in]0, +\infty[\quad x_n \rightarrow 0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \log(x_n) = -\infty$$

Esempio.

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} \quad A = \{x \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad x_0 = 0 \text{ è p.a.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

Sia $x_n \in A, x_n \rightarrow 0$. Allora:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin x_n}{x_n} = 1}$$

Esempio.

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ data da

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Sia x_n una successione: $x_n \in \mathbb{R}, x_n \neq 0 \forall n, x_n \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = 1 \neq f(0)$$

Esempio.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \nexists$$

Se esistesse, $\forall x_n \rightarrow 0, x_n \in \mathbb{R}, x_n \neq 0 \quad \forall n \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$. Ma se prendiamo:

$$x_n = \frac{1}{n} \quad x'_n = -\frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = 1 \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x'_n) = 0$$

Quindi $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \bar{A}$.

Osservazione.

La stessa definizione vale nel caso in cui $l \in \overline{\mathbb{R}}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$.

Esempio.

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \quad A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Se $x_n \in A$ e $x_n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x_n^2} = 0$$

Se $x_n \rightarrow -\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x_n^2} = 0$$

Se $x_n \in A, x_n \rightarrow 0, x_n \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x_n^2} = +\infty$$

Se $f(x) = \frac{1}{x} \implies \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \bar{A}$

Definizione 5.2.2: Limiti Infiniti

Se $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$ di accumulazione.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \iff \forall x_n \in A, x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \iff \forall x_n \in A, x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = -\infty$$

- Sia $x_0 = +\infty$ di acc per A (Non superiormente limitato) allora:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}} \iff \forall x_n \in A, x_n \rightarrow +\infty \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$$

- Sia $x_0 = -\infty$ di acc per A (Non inferiormente limitato) allora:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}} \iff \forall x_n \in A, x_n \rightarrow -\infty \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$$

Definizione 5.2.3: Limite (Definizione Topologica)

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ di acc. per A . Diremo che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R} \iff \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(x) - l| < \epsilon \forall x \in A, 0 < |x - x_0| < \delta$$

Oppure

$$\iff \forall I(l) \exists I(x_0) : f(x) \in I(l) \forall x \in A \cap I(x_0) \setminus \{x_0\}$$

Teorema Ponte**Teorema 5.2.4: Teorema Ponte**

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ di acc. per A . Allora sono equivalenti le seguenti:

- (1) $\forall x_n \in A, x_n \neq x_0 \forall n, x_n \rightarrow x_0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$
- $\Updownarrow$
- (2) $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(x) - l| < \epsilon \forall x \in A : 0 < |x - x_0| < \delta$ (dove $l = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$)

Dove (1)=Ipotesi e (2)=Tesi (e viceversa).

Dimostrazione. (1) $\implies$ (2) Se per assurdo (2) non valesse:

$$\exists \epsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 \exists x_\delta : |f(x_\delta) - l| \geq \epsilon_0$$

dove $0 < |x_\delta - x_0| < \delta$. Se allora scelgo $\delta = \frac{1}{n}$,

$$\forall n \exists x_n : |f(x_n) - l| \geq \epsilon_0 \implies \boxed{0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n}}$$

Ma questo implica $x_n \rightarrow x_0$ e $f(x_n)$ non tende a l , contraddicendo (1).

(2) $\implies$ (1) Sia $x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0, x_n \in A$. Dobbiamo dimostrare che $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$, cioè:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \bar{\nu} : |f(x_n) - l| < \epsilon \forall n > \bar{\nu}$$

Per ipotesi (2): $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(x) - l| < \epsilon$ quando $0 < |x - x_0| < \delta$. Poiché $x_n \rightarrow x_0$, $\exists \bar{\nu}$ tale che per $n > \bar{\nu}$ si ha $0 < |x_n - x_0| < \delta$ (essendo $x_n \neq x_0$). Quindi per tali n vale $|f(x_n) - l| < \epsilon$. $\square$

Le Nove Definizioni Di Limite

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(x) - l| < \epsilon \forall x \in A : 0 < |x - x_0| < \delta$
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \iff \forall M > 0 \exists \delta > 0 : f(x) > M \forall x \in A : 0 < |x - x_0| < \delta$
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \iff \forall M > 0 \exists \delta > 0 : f(x) < -M \forall x \in A : 0 < |x - x_0| < \delta$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \iff \forall \epsilon > 0 \exists M > 0 : |f(x) - l| < \epsilon \forall x \in A, x > M$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \iff \forall K > 0 \exists M > 0 : f(x) > K \forall x \in A, x > M$

6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \iff \forall K > 0 \exists M > 0 : f(x) < -K \forall x \in A, x > M$
7. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l \iff \forall \epsilon > 0 \exists M > 0 : |f(x) - l| < \epsilon \forall x \in A, x < -M$
8. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \iff \forall K > 0 \exists M > 0 : f(x) > K \forall x \in A, x < -M$
9. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \iff \forall K > 0 \exists M > 0 : f(x) < -K \forall x \in A, x < -M$

Teoremi di Unicità e Algebra dei Limiti

Teorema 5.2.5: Unicità del Limite

Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$ dove $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ è di acc. per A, Allora l è unico.

Dimostrazione. Segue dal **Teorema Ponte** e dal Teorema di Unicità del limite per le successioni:

$$\forall x_n \in A : x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0 \implies f(x_n) \rightarrow l$$

Poiché il limite di successione è unico, anche il limite di funzione è unico. $\square$

Teorema 5.2.6: Algebra dei Limiti

Siano $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ di acc per A. Sia $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_2$ con $l_1, l_2 \in \overline{\mathbb{R}}$. Allora (salvo forme indeterminate):

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = l_1 \pm l_2$
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = l_1 l_2$
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l_1}{l_2} \quad (g(x) \neq 0 \forall x \in A, l_2 \neq 0)$
4. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)} \quad (f(x) > 0)$

Dimostrazione. Segue dal **Teorema Ponte** applicando le proprietà corrispondenti per le successioni. $\square$

Teoremi di Confronto e Composizione

Teorema 5.2.7: Teorema del Confronto

Siano $f(x), g(x), h(x)$ tre funzioni definite in A e sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ di acc. per A .

1. Se $f(x) \leq g(x) \leq h(x) \forall x$ in un intorno di x_0 e se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l \in \mathbb{R}$$

Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$$

2. Se $f(x) \leq g(x)$ in un intorno di x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$$

3. Se $g(x) \leq f(x)$ in un intorno di x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \implies \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$$

Teorema 5.2.8: Limite delle Funzioni Composte

Siano f, g tali che sia definita $f \circ g$. Siano x_0, y_0 punti di accumulazione dei domini di f, g rispettivamente. Supponiamo inoltre:

1. $\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = x_0$
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$
3. (Ipotesi aggiuntiva necessaria per il teorema standard) $g(y) \neq x_0$ in un intorno di y_0 (eccetto al più y_0) OPPURE f continua in x_0 .

Allora:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(g(y)) = l$$

Dimostrazione. Per il **Teorema Ponte**. Sia $y_n \rightarrow y_0$ con $y_n \neq y_0 \forall n$. Poniamo $x_n = g(y_n)$. Poiché $g(y) \rightarrow x_0$, allora $x_n \rightarrow x_0$. Se vale l'ipotesi che $g(y) \neq x_0$, allora $x_n \neq x_0$, quindi possiamo applicare il limite di f :

$$f(x_n) \rightarrow l \implies f(g(y_n)) \rightarrow l$$

□

Esempio.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^3 - 1)}{x^3 - 1}$$

Posto $y = x^3 - 1$, se $x \rightarrow 1$ allora $y \rightarrow 0$.

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 1$$

5.2.2 Limite Destro e Sinistro

Definizione 5.2.9: Limite Destro e Sinistro

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ di accumulazione per A . Allora diremo che:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

se:

$$\forall I(l) \exists I^+(x_0) : \forall x \in A \cap I^+(x_0) \setminus \{x_0\} \implies f(x) \in I(l)$$

e si chiama **Limite Dx** in x_0 per f .

Diremo che

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l \in \mathbb{R}$$

se:

$$\forall I(l) \exists I^-(x_0) : \forall x \in A \cap I^-(x_0) \setminus \{x_0\} \implies f(x) \in I(l)$$

e si chiama **Limite Sx** in x_0 di f .

5.3 Continuità

5.3.1 Funzioni Continue

Definizione 5.3.1: Funzioni Continue

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $\boxed{x_0 \in A}$ un pto di accumulazione. Diremo che f è **continua** in x_0 se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

ovvero:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(x) - f(x_0)| < \epsilon \forall x \in A : |x - x_0| < \delta$$

Se è continua posso scrivere anche:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} x) = f(x_0)$$

Proposizione 5.3.2

Tutte le **Funzioni Elementari** sono continue.

Dimostrazione. Segue dal **Teorema Ponte** e dalla stessa dimostrazione per le successioni.

□

Proposizione 5.3.3

Somma, prodotto, differenza, quoziente, e f^g di funzioni continue sono continue.

Dimostrazione. Segue da **Algebra dei Limiti** nel caso convergente + **Teorema Ponte**. $\square$

Esempio.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin x + \tan x - x^2 = \pm\infty = \cancel{\exists}$$

Esempio.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \tan x}{x} = 0$$

Esempio.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{1 - \log x}}{2^x} = \frac{1}{2}$$

Teoremi Locali sulla Continuità**Teorema 5.3.4: Permanenza del Segno**

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$ di accumulazione e sia f continua in x_0 . Se $f(x_0) > 0$, allora $\exists I(x_0) :$

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in A \cap I(x_0)$$

Dimostrazione. Segue dal **Teorema Ponte**. $\square$

Teorema 5.3.5: Continuità delle Funzioni Composte

Siano f, g tali che sia definita la funzione composta e siano tali che g è continua in y_0 e f in $x_0 = g(y_0)$. Allora la funzione $f \circ g$ è continua in y_0 e si ha:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(g(y)) = f(g(y_0)) = f \circ g(y_0)$$

Dimostrazione. È un'immediata conseguenza del **Teorema del Limite delle Funzioni Composte**. $\square$

Esempio.

$$\lim_{x \rightarrow 0} 2^{\frac{1}{x^2}} = +\infty$$

Esempio.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} e^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{y \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{y}} = 0$$

Esempio.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arcsin x}{x} = \frac{\pi}{2}$$

Esempio.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\sin x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\frac{\sin x^2}{x^2}} \sqrt{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} = \pm 1 = \cancel{\exists}$$

5.3.2 Funzioni Discontinue

Osservazione.

(Richiamo) Una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice continua in A se è continua in tutto A .

Definizione 5.3.6: Funzione Discontinua

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$ di acc. per A . Se f non è continua in x_0 diremo che f è discontinua in x_0 . Quindi f è discontinua in x_0 se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$$

Esempio.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad \text{È continua in } \mathbb{R} ?$$


Tipi Di Discontinuità

1. **Discontinuità di 1° specie (Salto):** Se accade che

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) &= l_1 \in \mathbb{R} \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) &= l_2 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\implies l_1 \neq l_2$$


allora x_0 è un punto di discontinuità di tipo salto. La quantità $l_2 - l_1$ si chiama **salto di discontinuità**.



2. **Discontinuità di 2° specie:** Si chiama discontinuità di 2° specie in tutti gli altri casi (quando almeno uno dei due limiti è $= \pm\infty$ o non esiste).

3. **Discontinuità di 3° specie (Eliminabile):** Si dice discontinuità eliminabile se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R} \neq f(x_0)$$



È possibile estendere la funzione definendo $g(x)$:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & x \neq x_0 \\ l & x = x_0 \end{cases}$$

f e g differiscono per un punto ma $g(x)$ è continua.

Esempio.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} = \begin{cases} -1 & \text{da sx} \\ 1 & \text{da dx} \end{cases} \Rightarrow \nexists$$

Allora è discontinuità di tipo "salto" e il salto di discontinuità è $|l_2 - l_1| = 2$.

Esempio.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \implies 2^\circ \text{ specie}$$

Esempio.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{2x}-1}{\sin x^2} & x < 0 \\ 2 & x = 0 \\ \frac{x^2}{1-\cos x} & x > 0 \end{cases}$$

Calcoliamo i limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2 \frac{e^{2x}-1}{2x} \cdot \frac{x^2}{\sin x^2} \cdot \frac{1}{x} \quad (\text{Controllo limiti notevoli...})$$

Nota: L'esempio originale conteneva un calcolo approssimato, verificare i passaggi.

5.4 Limiti Notevoli

Di seguito sono elencati i principali limiti notevoli utili per la risoluzione delle forme indeterminate.

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

4.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

5.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x}$$

pongo $y = \arcsin x \implies (y \rightarrow 0 \text{ se } x \rightarrow 0)$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\sin y} = 1$$

6.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$$

7.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

8.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

9.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{\frac{1}{x}} = e^a$$

10.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$$

11.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e = \frac{1}{\log a}$$

12.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

13.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$$

$$\text{Pongo } y = a^x - 1 \implies (x \rightarrow 0 \implies y \rightarrow 0)$$

$$x = \log_a(1+y)$$

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\log_a(1+y)} = \log a$$

14.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$$

15.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x^\alpha} = 0 \quad (\forall \alpha > 0, a > 1)$$

16.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0 \quad (\alpha > 0, a > 1)$$

17.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \log_a x = 0 \quad (\alpha > 0, a > 1)$$

$$\text{pongo } y = \frac{1}{x} \implies (x \rightarrow 0^+ \implies y \rightarrow +\infty)$$

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{-\log_a y}{y^\alpha} = 0$$

18.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k \cdot a^x = 0 \quad (k \in \mathbb{N}, a > 1) \quad (\text{Non capiterà mai})$$

5.5 Teoremi Globali e Continuità Uniforme

5.5.1 Teorema di Weierstrass

Teorema 5.5.1: Teorema di Weierstrass

Sia $f : K \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, con K compatto e f continua. Allora f ammette minimo e massimo globali, ovvero:

$$\exists x_m, x_M \in K : \\ \min_K f = m = f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M) = M = \max_K f$$


Osservazione.

Domande classiche:


1. Vale il viceversa? **NO**
2. Se K non è compatto vale? **NO**
3. Se f non è continua, vale? **NO**

Controesempi:


- (1) $K = [0, 1]$, $f(x)$ discontinua.



- (2) $K = [0, 1[$. 1 è un sup ma non un max.



- (3) $K = [0, 1]$, funzione discontinua che non raggiunge gli estremi.



Dimostrazione. (Dimostriamo l'esistenza del max). Sia $M = \sup_K f = \sup\{f(x), x \in K\} \in \mathbb{R}$.

Passo 1: Dimostriamo che $\boxed{\exists x_n \in K : \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = M}$. Infatti se $M = +\infty$, per le proprietà del sup:

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in K : f(x_n) > n \quad \xRightarrow{\text{(T. del Confronto)}} \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = +\infty = M$$

Se $M < +\infty$:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists x_n \in K : M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = M$$

Passo 2: Essendo K compatto, dalla successione x_n si può estrarre una sottosuccessione convergente:

$$\exists x_{n_k} \rightarrow x_M \in K$$

Passo 3: Considero $f(x_{n_k})$. Essendo un'estratta di $f(x_n)$ tende a M . Per la continuità di f :

$$\boxed{M} = \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_{n_k}) = f\left(\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n_k}\right) = \boxed{f(x_M)}$$


Quindi M è un valore finito ed è assunto dalla funzione in x_M . □

5.5.2 Teorema di Esistenza degli Zeri

Teorema 5.5.2: Esistenza degli Zeri

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Sia $f(a)f(b) < 0$ (discordi). Allora

$$\exists c \in]a, b[: f(c) = 0$$

**Dimostrazione.**

Sia c_0 il punto medio di $[a, b]$: $c_0 = \frac{a+b}{2}$. Se $f(c_0) = 0 \implies c = c_0$ (Fine). Se $f(c_0) \neq 0$, allora sarà discorde o con $f(a)$ o con $f(b)$. Chiamo $[a_1, b_1]$ l'intervallo ai cui estremi la funzione assume valori discordi:

$$[a_1, b_1] = \begin{cases} [a, c_0] & f(c_0)f(a) < 0 \\ [c_0, b] & f(c_0)f(b) < 0 \end{cases}$$

Quindi ho costruito $[a_1, b_1]$ tale che:

1. $a \leq a_1 < b_1 \leq b$
2. $b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}$
3. $f(a_1)f(b_1) < 0$

Iterando il procedimento, al passo n se non ho mai trovato lo zero, avrò costruito $[a_n, b_n]$ tale che:

1. $\underbrace{a \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n}_{\nearrow} < \underbrace{b_n \leq b_{n-1} \leq \dots \leq b_1 \leq b}_{\searrow}$
2. $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$
3. $f(a_n)f(b_n) < 0$

Le successioni a_n e b_n sono monotone e limitate, quindi convergono. Poiché la distanza tra loro tende a 0 (punto 2), convergono allo stesso limite $c \in [a, b]$.

Per la continuità di f :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \cdot f(b_n) = f(c) \cdot f(c) = [f(c)]^2$$

Poiché $f(a_n)f(b_n) < 0$ per ogni n , il limite deve essere ≤ 0 . Quindi $[f(c)]^2 \leq 0 \implies f(c) = 0$. □

Teorema 5.5.3: Esistenza degli Zeri (Versione Generale)

Sia $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ (o $f :]-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$) continua e tale che esistano:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l' \in \overline{\mathbb{R}}$$

Se $f(a) \cdot l < 0$ (o $f(b) \cdot l' < 0$), allora:

$$\exists c \in]a, +\infty[\text{ (o }]-\infty, b]) : f(c) = 0$$

5.5.3 Teorema dei Valori Intermedi**Teorema 5.5.4: Teorema dei Valori Intermedi**

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora f assume tutti i valori compresi tra il minimo e il massimo.

Dimostrazione. Per il **Teorema di Heine-Borel** e **Weierstrass**, esistono minimo m e massimo M . Sia $y_0 \in]m, M[$. Dobbiamo dimostrare che $\exists x_0 \in [a, b] : f(x_0) = y_0$.

Considero la funzione ausiliaria $g(x) = f(x) - y_0$ nell'intervallo $[x_m, x_M]$ (supponendo $x_m < x_M$):

1. $g(x)$ è continua.
2. $g(x_m) = m - y_0 < 0$
3. $g(x_M) = M - y_0 > 0$

Per il Teorema di esistenza degli zeri applicato a $g(x)$:

$$\exists c \in]x_m, x_M[: g(c) = 0 \implies f(c) = y_0 \implies c = x_0$$

□

5.5.4 Monotonia e Invertibilità**Teorema 5.5.5: Limite di Funzioni Monotone**

Sia $f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **monotona**. Allora $\exists$ finiti i seguenti limiti $\forall x_0 \in [a, b]$:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x); \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x); \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x); \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$$

Inoltre se $f \nearrow$, si possono ordinare come segue:

$$f(a) \leq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \leq f(b)$$

Dimostrazione. Dimostriamo che esiste il limite sinistro per $x_0 \in]a, b[$. Supponiamo $f \nearrow$. L'insieme $\{f(x) : x \in [a, x_0[\}$ è limitato superiormente da $f(x_0)$. Dunque è ben definito $l = \sup\{f(x) : x \in [a, x_0[\}$. Per le proprietà del sup, $\forall \epsilon > 0 \exists x_1 \in [a, x_0[: l - \epsilon < f(x_1) \leq l$. Per la monotonia, per ogni x tale che $x_1 < x < x_0$, si ha $l - \epsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq l < l + \epsilon$. Quindi il limite sinistro esiste ed è uguale a l . $\square$

Corollario 5.5.6

Una funzione monotona può avere solo discontinuità di tipo salto.

Teorema 5.5.7: Continuità delle Funzioni Monotone

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ monotona. f è continua $\iff f$ assume tutti i valori compresi tra $f(a)$ ed $f(b)$ (ovvero tra min e max).

Dimostrazione. ($\implies$) Ovvio per il **Teorema dei Valori Intermedi**.

($\impliedby$) Se per assurdo $\exists x_0 \in]a, b[: f$ non è continua in x_0 , ma allora esistono i limiti destro e sinistro l_1, l_2 con $l_1 < l_2$ (per la monotonia).

Allora nessun punto dell'intervallo $]l_1, l_2[$ viene assunto dalla funzione, contraddicendo l'ipotesi che assuma tutti i valori intermedi. $\square$

Teorema 5.5.8: Continuità della Funzione Inversa

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua e strettamente monotona. Allora f^{-1} è continua nell'intervallo di estremi $f(a), f(b)$.

Dimostrazione. f^{-1} esiste per la stretta monotonia (iniettività) e la suriettività sull'immagine.

Supponiamo f strettamente crescente. Allora $f : [a, b] \rightarrow [f(a), f(b)]$ e $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow [a, b]$ è anch'essa strettamente crescente.

Poiché l'immagine di f^{-1} è l'intervallo $[a, b]$ (tutti i valori sono assunti), per il teorema precedente f^{-1} è continua. $\square$

5.5.5 Continuità Uniforme

Definizione 5.5.9: Continuità (Puntuale)

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. f è continua in $A \iff f$ è continua in ogni $x_0 \in A$.

$$\forall x_0 \in A, \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in A, |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

Osservazione.

Il δ trovato nella continuità puntuale può dipendere sia da ϵ che dal punto x_0 scelto.

Esempio.

Esempio 1: $f(x) = x^2$ (**Continua ma non Uniformemente su $\mathbb{R}$**) Vogliamo mostrare che il δ dipende necessariamente da x_0 . Fissiamo x_0 e ϵ . Dobbiamo soddisfare $|x^2 - x_0^2| < \epsilon$.

$$|x^2 - x_0^2| = |x - x_0| \cdot |x + x_0| < \delta |x + x_0|$$

Se poniamo un vincolo preliminare $\delta \leq 1$, allora $|x + x_0| < 1 + 2|x_0|$. Affinché il prodotto sia $< \epsilon$, dobbiamo scegliere:

$$\delta = \min\left(1, \frac{\epsilon}{1 + 2|x_0|}\right)$$

Conclusione: All'aumentare di $|x_0|$, δ deve diventare sempre più piccolo. Non esiste un δ unico per tutto $\mathbb{R}$.

Esempio.

Esempio 2: $f(x) = \sin(x)$ (**Uniformemente Continua**) Vogliamo trovare un δ che dipenda solo da ϵ .

$$|\sin(x_1) - \sin(x_2)| = \left| 2 \cos\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \sin\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right) \right|$$

Usando $|\cos| \leq 1$ e $|\sin t| \leq |t|$:

$$\leq 2 \cdot 1 \cdot \left| \frac{x_1 - x_2}{2} \right| = |x_1 - x_2|$$

Quindi basta scegliere $\delta = \epsilon$ per soddisfare la condizione. Il δ non dipende da x .

Definizione 5.5.10: Uniforme Continuità

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. f si dice **uniformemente continua** in A se:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x, x' \in A, |x - x'| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \epsilon$$

(Qui il δ dipende solo da ϵ).

Teorema 5.5.11: Teorema di Heine-Cantor

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua $\implies f$ è uniformemente continua.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che f non sia uniformemente continua.

$$\exists \epsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 \exists x_\delta, x'_\delta : |x_\delta - x'_\delta| < \delta \text{ ma } |f(x_\delta) - f(x'_\delta)| \geq \epsilon_0$$

Scelto $\delta = \frac{1}{n}$ trovo successioni x_n, x'_n tali che $|x_n - x'_n| < \frac{1}{n}$ ma la distanza delle immagini è $\geq \epsilon_0$. Essendo in un compatto $[a, b]$, per **Bolzano-Weierstrass** esiste una sottosuccessione $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b]$. Anche $x'_{n_k} \rightarrow x_0$ (poiché la loro distanza tende a 0). Ma f è continua in x_0 , quindi $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$ e $f(x'_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$, il che implica $|f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k})| \rightarrow 0$, contraddicendo la condizione $\geq \epsilon_0$. $\square$

5.5.6 Lipschitziana

Definizione 5.5.12: Lipschitziana

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. f si dice **Lipschitziana** se $\exists L > 0$ (costante di Lipschitz) tale che $\forall x, x_0 \in A$ si ha:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq L|x - x_0|$$

Osservazione.

Una funzione Lipschitziana è sempre uniformemente continua (basta scegliere $\delta = \epsilon/L$).

5.6 Asintoti

Per studiare cosa succede nei punti d'accumulazione del dominio (specialmente agli estremi o nei punti di discontinuità), introduciamo il concetto di asintoto.

5.6.1 Asintoti Verticali

Definizione 5.6.1: Asintoto Verticale

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto di accumulazione per A .

- La retta $x = x_0$ si dice **asintoto verticale destro** al grafico di f se:


$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$$

- Si dice **asintoto verticale sinistro** se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$$

Esempio.

Consideriamo $f(x) = e^{\frac{x}{x-1}}$.



Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. **Codominio:** $f(x) > 0$.

Verifichiamo gli asintoti verticali in $x = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$$

La retta $x = 1$ è Asintoto Verticale Destro a $+\infty$.

5.6.2 Asintoti Orizzontali

Definizione 5.6.2: Asintoto Orizzontale

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con A non superiormente limitato. Allora la retta $y = l$ si dice **asintoto orizzontale** a $+\infty$ al grafico di f se:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R} \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - l) = 0$$


Analogamente, se A non è inferiormente limitato, $y = l'$ si dice asintoto orizzontale a $-\infty$ se:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l' \in \mathbb{R} \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - l') = 0$$

Esempio.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{\frac{x}{x-1}} = e$$

Quindi $y = e$ è asintoto orizzontale a $\pm\infty$.



5.6.3 Asintoti Obliqui

Definizione 5.6.3: Asintoto Obliquo

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con A non superiormente limitato. La retta

$$y = mx + q \quad (m \neq 0)$$

è un **asintoto obliquo** a $+\infty$ se:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (mx + q)) = 0$$

Analogamente, se A non è inferiormente limitato, la retta $y = m'x + q'$ è un asintoto obliquo a $-\infty$ se:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (m'x + q')) = 0$$

Formule per trovare m e q

Per trovare i parametri dell'asintoto obliquo si usano le seguenti formule (derivanti dalla definizione):

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$q = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx)$$

(Le formule valgono analogamente per $x \rightarrow -\infty$).

Esempio.

Sia $f(x) = 1 + \sqrt{4x^2 - 2x + 1}$.

1. Dominio: $\mathbb{R}$
2. Segno: $f(x) > 0$
3. Asintoti Verticali: NO (non ci sono punti di esclusione o estremi finiti aperti del dominio).
4. Asintoti Orizzontali: NO (i limiti a $\pm\infty$ divergono).
5. Asintoti Obliqui: ?


Svolgimento Asintoti Obliqui: Cerchiamo m :

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 + 2|x| \sqrt{1 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{4x^2}}}{x}$$

Distinguendo i casi per il valore assoluto:

$$\begin{cases} m = 2 & \text{per } x \rightarrow +\infty \\ m = -2 & \text{per } x \rightarrow -\infty \end{cases}$$

(Successivamente si calcolerebbe q per entrambi i casi).



Capitolo 6

Calcolo Differenziale


6.1 Rapporto Incrementale e Derivata

Definizione 6.1.1: Rapporto Incrementale

Sia $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in]a, b[$. Si chiama **rapporto incrementale** la seguente quantità:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (h \in \mathbb{R}, h \neq 0)$$

Esempio.



Prendiamo la secante passante per i punti P e Q e avviciniamoli (facendo tendere $h \rightarrow 0$). L'equazione della secante è:

$$s : y = f(x_0) + m(x - x_0) \quad \text{con } m = \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

Passaggio al limite:

$$\begin{aligned} s : y &= f(x_0) + \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}(x - x_0) \\ h \rightarrow 0 &\implies \\ \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &\rightarrow l \\ s \rightarrow t : y &= f(x_0) + l(x - x_0) \end{aligned}$$

6.1.1 Definizione di Derivata

Definizione 6.1.2: Derivata

Si chiama **derivata** di f in x_0 il seguente limite, se esiste finito:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = l \in \mathbb{R}$$

Tale limite si denota con uno dei seguenti simboli:

- $f'(x_0)$
- $\frac{d}{dx}f(x_0)$
- $Df(x_0)$

Se f ha derivata in x_0 , si dice **derivabile** in x_0 . Se f è derivabile $\forall x_0 \in]a, b[$ diremo che f è derivabile.

Definizione 6.1.3: Retta Tangente

Se f è derivabile in x_0 , la retta

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

prende il nome di **retta tangente** al grafico di f nel punto $(x_0, f(x_0))$ e $f'(x_0)$ è il suo coefficiente angolare.

Posso anche scrivere la derivata nella forma alternativa:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\overbrace{f(x_0 + h)}^x - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

6.1.2 Derivata Destra e Sinistra

Se consideriamo una funzione definita su un intervallo chiuso o se vogliamo studiare la derivabilità agli estremi $x_0 = a$ o $x_0 = b$, definiamo:

Definizione 6.1.4: Derivata Destra e Sinistra

- Se $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l_+ \in \mathbb{R}$, allora lo indichiamo con $f'_+(x_0)$ e si chiama **derivata destra** in x_0 .
- Se $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l_- \in \mathbb{R}$, allora lo indichiamo con $f'_-(x_0)$ e si chiama **derivata sinistra** in x_0 .

Osservazione.

f è derivabile in $x_0 \iff f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ esistono finiti e coincidono:

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$$


6.2 Derivate delle Funzioni Elementari

Di seguito analizziamo le derivate delle funzioni fondamentali, dimostrandone i risultati tramite la definizione di rapporto incrementale.


1. Derivata di una costante c :

$$Dc(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Infatti: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{c - c}{x - x_0} = 0$.

**2. Derivata della retta $ax + b$:**

$$D(ax + b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a(x + h) + b - ax - b}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ah}{h} = a$$



Esempio.

$$\begin{aligned} D(x) &= 1 \\ D(-x) &= -1 \end{aligned}$$

3. **Derivata del valore assoluto $|x|$:**

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases} \implies D(|x|) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \\ \nexists & x = 0 \end{cases}$$

Perché in $x = 0$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0 + h| - |0|}{h} = \frac{|h|}{h} = \begin{cases} 1 & h \rightarrow 0^+ \\ -1 & h \rightarrow 0^- \end{cases} \implies \nexists$$

4. **Derivata della potenza x^α :**

$$D(x^\alpha) = \alpha x^{\alpha-1}$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^\alpha - x^\alpha}{h} = \left[\frac{0}{0} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^\alpha \left(\left(1 + \frac{h}{x}\right)^\alpha - 1 \right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^{\alpha-1} \left(\left(1 + \frac{h}{x}\right)^\alpha - 1 \right)}{\frac{h}{x}} = \alpha x^{\alpha-1} \end{aligned}$$

□

Esempio.

- $D(\sqrt{x}) = D(x^{1/2}) = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
- $D(x^3) = 3x^2$

5. **Derivata dell'esponenziale a^x :**

$$D(a^x) = a^x \log a$$

Dimostrazione.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x(a^h - 1)}{h} = a^x \log a$$

□

6. Derivata di e^x :

$$D(e^x) = e^x$$

(Segue dalla (5) ponendo $a = e$, dato che $\log e = 1$).**7. Derivata del Seno:**

$$D(\sin x) = \cos x$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\sin x \left(\frac{\cos h - 1}{h} \right) + \cos x \left(\frac{\sin h}{h} \right) \right] = \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x \end{aligned}$$

□

8. Derivata del Coseno:

$$D(\cos x) = -\sin x$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\cos x \frac{(\cos h - 1)}{h} - \sin x \cdot \frac{\sin h}{h} \right] = -\sin x \end{aligned}$$

□

9. Derivata del Logaritmo $\log_a x$:

$$D(\log_a x) = \frac{1}{x \log a}$$

Dimostrazione.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+h) - \log_a(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \log_a \left(1 + \frac{h}{x} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{x} \frac{\log_a(1+t)}{t} = \frac{1}{x \log a}$$

(dove $t = h/x \rightarrow 0$).

□

10. Derivata di $\log x$ (base e):

$$D(\log x) = \frac{1}{x}$$

6.3 Algebra delle Derivate

Teorema 6.3.1: Operazioni con le Derivate

Siano f, g definite in $]a, b[$ e derivabili in x_0 . Allora anche $c \cdot f$, $f \pm g$, $f \cdot g$ e $\frac{f}{g}$ (se $g(x_0) \neq 0$) sono derivabili in x_0 e risulta:

1. $D(cf(x_0)) = cDf(x_0)$
2. $D(f \pm g)(x_0) = Df(x_0) \pm Dg(x_0)$
3. $D(fg)(x_0) = Df(x_0)g(x_0) + f(x_0)Dg(x_0)$
4. $D\left(\frac{f}{g}\right)(x_0) = \frac{Df(x_0)g(x_0) - f(x_0)Dg(x_0)}{g^2(x_0)}$

Le proprietà (1) e (2) indicano che la derivata è un **operatore lineare**.

Dimostrazione. Dimostrazione (2) - Somma:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) + g(x_0 + h) - (f(x_0) + g(x_0))}{h} &= \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} \right] &= \\ = f'(x_0) + g'(x_0) \end{aligned}$$

□

Per dimostrare rigorosamente la regola del prodotto, necessitiamo prima di un legame tra derivabilità e continuità.

Teorema 6.3.2: Relazione Derivabilità-Continuità

Se g è definita in $]a, b[$ ed è derivabile in $x_0 \implies g$ è continua in x_0 .

Il viceversa non vale: $\nLeftarrow$. Esempio: $|x|$ è continua in $x = 0$ ma non derivabile.

Dimostrazione. Per dimostrare che g è continua in x_0 devo dimostrare che $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$, ovvero che $\lim_{x \rightarrow x_0} (g(x) - g(x_0)) = 0$. Possiamo scrivere:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g(x) - g(x_0)) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) = g'(x_0) \cdot 0 = 0$$

□

Dimostrazione. Dimostrazione (3) - Prodotto:

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x) + f(x_0)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(g(x) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \right) \\
 &= g(x_0)f'(x_0) + f(x_0)g'(x_0)
 \end{aligned}$$

(Qui abbiamo usato il fatto che $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$ perché g è derivabile e quindi continua). $\square$

Esempio.

Derivata della Tangente:

$$\begin{aligned}
 D(\tan x) &= D\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \\
 &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \\
 &= \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x
 \end{aligned}$$

6.4 Teoremi Fondamentali del Calcolo

Teorema 6.4.1: Derivazione delle Funzioni Composte (Chain Rule)

Siano g, f tali che sia definita la funzione composta $f(g(x))$. Sia x_0 tale che g è derivabile in x_0 e f è derivabile in $g(x_0)$. Allora $f \circ g$ è derivabile in x_0 e si ha:

$$D(f \circ g)(x) = (f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

Dimostrazione. Definiamo la funzione ausiliaria $H(y)$:

$$H(y) = \begin{cases} \frac{f(y) - f(y_0)}{y - y_0} & y \neq y_0 \\ f'(y_0) & y = y_0 \end{cases}$$

dove $y_0 = g(x_0)$. H è continua in y_0 . Possiamo scrivere il rapporto incrementale come:

$$\frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{x - x_0} = H(g(x)) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}$$

Passando al limite per $x \rightarrow x_0$:


$$\lim_{x \rightarrow x_0} H(g(x)) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = H(g(x_0)) \cdot g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

$\square$

Teorema 6.4.2: Derivata della Funzione Inversa

Sia f strettamente monotona e continua in $]a, b[$. Sia f derivabile in $x_0 \in]a, b[$ e $f'(x_0) \neq 0$. Allora la funzione inversa f^{-1} è derivabile in $y_0 = f(x_0)$ e risulta:

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

**Osservazione.**

Interpretazione geometrica: Se la retta tangente in $P(x_0, y_0)$ forma un angolo α con l'asse x , allora $f'(x_0) = \tan \alpha$. Rispetto all'asse y (scambiando gli assi per l'inversa), l'angolo è $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$.

$$(f^{-1})'(y_0) = \tan \beta = \tan \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

6.4.1 Derivate delle Funzioni Inverse Trigonometriche**Esempio.**

Arcoseno:

$$D(\arcsin x) = \frac{1}{D(\sin y)} \Big|_{y=\arcsin x} = \frac{1}{\cos y}$$

Poiché $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $\cos y \geq 0$, quindi $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y}$.

$$= \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Esempio.

Arcocoseno:

$$D(\arccos x) = \frac{1}{D(\cos y)} \Big|_{y=\arccos x} = \frac{1}{-\sin y}$$

Poiché $y \in [0, \pi]$, $\sin y \geq 0$, quindi $\sin y = \sqrt{1 - \cos^2 y}$.

$$= -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Esempio.**Arcotangente:**

$$D(\arctan x) = \frac{1}{D(\tan y)} \Big|_{y=\arctan x} = \cos^2 y = \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}$$

6.5 Punti di non derivabilità

Definizione 6.5.1: f non derivabile

Se f non è derivabile in x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \begin{cases} \mathcal{A} \\ \infty \end{cases}$$

1. $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ $\exists$ finite ma:


$$f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0)$$

In questo caso si chiama **punto angoloso**. Assumiamo che x_0 è un punto angoloso anche quando una delle due derivate $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ è finita, mentre l'altra è $\pm\infty$.

Esempio.

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & x \geq 0 \\ 1 - e^{-x/2} & x < 0 \end{cases} \implies f \text{ è continua in } \mathbb{R}$$


$$f'_+(0) = +\infty \quad f'_-(0) = -\frac{1}{2}$$



2. Se $f'_+(x_0) = +\infty$ e $f'_-(x_0) = -\infty$ o viceversa, x_0 si dice **cuspid**.

Esempio.


$$f(x) = \sqrt{|x|}$$



3. Se $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = \pm\infty$ (∞ ma con lo stesso segno), x_0 è **a tangente verticale**.

Esempio.

$$y = \sqrt[3]{x}$$



Tutti gli altri sono punti di non derivabilità.

Osservazione.

Le funzioni con derivata limitata sono sempre Lipschitziane.