

Sei f je differenzierbar in z_0 in der potenz

$$f(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0+h) - f(z_0)}{h} \quad \text{der Potenz}$$

Es ist: Potenzreihe gebildet

① Man: $f(z) = P_0(z) + i Q_0(z)$ wobei P_0 & Q_0 differenzierbar in z_0 in der potenz. Also ist $f'(z_0) = P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)$ gebildet = $P_0'(z_0)$

$$i. \text{ mit } \boxed{P_0'(z_0) = Q_0'(z_0)} \\ \boxed{Q_0'(z_0) = -P_0'(z_0)}$$

$$\text{Daher ist } f'(z_0) = P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0) = P_0'(z_0) - i P_0'(z_0)$$

2. Man: Potenzreihe gebildet durch $f(z)$ in der potenz in der $f'(z_0)$ gebildet

$$a) f(z) = P_0(z) + i Q_0(z) = (P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)) (z - z_0) + \dots \\ = (P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)) (z - z_0) + \dots \\ P_0'(z_0) = P_0'(z_0) \quad Q_0'(z_0) = -P_0'(z_0) \\ \text{Es ist differenzierbar in } z_0$$

$$\text{Daher ist } f'(z_0) = P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0) = P_0'(z_0) - i P_0'(z_0)$$

$$b) f(z) = P_0(z) + i Q_0(z) = (P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)) (z - z_0) + \dots \\ P_0'(z_0) = P_0'(z_0) \quad Q_0'(z_0) = -P_0'(z_0) \\ \text{Es ist differenzierbar in } z_0$$

$$c) f(z) = P_0(z) + i Q_0(z) = (P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)) (z - z_0) + \dots \\ P_0'(z_0) = P_0'(z_0) \quad Q_0'(z_0) = -P_0'(z_0) \\ \text{Es ist differenzierbar in } z_0$$

$$f'(z_0) = P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0) = P_0'(z_0) - i P_0'(z_0)$$

Man: Potenzreihe gebildet in z_0 in der potenz in der $f'(z_0)$ gebildet

$$d) f(z) = P_0(z) + i Q_0(z) = (P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)) (z - z_0) + \dots \\ = (P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)) (z - z_0) + \dots \\ P_0'(z_0) = P_0'(z_0) \quad Q_0'(z_0) = -P_0'(z_0)$$

$$P_0 = \frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} = \frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} \\ Q_0 = -\frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} = -\frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2}$$

$$\text{Es ist } f'(z_0) = P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0) = P_0'(z_0) - i P_0'(z_0) \\ \text{Es ist differenzierbar in } z_0$$

Sei f je differenzierbar in z_0 in der potenz in der $f'(z_0)$ gebildet

$$f(z) = P_0(z) + i Q_0(z) = (P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)) (z - z_0) + \dots \\ P_0'(z_0) = P_0'(z_0) \quad Q_0'(z_0) = -P_0'(z_0)$$

2. Man: Potenzreihe gebildet durch $f(z)$ in der potenz in der $f'(z_0)$ gebildet

$$a) f(z) = P_0(z) + i Q_0(z) = (P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)) (z - z_0) + \dots \\ = (P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)) (z - z_0) + \dots \\ P_0'(z_0) = P_0'(z_0) \quad Q_0'(z_0) = -P_0'(z_0)$$

$$P_0 = \frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} = \frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} \\ Q_0 = -\frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} = -\frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2}$$

$$\text{Es ist } f'(z_0) = P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0) = P_0'(z_0) - i P_0'(z_0) \\ \text{Es ist differenzierbar in } z_0$$

① Man: f je differenzierbar in z_0 in der potenz in der $f'(z_0)$ gebildet

2. Man: Potenzreihe gebildet durch $f(z)$ in der potenz in der $f'(z_0)$ gebildet

$$f(z) = P_0(z) + i Q_0(z) = (P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)) (z - z_0) + \dots \\ P_0'(z_0) = P_0'(z_0) \quad Q_0'(z_0) = -P_0'(z_0)$$

$$f(z) = P_0(z) + i Q_0(z) = (P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)) (z - z_0) + \dots \\ P_0'(z_0) = P_0'(z_0) \quad Q_0'(z_0) = -P_0'(z_0)$$

Man: Potenzreihe gebildet durch $f(z)$ in der potenz in der $f'(z_0)$ gebildet

$$f(z) = P_0(z) + i Q_0(z) = (P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)) (z - z_0) + \dots \\ P_0'(z_0) = P_0'(z_0) \quad Q_0'(z_0) = -P_0'(z_0)$$

$$P_0 = \frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} = \frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} \\ Q_0 = -\frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} = -\frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2}$$

$$\text{Es ist } f'(z_0) = P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0) = P_0'(z_0) - i P_0'(z_0) \\ \text{Es ist differenzierbar in } z_0$$

$$f(z) = P_0(z) + i Q_0(z) = (P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)) (z - z_0) + \dots \\ P_0'(z_0) = P_0'(z_0) \quad Q_0'(z_0) = -P_0'(z_0)$$

$$P_0 = \frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} = \frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} \\ Q_0 = -\frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} = -\frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2}$$

$$\text{Es ist } f'(z_0) = P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0) = P_0'(z_0) - i P_0'(z_0) \\ \text{Es ist differenzierbar in } z_0$$

$$f(z) = P_0(z) + i Q_0(z) = (P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)) (z - z_0) + \dots \\ P_0'(z_0) = P_0'(z_0) \quad Q_0'(z_0) = -P_0'(z_0)$$

$$P_0 = \frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} = \frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} \\ Q_0 = -\frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} = -\frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2}$$

$$\text{Es ist } f'(z_0) = P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0) = P_0'(z_0) - i P_0'(z_0) \\ \text{Es ist differenzierbar in } z_0$$

$$f(z) = P_0(z) + i Q_0(z) = (P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)) (z - z_0) + \dots \\ P_0'(z_0) = P_0'(z_0) \quad Q_0'(z_0) = -P_0'(z_0)$$

$$P_0 = \frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} = \frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} \\ Q_0 = -\frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2} = -\frac{P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0)}{(z - z_0)^2}$$

$$\text{Es ist } f'(z_0) = P_0'(z_0) + i Q_0'(z_0) = P_0'(z_0) - i P_0'(z_0) \\ \text{Es ist differenzierbar in } z_0$$