

Predispitne obaveze 2
10 poena

1. [2 poena] Definirati strogo stacionaran proces i izračunati njegovo očekivanje

- obe karakteristike: prostorne i vremenske ujednačenosti (1)

$$m_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \varphi_{X_t}(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \varphi_{X_{t+c}}(x) dx = m_X(t+c)$$

$$\sum x_i \cdot P(X_t = x_i) = \sum x_i \cdot P(X_{t+c} = x_i) \quad (1)$$

$$m_X(t) = m_X(t+c), \forall c \Rightarrow m_X(t) = \text{const}$$

2. [4 poena] Dat je lanac Markova čiji je skup stanja $S = \{s_1, s_2, s_3\}$ i čija je matrica prelaza $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

a) Da li postoje finalne verovatnoće? Odgovor objasniti! Ako postoje, izračunati ih.

$$P^2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\frac{1}{2})^2 & 0 & 1 - (\frac{1}{2})^2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$P^n = \begin{bmatrix} (\frac{1}{2})^n & 0 & 1 - (\frac{1}{2})^n \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Prilikom, ako
takođe uvek
vremeno
ne postoje final. ver

b) Ako je $p_2(0) = 1$ izračunati $p(2)$ i $p_2(2)$.

$$p(0) = [0 \quad 1 \quad 0]$$

$$p(2) = p(0) \cdot P^2 = [0 \quad 1 \quad 0] \cdot \begin{bmatrix} (\frac{1}{2})^2 & 0 & 1 - (\frac{1}{2})^2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [0 \quad 1 \quad 0] \quad p_2(2) = 1 \quad (1)$$

c) Izračunati $P(X_2 = s_2, X_4 = s_2, X_5 = s_2) = p_2(2) \cdot p_{22}(2) \cdot p_{22}(1)$

$$= 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \quad (1)$$

3. [3 poena] Neka je $X_t = 2Y_t + 1$, $t \in [0, \infty)$ slučajni proces, gde je Y_t Poissonov proces sa parametrom λ , $\lambda > 0$. Izračunati srednju vrednost i korelacionu funkciju slučajnog procesa X_t .

$$X_t = 2Y_t + 1, \quad Y_t \sim P(\lambda t)$$

$$m_X(t) = E(X_t) = E(2Y_t + 1) = 2E(Y_t) + 1 = 2 \cdot \lambda t + 1 \quad (1)$$

$$R_X(t, s) = E(X_t \cdot X_s) = E((2Y_t + 1)(2Y_s + 1))$$

$$= 4E(\underbrace{Y_t Y_s}) + 2E(Y_t) + 2E(Y_s) + 1$$

$$= 4 \cdot R_Y(t, s) + 2(m_Y(t) + m_Y(s)) + 1 \quad (2)$$

$$= 4 \cdot (\lambda \cdot \min\{t, s\} + \lambda^2 ts) + 2(\underline{2\lambda t + 1} + \underline{2\lambda s + 1}) + 1$$

$$= 4\lambda \min\{t, s\} + 4\lambda^2 ts + 4\lambda(t + s) + 5$$

4. [1 poen] Slučajni proces X_t , $t \in [0, \infty)$ je ergodičan po matematičkom očekivanju

$$m_X(t) = \bar{m} = \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{A} \int_0^A x_t dt \quad (1)$$