

ПОПРАВКА

Predispitne obaveze 1 – 20 poena

1. [5 poena] Aksiomska definicija verovatnoće.

Аку уе тт!

$$P(\emptyset) = \dots\dots\dots 0$$

$$P(\bar{A}) = \dots\dots\dots 1-P(A), \text{ gde je } \bar{A} \dots\dots\dots \text{супротах догађаја}$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_i P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$$

Ako su događaji A, B i C disjunktni, tada je $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) \dots\dots\dots 0$

$$P(AB) = P(A)P(B|A) \dots\dots\dots \text{pod uslovom } P(A) \neq 0$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 \dots A_{n-1})$$

2. [2 poena] Definirati funkciju raspodele jednodimenzionalne slučajne promenljive i napisati njene osobine.

Ф-не рачуноне а прм. X је $F_X: \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$ гласо $F_X(x) = P(X \leq x)$.

1. $F_X(-\infty) = 0$
2. $F_X(+\infty) = 1$
3. неуп се веде $P(a \leq X < b) = F_X(b) - F_X(a)$
4. не постоји нест.

Ako je X slučajna promenljiva neprekidnog tipa, onda je $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$

3. [3 poena] Verovatnoća da će Pera jesti sladoled od vanile je 0.6, a verovatnoća da će jesti sladoled od čokolade je 0.5. Verovatnoća da će Pera jesti bar jedan sladoled je 0.9.

$$P(V) = 0.6 \quad P(C) = 0.5$$

Izračunati verovatnoću da će Pera jesti oba sladoleda.

$$P(V \cup C) = 0.9$$

Izračunati verovatnoću da će Pera jesti tačno jedan sladoled.

Ako je Pera jeo tačno jedan sladoled izračunati verovatnoću da je to sladoled od vanile.

4. [4 poen] Slučajna promenljiva X data je gustinom raspodele verovatnoća $\varphi_X(x) = \begin{cases} ax^2, & x \in (-2, 2) \\ 0, & x \notin (-2, 2) \end{cases}$.

Odrediti konstantu a . (Izračunati integral!)

$$1 = \int_{-2}^2 ax^2 dx = \dots$$

$$E(X^2 - 3X) = E(X^2) - 3 \cdot E(X)$$

$$E(X^2) = \int_{-2}^2 x^2 \cdot a x^2 dx$$

$$E(X) = \int_{-2}^2 x \cdot a x^2 dx$$

$$P(X = 0) = 0$$

Na grafiku funkcije gustine slučajne promenljive X predstaviti verovatnoću $P(-\frac{1}{2} < X \leq 1)$ i izračunati je.



$$\int_{-1/2}^1 ax^2 dx$$

5. [1 poen] Definirati matematičko očekivanje slučajne promenljive i napisati dve osobine.


✓

$$p_1: y = kx + m$$

$$A(-1, 0): 0 = k \cdot (-1) + m \rightarrow \underline{k=1}$$

$$C(0, 1): 1 = k \cdot 0 + m \rightarrow m=1$$

$$p_1: y = x + 1$$



6. [5 poena] Slučajna promenljiva (X, Y) je data funkcijom gustine $\varphi_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in \triangle ABC \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$, gde su temena $\triangle ABC$ tačke $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$ i $C(0, 1)$.

→ Izračunati $F_{X,Y}(x, y)$ u tački (x, y) iz oblasti $D = \{(x, y) : -1 < x < 0 \wedge 0 < y < x + 1\}$.

$$y = x + 1$$

Odrediti marginalnu funkciju gustine $\varphi_Y(y)$. ✓

Odrediti uslovnu funkciju gustine $\varphi_{X|Y=y}(x)$. ←


Izračunati $E(X|Y = y)$.

Odrediti funkciju raspodele slučajne promenljive $X|Y = y$.


$$F_{X,Y}(x,y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y \varphi_{X,Y}(u,v) du dv$$

$$(x,y) \in D$$

$$D = \{(x,y) : -1 < x < 0 \wedge 0 < y < x+1\}$$



$$F_{X,Y}(x,y) = \int_0^y dv \int_{v-1}^x 1 \cdot du$$




$$\begin{aligned} A: & v=u+1 \\ & v=y \\ \hline & u+1=y \\ & u=y-1 \end{aligned}$$

$$u=?$$

$$\begin{aligned} & y \\ & \hline & y=5 \end{aligned}$$

$$F_{X,Y}(x,y) = \int_{-1}^{y-1} du \int_0^{u+1} 1 dv + \int_{y-1}^0 du \int_0^y 1 dv$$

$$\varphi_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{X,Y}(x,y) dx, \quad y \in \mathbb{R}$$



$$B: y=kx+n$$

$$P: y=-x+1$$


$$B(1,0): 0 = 1 \cdot k + n \rightarrow k = -1$$

$$C(0,1): 1 = 0 \cdot k + n \quad \underline{n=1}$$

$$\underline{y \in (0,1)} : \varphi_Y(y) = \int_{y-1}^{-y+1} 1 dx = x \Big|_{y-1}^{-y+1} = (-y+1) - (y-1) = 2-2y$$

$$y \notin (0,1): \varphi_Y(y) = 0$$

gegeben: $f_{X,Y}(x,y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy, \quad x \in \mathbb{R}$



$$x \in (-1, 1) \begin{cases} x \in [-1, 0] \\ x \in (0, 1) \end{cases}$$

$$x \in [-1, 0]: \quad f_X(x) = \int_0^{x+1} 1 dy$$

$$x \in (0, 1): \quad f_X(x) = \int_0^{x+1} 1 dy$$


$$x \notin (-1, 1): \quad f_X(x) = 0$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

~~$$E(X|Y=y) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_{X|Y=y}(x) dx =$$~~

$$\varphi_{X|Y=y}(x) = \frac{\varphi_{X,Y}(x,y)}{\varphi_Y(y)}, \quad \varphi_Y(y) \neq 0$$

$$\boxed{y \in (0,1)} \quad \varphi_{X|Y=y}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2-2y} & , \quad \boxed{x \in (y-1, -y+1)} \\ \frac{0}{2-2y} = 0 & , \quad \text{otherwise} \end{cases}$$



$$E(X|Y=y) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \varphi_{X|Y=y}(x) dx$$

$$= \int_{y-1}^{-y+1} x \cdot \overset{\text{const}}{\left(\frac{1}{2-2y} \right)} dx = \frac{1}{2-2y} \cdot \frac{x^2}{2} \bigg|_{y-1}^{-y+1} = \dots$$

$$F_{X|Y=y}(x) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y=y}(t) dt$$

$x \in$:

$$F_{X|Y=y}(x) = \begin{cases} x \in (-\infty, y-1]: & \int_{-\infty}^x 0 dt = 0 \\ x \in (y-1, 1-y]: & \int_{-\infty}^{y-1} 0 dt + \int_{y-1}^x \frac{1}{2-2y} dt \\ x \in (1-y, \infty): & \int_{-\infty}^{y-1} 0 dt + \int_{y-1}^{1-y} \frac{1}{2-2y} dt + \int_{1-y}^x 0 dt = 1 \end{cases}$$

stefan.konjak@gmail.com

Predispitne obaveze 2 – 10 poena

1. [1 poen] Obeležje X ima Poasonovu $\mathcal{P}(\lambda)$, $\lambda > 0$, raspodelu. Posmatran je uzorak obima 99 za koji važi da je $\sum_{i=1}^{99} x_i = 99$.
Metodom momenata oceniti nepoznat parametar λ .
2. [1 poen] Obeležje X ima normalnu $\mathcal{N}(m, 1)$, $m \in \mathbb{R}$, raspodelu. Na osnovu uzorka -1, 1, 2, -3 napisati funkciju verodostojnosti za procenu nepoznatog parametra m .
3. [3 poen] Pokazati da je kovarijansna funkcija Poasonovog procesa sa parametrom $\lambda > 0$ data sa $K_X(t, s) = \lambda \min\{t, s\}$.

4. [3 poena] Neka je lanac Markova zadat matricom prelaza $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p & r \\ r & p \end{bmatrix}$

Ako je $\{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ skup stanja lanca X_n , odrediti m i uslove koje moraju da zadovoljavaju p i r .

Ako je sistem u početnom momentu bio u stanju s_1 , odrediti $p_1(2)$.

Izračunati verovatnoću $P(X_2 = s_2, X_3 = s_2, X_5 = s_1)$.

5. [1 poen] Čime je određen homogeni lanac Markova? Objasniti odgovor!

6. [1 poen] Definirati proces sa nezavisnim priraštajima i proces sa stacionarnim nezavisnim priraštajima.

Deo završnog ispita 1 – 35 poena

1. [7 poena] U dve mračne sobe na stolicama sede babe i žabe, na svakoj stolici jedna baba ili jedna žaba i nema praznih stolica. U prvoj sobi su 4 babe i 3 žabe, a u drugoj sobi 3 babe i 4 žabe. Deda Miloje na slučajan način bira sobu i iz nje jednu stolicu i sa sobom vodi onoga ko je sedeo na stolici.
 - a) Izračunati verovatnoću da je deda Miloje odveo sa sobom babu.
 - b) Ako je deda Miloje odveo sa sobom babu, izračunati verovatnoću da je baba sedela u prvoj sobi.
2. [12 poena] U kutiji se nalazi 6 kartica na kojima je napisan broj i to, jedna kartica sa brojem 0, dve kartice sa brojem 1, jedna kartica sa brojem 2 i dve kartice sa brojem 3. Veka na slučajan način uzima dve kartice iz kutije. Slučajna promenljiva X uzima vrednost 1 ako je zbir na izvučenim karticama 3, a vrednost 0 ako zbir na izvučenim karticama nije 3. Slučajna promenljiva Y predstavlja broj izvučenih kartica sa brojem 3.
 - a) Odrediti zakon raspodele verovatnoća slučajne promenljive (X, Y) i marginalne raspodele.
 - b) Ispitati nezavisnost slučajnih promenljivih X i Y , naći uslovnu raspodelu slučajne promenljive $Y|X = 0$ i izračunati koeficijent korelacije.
 - c) Odrediti raspodelu slučajne promenljive $Z = 3X - Y$.
3. [10 poena] Slučajna promenljiva X je data funkcijom gustine $\varphi_X(x) = \begin{cases} x^2 + ax, & x \in (0, 1) \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$.
 - a) Izračunati konstantu a .
 - b) Odrediti funkciju raspodele slučajne promenljive X .
 - c) Odrediti raspodelu slučajne promenljive $Y = -2X + 2$ i izračunati njeno matematičko očekivanje i disperziju.
4. [10 poena] Neka su X i Y nezavisne slučajne promenljive, pri čemu X ima eksponencijalnu $\mathcal{E}(2)$ raspodelu, a Y uniformnu $\mathcal{U}(1, 2)$ raspodelu. Odrediti raspodelu slučajne promenljive $Z = X - Y$.
5. [6 poena] Student nije spremio ispit i izlazi na test na kome dobija 20 pitanja na koje je potrebno odgovoriti zaokružavanjem odgovora. Na svako pitanje je ponuđeno 3 odgovora, od kojih je jedan tačan. Student na slučajan način zaokružuje odgovor na bilo koje pitanje, nezavisno od odgovora koje zaokružuje na preostala pitanja. Slučajna promenljiva X predstavlja broj pitanja na koje je student odgovorio ispravno. Odrediti zakon raspodele slučajne promenljive X i njenu karakterističnu funkciju.

Ako na ispit izađe 50 studenata, odrediti ukupan broj pitanja na koja će svi studenti koji su izašli na ispit ispravno odgovoriti.

Deo završnog ispita 2 – 25 poena

1. [6 poena] Obeležje X ima zakon raspodele $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ p & 2p & 1-3p \end{pmatrix}$.
 - a) Na osnovu uzorka 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 2, 1, metodom momenta odrediti vrednost nepoznatog parametra p .
 - b) Na osnovu uzorka obima n , metodom maksimalne verodostojnosti oceniti parametar p i ispitati centriranost dobijene ocene.
2. [6 poena] Harmonijski oscilator generiše signal dat funkcijom $X_t = A \cos(t + O)$, $t \in \mathbb{R}$ gde je A amplituda koja na slučajan način uzima vrednost iz intervala $(0, 2)$ a O oscilacija koja na slučajan način uzima vrednost iz intervala $(0, 2\pi)$. Amplituda i oscilacija su nezavisne slučajne promenljive. Izračunati očekivanje i korelacionu funkciju signala.
 $(\cos x \cos y = \frac{1}{2}(\cos(x - y) + \cos(x + y)))$
3. [7 poena] Perica i Žikica imaju dva bela i dva plava klikera, i žutu i zelenu kutiju u koje stavljaju po tačno dva klikera. Perica je rasporedio klikere tako da su oba bela klikera u istoj kutiji. Žikica je odlučio da svaki dan na slučajan način izvuče po jedan kliker iz svake kutije i zameni im mesta. Stanja sistema su određena brojem belih klikera u žutoj kutiji.
 - a) Odrediti matricu prelaza za jedan korak.
 - b) Da li postoje finalne verovatnoće? Odgovor obrazložiti i ako postoje, izračunati ih.
 - c) Izračunati verovatnoću da je posle dva dana Perica našao u žutoj kutiji klikere različitih boja.
4. [6 poena] U Keba Krabi rade dva kasira, Lignjoslav i Lignjorad. Na svakih 5 minuta dolazi jedna gladna mušterija, a primanje porudžbine u proseku traje 3 minuta. Red za čekanje nema ograničenje.
 - a) Opisati dati sistem usluživanja i naći finalne verovatnoće.
 - b) Izračunati očekivani broj gladnih mušterija u Keba Krabi.

Deo završnog ispita – 60 poena

Zadaci – raditi u svesci

1. [10 poena] U dve mračne sobe na stolicama sede babe i žabe, na svakoj stolici jedna baba ili jedna žaba i nema praznih stolica. U prvoj sobi su 4 babe i 3 žabe, a u drugoj sobi 3 babe i 4 žabe. Deda Miloje na slučajan način bira sobu i iz nje jednu stolicu i sa sobom vodi onoga ko je sedeo na stolici.
 - a) Izračunati verovatnoću da je deda Miloje odveo sa sobom babu.
 - b) Ako je deda Miloje odveo sa sobom babu, izračunati verovatnoću da je baba sedela u prvoj sobi.
2. [10 poena] Slučajna promenljiva X je data funkcijom gustine $\varphi_X(x) = \begin{cases} x^2 + ax, & x \in (0, 1) \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$.
 - a) Izračunati konstantu a .
 - b) Odrediti funkciju raspodele slučajne promenljive X .
 - c) Odrediti raspodelu slučajne promenljive $Y = -2X + 2$ i izračunati njeno matematičko očekivanje i disperziju.
3. [10 poena] Neka su X i Y nezavisne slučajne promenljive, pri čemu X ima eksponencijalnu $\mathcal{E}(2)$ raspodelu, a Y uniformnu $\mathcal{U}(1, 2)$ raspodelu. Odrediti raspodelu slučajne promenljive $Z = X - Y$.
4. [10 poena] Harmonijski oscilator generiše signal dat funkcijom $X_t = A \cos(t + O)$, $t \in \mathbb{R}$ gde je A amplituda koja na slučajan način uzima vrednost iz intervala $(0, 2)$ a O oscilacija koja na slučajan način uzima vrednost iz intervala $(0, 2\pi)$. Amplituda i oscilacija su nezavisne slučajne promenljive. Izračunati očekivanje i korelacionu funkciju signala.
$$(\cos x \cos y = \frac{1}{2}(\cos(x - y) + \cos(x + y)))$$
5. [10 poena] Perica i Žikica imaju dva bela i dva plava klikera, i žutu i zelenu kutiju u koje stavljaju po tačno dva klikera. Perica je rasporedio klikere tako da su oba bela klikera u istoj kutiji. Žikica je odlučio da svaki dan na slučajan način izvuče po jedan kliker iz svake kutije i zameni im mesta. Stanja sistema su određena brojem belih klikera u žutoj kutiji.
 - a) Odrediti matricu prelaza za jedan korak.
 - b) Da li postoje finalne verovatnoće? Odgovor obrazložiti i ako postoje, izračunati ih.
 - c) Izračunati verovatnoću da je posle dva dana Perica našao u žutoj kutiji klikere različitih boja.
6. [10 poena] U Keba Krabi rade dva kasira, Lignjoslav i Lignjorad. Na svakih 5 minuta dolazi jedna gladna mušterija, a primanje porudžbine u proseku traje 3 minuta. Red za čekanje nema ograničenje.
 - a) Opisati dati sistem usluživanja i naći finalne verovatnoće.
 - b) Izračunati očekivani broj gladnih mušterija u Keba Krabi.