PATIENTEN - INFORMATION

Temodal in Kombination mit der Radiotherapie

Diese Information dient dazu, Ihnen die korrekte Einnahme von Temodal zu erleichtern; sie ersetzt nicht das Informationsgespräch mit Ihrem/r Arzt/Ärztin und der Pflegefachperson.

Temodal wirkt gegen die Tumorzellen und soll kontinuierlich während der Radiotherapie eingenommen werden.

Tägliche Temodal-Dosismg pro Tag für Patient/In:	-
Verordnet durch Frau/ Hrn. Dr	

Temodal Kapseln	à 5mg	à 20mg	à 100mg	à 140mg
Anzahl Kapseln				

Beginn mit Temodal am 1. Tag der Bestrahlung, dann tägliche Einnahme bis und mit dem letztem Bestrahlungstag (auch an Wochenenden und Feiertagen):

- 1. Temodal wird 1 Stunde vor Bestrahlung auf nüchternen Magen eingenommen
- 2. Einnahme an den Bestrahlungs-Tagen:
 - 2 Stunden vor und 1 Stunde nach Einnahme von Temodal nüchtern bleiben (nichts essen, Wasser trinken erlaubt)
- 3. Einnahme an den Tagen ohne Bestrahlung (z.B. Wochenenden oder Feiertage):
 - Temodal morgens nüchtern einnehmen und danach 1 Stunde nüchtern bleiben
- 4. Die Temodal Kapseln aufs Mal und unzerkaut mit 1 Glas Wasser schlucken

Begleitsmedikamente
Ondansetron 4mg, nur am 1. und 2. Bestrahlungstag, 2 Stunde vor der Radiotherapie
Bei Übelkeit in Reserve Paspertin 10mg 1-1-1, bei Bedarf

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Temodal-Kapseln dürfen auf keinen Fall geöffnet oder zerkraut werden
- Bei Erbrechen nach Temodal-Einnahme: Dosis darf nicht nochmals eingenommen werden!
 Sorfortige Mitteilung an Ihre(n) Arzt/Ärztin oder zuständige Pflegefachperson
- Unwohlsein oder Grippe-Symptome (z.B. Husten, Fieber) bitte bei Ihrem/r Arzt/Ärztin oder zuständigen Pflegefachperson melden

1 x pro Woche, meist am Tag vor dem Arztbesuch, erfolgen eine Blutentnahme Allfällige weitere Fragen richten Sie bitte an Ihre/n zuständige/n Arzt/Ärztin oder Pflegefachperson



Version 1: Dr. C. Linsenmeier, 2010

Version 2: Dr. M. Brown, Dr. N. Andratschke, Prof.

M. Guckenberger, 2015