

Detalhamento Farmácia Paraná

Informações sobre Documentos para solicitação de medicamento

CID:	I500
Descrição:	INSUF CARDIACA CONGESTIVA
Medicamento:	SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA 100MG (49MG, 51MG)
Doença	Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.
Tipo da Solicitação	Solicitação inicial

Documentos gerais necessários

- Cópia de Documento de Identidade ou da Certidão de Nascimento
- Cópia do comprovante de residência no nome do paciente ou responsável OU declaração de residência
- Prescrição médica devidamente preenchida
- Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (LME), adequadamente preenchido (validade de 3 meses)
- Cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS)
- Cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física)

Documentos necessários para o medicamento SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA 100MG (49MG, 51MG)

- Dosagem sérica de peptídeo natriurético de tipo B (BNP) ou N-terminal pró-peptídeo natriurético de tipo B (NT-proBNP)
- Laudo de ecocardiografia contendo valor da fração de ejeção ventricular esquerda
- Relatório médico informando sintomas, tratamento atual e anterior e classe funcional da New York Heart Association (NYHA) (6 meses)
- Termo de Esclarecimento e Responsabilidade do PCDT de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (3 meses)



Sistema Único de Saúde
Ministério da Saúde
Secretaria de Estado da Saúde

COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTO(S)

SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO(S)

CAMPOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PELO MÉDICO SOLICITANTE

1-Número do CNES* 2 7 8 1 8 5 9		2- Nome do estabelecimento de saúde solicitante HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA					
3- Nome completo do Paciente*				5-Peso do paciente* kg		6-Altura do paciente* cm	
4- Nome da Mãe do Paciente*							
7- Medicamento(s)*		8- Quantidade solicitada*					
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1		60	60	60	60	60	60
2							
3							
4							
5							
6							
9- CID-10* I500		10- Diagnóstico Insuficiência Cardíaca					
11- Anamnese* Paciente com ICFER, BNP elevado, necessita da medicação para controle da doença e redução de morbimortalidade							
12- Paciente realizou tratamento prévio ou está em tratamento da doença?*							
☐ NÃO ☐ SIM. Relatar:							
13- Atestado de capacidade* A solicitação do medicamento deverá ser realizada pelo paciente. Entretanto, fica dispensada a obrigatoriedade da presença física do paciente considerado incapaz de acordo com os artigos 3º e 4º do Código Civil. O paciente é considerado incapaz? ☐ NÃO ☐ SIM. Indicar o nome do responsável pelo paciente, o qual poderá realizar a solicitação do medicamento Nome do responsável							
14- Nome do médico solicitante*				17- Assinatura e carimbo do médico*			
15- Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do médico solicitante*				16- Data da solicitação*			
18 - CAMPOS ABAIXO PREENCHIDOS POR*: ☐ Paciente ☐ Mãe do paciente ☐ Responsável (descrito no item 13) ☐ Médico solicitante ☐ Outro, informar nome: e CPF							
19- Raça/Cor/Etnia informado pelo paciente ou responsável* ☐ Branca ☐ Amarela ☐ Preta ☐ Indígena. Informar Etnia: ☐ Parda				20- Telefone(s) para contato do paciente			
21- Número do documento do paciente ☐ CPF ou ☐ CNS				23- Assinatura do responsável pelo preenchimento*			
22- Correio eletrônico do paciente							

* CAMPOS DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Receituário Médico

Para:

Uso oral / continuo:

1. -----60 cp/mes

Tomar 1 cp VO de 12/12h.

LONDRINA

RELATÓRIO MÉDICO

PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO REDUZIDA

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE	
Nome:	Idade:
CNS:	Telefone: ()
HISTÓRICO DO PACIENTE / TRATAMENTO	
1. TRATAMENTO(S) PRÉVIO(S) (MEDICAMENTOS UTILIZADOS E DOSES MÁXIMAS TOLERADAS):	
CRITÉRIOS	
• CLASSIFICAÇÃO NYHA () CLASSE NYHA I: Sem limitações para realização de atividade física. Atividades habituais não causam dispneia, cansaço e palpitações; () CLASSE NYHA II: Discreta limitação para realização de atividade física. Atividades habituais causam dispneia, cansaço e palpitações; (x) CLASSE NYHA III: Importante limitação para realização de atividade física. Atividades de intensidades inferiores causam dispneia, cansaço e palpitações; () CLASSE NYHA IV: Limitações para realização de qualquer atividade física. Sintomas de IC em repouso. • PA: _____ mmHg • FRAÇÃO DE EJEÇÃO: _____ % • BNP: _____ pg/dL ou NT-proBNP: _____ pg/dL ***ANEXAR CÓPIA DO ECOCARDIOGRAMA E DO EXAME DE NÍVEL SÉRICO DE BNP OU NT-proBNP, DE ACORDO COM O ASSINALADO***	
IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO PRESCRITOR	
Nome:	CRM:
Telefone: (43) 3371-2000	E-mail (opcional):
Assinatura:	Data:

TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE

DAPAGLIFLOZINA E SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA

Eu, _____ (nome do (a) paciente), declaro ter sido informado(a) sobre benefícios, riscos, contraindicações e principais eventos adversos relacionados ao uso de dapagliflozina e sacubitril valsartana sódica hidratada, indicada para o tratamento de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, segundo critérios de elegibilidade definidos neste Protocolo.

Os termos médicos foram explicados e todas as dúvidas foram esclarecidas pelo médico(a) _____ (nome do(a) médico(a) que prescreve).

Assim, declaro que fui claramente informado (a) de que o medicamento que passo a receber pode reduzir o risco de morte e de hospitalização relacionada à insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.

Fui também claramente informado (a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais eventos adversos e riscos:

- Dapagliflozina é contraindicada no segundo e terceiro trimestres da gestação. Os principais eventos adversos são depleção de volume, infecções urinárias, infecções genitais, hipoglicemia;
- Sacubitril valsartana sódica hidratada é contraindicado em gestantes e não deve ser usado concomitantemente com inibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) e antagonistas de receptor de angiotensina II. Em pacientes com uso prévio de IECA, deve-se iniciar o tratamento com sacubitril valsartana sódica hidratada pelo menos 36 horas após a última dose de IECA, em especial para minimizar o risco de eventos adversos.
- Todos esses medicamentos são contraindicados em casos de hipersensibilidade (alergia) aos fármacos ou aos componentes da fórmula.

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim e que é expressamente proibido doar, repassar, comercializar ou ofertar o medicamento para um terceiro. Comprometo-me a devolvê-lo no local de retirada (farmácia), caso não queira ou não possa utilizá-lo ou, ainda, se o tratamento for interrompido.

Autorizo a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná a fazer uso de informações relativas ao meu tratamento, de acordo com os termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD.

Local:		Data:	
Nome do paciente:			
Cartão Nacional de Saúde:			
Nome do responsável legal:			
Documento de identificação do responsável legal:			
Assinatura do paciente ou do responsável legal			
Médico responsável:		CRM:	UF: PR
Assinatura e carimbo do médico Data: _____			