

Вес = _____ кг

Рост = _____ см

ППТ = _____ м²

ICE (РОП/РОМТ)

Больница:

Имя: _____

Дата рожд.: _____



Ифосфамид интраперитонеально (1 ч.) 2000 мг/м² x 3 = |_|_|_|_| мг/сутки
с МЕСНОЙ:

2.000 мг/м² с гидратацией 3.000 мл/м²/день



Карбоплатин (1 ч)

500 мг/м² = |_|_|_|_| мг



Этопозид (1 ч)

100 мг/м² x 3 = |_|_|_|_| мг/сутки

День | 1 | 2 | 3 | 4 |

|_|_|_|_|

Дата

Сокращение дозировки у детей < 6 мес. Или < 10 кг!

Дозировка в мг/кг: (Доза/м², поделенная на 30 x кг от массы тела)

Рис. II.8: График приема ICE

День	Ифосфамид	Карбоплатин	Этопозид
1	2000 мг/м ² более 1 ч.	500 мг/м ² более 1 ч.	100 мг/м ² более 1 ч.
2	2000 мг/м ² более 1 ч.		100 мг/м ² более 1 ч.
3	2000 мг/м ² более 1 ч.		100 мг/м ² более 1 ч.
Суммарная доза за цикл	6000 мг/м ²	500 мг/м ²	300 мг/м ²

Табл. II.3: ICE: Ифосфамид/Карбоплатинум/Этопозид

Этопозид может быть заменен этопозидфосфатом при наличии. Используемая дозировка – 114 мг/м² этопозидфосфата в качестве эквивалентной дозы этопозид (100 мг)