## Блок терапии Карбоплатин / VP-16

День	Карбоплатин	VP-16	Дата
1	$150  \text{мг/м}^2$ /день в/в в течение 1 ч	$150 \mathrm{MF/M^2/день}$ в/в в течение 1 ч	
2	$150 \mathrm{mr/m^2/день}$ в/в в течение 1 ч	$150 \mathrm{Mr/m^2/день}$ в/в в течение 1 ч	
3	$150 \mathrm{MF/M^2/день}$ в/в в течение 1 ч	$150 \mathrm{MF/M^2/день}$ в/в в течение 1 ч	
4	$150 \mathrm{mr/m^2/день}$ в/в в течение 1 ч	$150 \mathrm{Mr/m^2/день}$ в/в в течение 1 ч	
Σ	600 мг/м <sup>2</sup>	600 мг/м <sup>2</sup>	

Этопозид (VP-  $150 \text{ мг/м}^2$ /день в/в в 0.9% растворе хлорида натрия или 5% растворе

16): глюкозы в течение 1 часа ежедневно 4 дня подряд.

Карбоплатин  $150 \text{ мг/м}^2$ /день в  $200 \text{ мл/м}^2$  5% раствора декстрозы в форме короткой

(Carbo): инфузии в течение 1 ч ежедневно 4 дня подряд.

Для всех блоков химиотерапии рекомендуется противорвотная терапия каким-либо из доступных антагонистов серотониновых рецепторов.