

**MINE – 21 – 28 -II**

День 1	День 2	День 3	День 4
Дексаметазон 8 мг в/в	Дексаметазон 8 мг в/в	Дексаметазон 8 мг в/в	Дексаметазон 8 мг в/в струйно или per os
5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	
Митоксантрон 8 мг/м <sup>2</sup> в/в струйно, медленно (в течение 10 мин) или капельно (в течение 30 мин).			
Этопозид 300 мг/м <sup>2</sup> 60 минутная инфузия	Этопозид 300 мг/м <sup>2</sup> 60 минутная инфузия	Этопозид 300 мг/м <sup>2</sup> 60 минутная инфузия	
Ифосфамид 1300 мг/м <sup>2</sup> + месна 1300 мг/м <sup>2</sup> – 24-х часовая инфузия	Ифосфамид 1300 мг/м <sup>2</sup> + месна 1300 мг/м <sup>2</sup> – 24-х часовая инфузия	Ифосфамид 1300 мг/м <sup>2</sup> + месна 1300 мг/м <sup>2</sup> – 24-х часовая инфузия	
Гидратация для поддержания диуреза 100 мл/час.	Гидратация для поддержания диуреза 100 мл/час.	Гидратация для поддержания диуреза 100 мл/час.	

Интервал между курсами 21 – 28 дней (отсчет от первого дня химиотерапии)

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

- При использовании антрациклинов возможно развитие кумулятивной кардиотоксичности. В случае, если больной ранее получал антрациклины необходим контроль Эхо-КГ (фракция выброса левого желудочка).
- В остальном рекомендации аналогичны таковым при режиме ICE