


Тактика лечения А: ПАЦИЕНТЫ С ПЕРВИЧНОЙ РЕЗЕКЦИЕЙ ОПУХОЛИ И БЕЗ ВИДИМЫХ МЕТАСТАЗОВ

Первичная резекция опухоли




Примечания: при копчиковых опухолях удаление опухоли и всего копчика единым блоком является обязательным для протокольных пациентов. Пациенты с неполной резекцией копчика расцениваются как пациенты, находящиеся под наблюдением.

Рисунок 19

Тактика лечения В: ПАЦИЕНТЫ С МЕТАСТАЗАМИ И/ИЛИ ОБШИРНЫМ ПРОЦЕССОМ

(ov – яичник, eg – экстрагонадно)

Предоперационная химиотерапия



Примечания: если прогрессия опухоли или опухолевые маркеры неизменны или снижение меньше, чем определено (см. сообщение об опухолевых маркерах), свяжитесь с координатором протокола и обсудите дополнительную локальную гипертермию.

Примечания: при копчиковой опухоли одновременное удаление опухоли и всего копчика единым блоком является обязательным для протокольных пациентов. Пациенты с неполной резекцией копчика расцениваются как пациенты, находящиеся под наблюдением.

Рисунок 20

Тактика лечения С: ПАЦИЕНТЫ С ОБШИРНЫМ И/ЛИ МЕТАСТАЗИРУЮЩИМ ПРОЦЕССОМ ПОСЛЕ НЕПОЛНОЙ РЕЗЕКЦИИ ОПУХОЛИ

(ov – яичник, eg – экстрагонадно)

Локали- Патологическая Операция Адьювантная химиотерапия
зация стадия

ov ps IIIa, IIIb, IV

resection

PEI

+

PEI

+


PEI

+

PEI

eg ps T 2 N X/1 M 0/1

time schedule (days):



tumormarker :

CT/MRI :

Примечания: если прогрессия опухоли или опухолевые маркеры неизменны или снижение меньше, чем определено (см. сообщение об опухолевых маркерах), свяжитесь с координатором протокола и обсудите дополнительную локальную гипертермию.

Примечания: при копчиковой опухоли одновременное удаление опухоли и всего копчика единым блоком является обязательным для протокольных пациентов. Пациенты с неполной резекцией копчика расцениваются как пациенты, находящиеся под наблюдением.