

Блок терапии VA I (модифицированный блок VA)

День	Актиномицин D	Винкристин	Дата
1	1.5 мг/м ² (болюс)	1.5 мг/м ² (болюс)	
(8) только блоки 5 и 6		1.5 мг/м ² (болюс)	
(15) только блоки 5 и 6		1.5 мг/м ² (болюс)	
(22) только блоки 5 и 6	1.5 мг/м ² (болюс)	1.5 мг/м ² (болюс)	
Σ	3 мг/м ² (блоки 5 и 6) 1.5 мг/м ² (блок 7)	6 мг/м ² (блоки 5 и 6) 1.5 мг/м ² (блок 7)	

Винкристин (VCR): 1.5 мг/м² в форме медленной болюсной в/в инъекции в 1 день недель 1, 2, 3 и 4 в ходе блока, однако в ходе последнего (7-го) блока не вводить в недели 2, 3 и 4. Не превышать максимальной разовой дозы, равной 2 мг VCR.

Актиномицин D (AMD): 1.5 мг/м² в форме медленной болюсной в/в инъекции в 1 день недель 1 и 4 в ходе блока, однако в ходе последнего (7-го) блока не вводить в 4 неделю. Не превышать максимальной разовой дозы, равной 2 мг AMD.

Рекомендуется противорвотная терапия доступными антагонистами серотониновых рецепторов.