

Вес = _____ кг

Рост = _____ см

ППТ = _____ м²

DOX (АТРО)

Больница:

Имя: _____

Дата рожд.: _____



Доксорубицин (24 ч) 37,5 мг/м²х2 = |_|_|_| мг

День

1	2	3	4
---	---	---	---

Метотрексат(МТХ) –интравент. = |_|_|_| мг

Доза: <2лет 2-3года >3лет

МТХ 0,5 1 2мг

(Уровни СКФ)

СТС!!!

--	--	--	--	--

Отправьте отчет о токсичности по

Дата

подпись

отправьте экземпляр в локальный исслед.центр
или международному координатору
Проф. д-р М. Фрювальд, Аугсбург

Сокращение дозировки у детей < 6 мес. Или < 10 кг!
Дозировка в мг/кг: (Доза/м² поделенная на 30 х кг от массы тела)

Рис. I.7: график приема DOX

День	Доксорубицин	Интравентрикулярная терапия
1	37,5 мг/м ²	МТХ
2	37,5 мг/м ²	МТХ
3		МТХ
4		МТХ
Суммарная доза за цикл	75 мг/м ²	Доза зав-т от возраста

Таблица I.5: Доксорубицин

Интравентр. терапия должна быть применена до лучевой терапии и не одновременно или после лучевой терапии!

Зависящая от возраста доза (получаемая через резервуар Рикхама)

Доза в мг	<2 лет	2-3 года	3>лет
MTX	0,5 мг	1мг	2мг

См. также указания по применению MTX 1.4.3.