

Курс В (В1)

Курс В1 начинать по восстановлении показателей периферической крови: нейтрофилы $> 0,5 \times 10^9/\text{л}$, тромбоциты $> 50 \times 10^9/\text{л}$, при удовлетворительном состоянии пациента и отсутствии лихорадки в течение более 3 дней (по данным группы ВФМ, в среднем, этот период занимает ~21 день).

Дни	1	2	3	4	5
Дексаметазон	• •	• •	• •	• •	• •
Метотрексат + лейковорин	•				
Инtrateкальное введение	•				
Циклофосфамид	•	•	•	•	•
Доксорубин				•	•

ДЕКСАМЕТАЗОН 10 мг/м² (за два введения) в дни с 1 по 5 перорально или в/в

МЕТОТРЕКСАТ 1 г/м² за 24 часа в день 1:10% от общей дозы за 30 минут, затем 90% инфузией за 23.5 часа. (См. приложение 4.1).

ЛЕЙКОВОРИН 15 мг/м² в/в на 42, 48 и 54 час от начала инфузии МТХ

ИНТРАТЕКАЛЬНО День 1 (через полчаса после начала инфузии метотрексата)

МТХ	АРА-С	PRED	ВОЗРАСТ
6 mg	16 mg	4 mg	<1 год
8 mg	20 mg	6 mg	1 < 2 лет
10 mg	26 mg	8mg	2 <3 лет
12 mg	30 mg	10 mg	>3 лет

ЦИКЛОФОСФАМИД 200 мг/м² инфузией за 60 минут в дни с 1 по 5. (В день 1 назначить за 6 часов до начала инфузии МТХ).

ДОКСОРУБИЦИН 25 мг/м² /в/в инфузией за 1 час в дни 4 и 5

ГИДРАТАЦИЯ Защелачивание в течение 48 часов после инфузии Метотрексата.
(см. приложение 4.1).

В/в или оральную гидратацию в объеме 3000 мл/м²/день продолжить в течение 12 часов после введения последней дозы Циклофосфамида.

Примечание: профилактическое введение GCSF не рекомендуется