

Курс I²VA

Ифосфамид (IFO): 3000 мг/м² ифосфамида вводится в виде 3-часовой в/в инфузии в дни 1 и 2 каждого курса I²VA. Параллельное введение месны 3000 мг/м²/сут до момента времени через 12-48 ч после окончания инфузии IFO. 20% всей дозы месны должно даваться в виде начального болюсного введения. Рекомендуется гидратация по меньшей мере 3000 мл/м²/сут, начиная за 3 часа до и заканчивая через 24-48 ч после введения IFO.

Винкристин (VCR): 1.5 мг/м² винкристина вводится в виде единичной болюсной инъекции в день 1 каждого курса I²VA (максимальная разовая доза 2 мг). Курсы 1 и 2: интенсификация благодаря дополнительному применению 1.5 мг/м² VCR в дни 8 и 15 курсов 1 и 2.

Актиномицин D (AMD): 1.5 мг/м² актиномицина D вводится в виде единичной болюсной в/в инъекции в день 1 каждого курса I²VA (максимальная разовая доза 2 мг).

Курс терапии I²VA

День	Ифосфамид	Винкристин	Актиномицин D	Месна	Дата
1	3000 мг/м ²	1.5 мг/м ² в/в болюс	1.5 мг/м ² в/в болюс	3000 мг/м ²	
2	3000 мг/м ²			3000 мг/м ²	
3				3000 мг/м ²	
8		1.5 мг/м ² в/в болюс. (Не во всех курсах – см. протокол)			
15		1.5 мг/м ² в/в болюс. (Не во всех курсах – см. протокол)			
Итого	6000 мг/м ²	4.5 мг/м ² (курсы – см. протокол) 1.5 мг/м ² (курсы – см. протокол)	1.5 мг/м ²		