

### Курс CEV

*Карбоплатин (CARBO):* 500 мг/м<sup>2</sup> карбоплатина в 200 мл/м<sup>2</sup> 5% раствора декстрозы вводится в виде 1-часовой в/в инфузии в день 1 каждого курса CEV.

*Эпирубицин (EPI):* 150 мг/м<sup>2</sup> эпирубицина в 5% растворе декстрозы вводится в виде 6-часовой в/в инфузии в день 1 каждого курса CEV – после введения карбоплатина.

*Винкристин (VCR):* 1.5 мг/м<sup>2</sup> винкристина вводится в виде единичной болюсной в/в инъекции в день 1 каждого курса CEV (максимальная разовая доза 2 мг). Курс 2: интенсификация благодаря дополнительному введению 1.5 мг/м<sup>2</sup> VCR в 1-й день недель 5 и 6.

### Курс терапии CEV

День	Карбоплатин	Эпирубицин	Винкристин	Дата
1	500 мг/м <sup>2</sup> в/в	150 мг/м <sup>2</sup>	1.5 мг/м <sup>2</sup> в/в болюс	
8			1.5 мг/м <sup>2</sup> в/в болюс (Не во всех курсах – см. протокол)	
15			1.5 мг/м <sup>2</sup> в/в болюс (Не во всех курсах – см. протокол)	
Итого	500 мг/м <sup>2</sup>	150 мг/м <sup>2</sup>	4.5 мг/м <sup>2</sup> (Не во всех курсах – см. протокол) 1.5 мг/м <sup>2</sup> (Номера курсов – см. протокол)	