

MiniBEAM

День 1	День 2	День 3	День 4
Дексаметазон 8 мг в/в	Дексаметазон 8 мг в/в	Дексаметазон 8 мг в/в	Дексаметазон 4 мг в/в струйно или per os
5HT3 антагонист	5HT3 антагонист	5HT3 антагонист	
Кармустин 60 мг/м ² 60-минутная инфузия			
Этопозид 100 мг/м ² 60 минутная инфузия	Этопозид 100 мг/м ² 60 минутная инфузия	Этопозид 100 мг/м ² 60 минутная инфузия	
Цитарабин 150 мг/м ² 60 минутная инфузия	Цитарабин 150 мг/м ² 60 минутная инфузия	Цитарабин 150 мг/м ² 60 минутная инфузия	
		Мелфалан 30 мг/м ² 30 минутная инфузия	

Интервал между курсами 21 – 28 дней (отсчет от первого дня химиотерапии)

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

- Режим вызывает тяжелую гемодепрессию у большинства больных в связи с чем должен использоваться в стационарах, обеспеченных компонентами крови и противомикробными препаратами. Рекомендуется проведение первичной профилактики нейтропенической инфекции с использованием Г-КСФ (филграстим или пэгфилграстим).