

Вес = _____ кг

Рост = _____ см

ППТ = _____ м²

АТРО

Высокая доза: Carbo/Thio

(Карбоплатин/Тиотепа)

Больница:

Имя: _____

Дата рожд.: _____

мг/д

мг/д

Карбоплатин 500 мг/м²/д

День с -6 по -4

=

Тиотепа 300 мг/м²/д 1 ч

День с -6 по -4

=

X

аутологичная ТСК

День

-6

-5

-4

-3

-2

0

дата

Г-КСФ: 150 μ и/ м²/д или 5 μ и/кг/д подкожно день+5 до ANC (абсолютное число нейтрофилов) > 1000 μ к в течение 3 дней

Рис. I. 10 Высокодозная терапия Carbo/Thiotера

День	Карбоплатин	Тиотепа	СКПК
-6	500 мг/м ² /д	300 мг/м ² 1ч	
-5	500 мг/м ² /д	300 мг/м ² 1ч	
-4	500 мг/м ² /д	300 мг/м ² 1ч	
-3			
0			X
Суммарная доза за цикл	1500 мг/м ²	900 мг/м ²	

Таблица I.9: Высокодозная терапия Carbo/Thiotера (Карбоплатин/Тиотепа)

Необходимые предварительные условия:

- удовлетворительное общее состояние здоровья
- отсутствие признаков инфекции
- отсутствие признаков нарушений ликвородинамики
- сердечная деятельность: Эхо-КГ (ФУ>28%) или радиоизотопная вентрикулография (ФВЛЖ>50%)
- Гемоглобин: > 8 г%
- Тромбоциты: > 100.000/мм³
- Нейтрофилы: > 1000/μл
- Скорость клубочковой фильтрации (СКФ): > 70 мл/мин/1,73м²
- Моча: отсутствие гематурии

Гидратация: 3 000 мл/м²/д, 24 ч, день -6 до -2

Г-КСФ: 150 μг/м²/д или 5 μг/кг/д подкожно день +5 до того момента, как ANC (абсолютное число нейтрофилов) > 1000 в течение 3 дней

Поддерживающая терапия:

- Замена препаратов крови
- Ранняя аналгезия опиоидными средствами
- Парентеральное питание с заменой витамина К
- Назогастральный зонд для замены энтеральной жидкости день -1
- Противомикробная профилактика, антимикотики, yotrimoxazol, ацикловир