Блок терапии Топотекан / Циклофосфамид

День	Топотекан	Циклофосфамид	Дата
1	1мг/м^2 /день в/в в течение 23 ч	250 мг/м ² /день в/в в течение 1 ч	
	, ,	+ месна 250-300 мг/м ² /день	
2	1мг/м^2 /день в/в в течение 23 ч	250 мг/м ² /день в/в в течение 1 ч	
		+ месна 250-300 мг/м ² /день	
3	1 мг/м^2 /день в/в в течение 23 ч	$250 \mathrm{MF/M^2/день}$ в/в в течение 1 ч	
		+ месна 250-300 мг/м ² /день	
4	1 мг/м^2 /день в/в в течение 23 ч	$250 \mathrm{MF/M^2/день}$ в/в в течение 1 ч	
		+ месна 250-300 мг/м ² /день	
Σ	$4 \text{ M}\Gamma/V^2$	1000 мг/м ²	

Топотекан (Торо):

 1 мг/м^2 /день в/в в 0.9% растворе хлорида натрия или 5% растворе

глюкозы в течение 23 ч ежедневно 4 дня подряд.

Циклофосфамид (CYC):

250 мг/м²/день в форме 1-часовой инфузии ежедневно 4 дня подряд. Дополнительно гидратация месной 250–300 мг/м²/день в форме длительной инфузии в течение 24 ч, с окончанием через 24 часов после последнего введения циклофосфамида.