

## 11.2. ХИМИОТЕРАПИЯ ВТОРОЙ ЛИНИИ

2-я линия терапии основана на протоколе CWS/CESS Rez 91 и CWS-2002-P.

На первом этапе необходимо провести 2 курса карбоплатин/этопозид и 1 курс ифосфамид/этопозид. Циклы повторяются каждые 4 недели.

### Курс А

*Карбоплатин (CARBO):* 150 мг/м<sup>2</sup>/д в/в капельно в течение 1 часа 1, 2, 3, 4 дни.

*Этопозид (ETO):* 150 мг/м<sup>2</sup>/д в/в капельно инфузией в течение 1 часа 1, 2, 3 и 4 дни.

Инфузия 3000 мл/м<sup>2</sup>/д под контролем электролитов.

*Курс „Карбоплатин / VP-16“*

1 день карбоплатин 150 мг/м<sup>2</sup>/д в/в в течение 1 часа + этопозид (вепезид) 150 мг/м<sup>2</sup>/д в/в в течение 1 часа

2 день карбоплатин 150 мг/м<sup>2</sup>/д в/в в течение 1 часа + вепезид 150 мг/м<sup>2</sup>/д в/в в течение 1 часа

3 день карбоплатин 150 мг/м<sup>2</sup>/д в/в в течение 1 часа + вепезид 150 мг/м<sup>2</sup>/д в/в в течение 1 часа

4 день карбоплатин 150 мг/м<sup>2</sup>/д в/в в течение 1 часа + вепезид 150 мг/м<sup>2</sup>/д в/в в течение 1 часа

Σ карбоплатина 600 мг/м<sup>2</sup> и этопозид 600 мг/м<sup>2</sup>

Этопозид (VP-16): 150 мг/м<sup>2</sup>/д в/в в 0.9% физ. раствора или 5% глюкозы в течение 1 часа ежедневно 1-4 дни.

Карбоплатин (Carbo): 150 мг/м<sup>2</sup>/д в 200 мл/м<sup>2</sup> 5% раствора декстрозы в течение 1 часа ежедневно 1-4 дни.

### Курс В

*Ифосфамид (IFO):* 2000 мг/м<sup>2</sup>/д в/в в течение 3 часов в инфузии 1, 2, 3 и 4 дни.

Параллельно месна 3000 мг/м<sup>2</sup>/д 1-4 дни и дополнительно 48 часов после окончания введения IFO, 20% месны необходимо вводить в/в струйно.

Инфузия 3000 мл/м<sup>2</sup>/д за 3 часа до и 48 час после введения ифосфамида.

*Этопозид (ETO):* 150 мг/м<sup>2</sup>/д в/в в течение 1 часа 1, 2, 3 и 4 дни.

### Курс С

*Карбоплатин (CARBO):* 150 мг/м<sup>2</sup>/д карбоплатин 1-часовая инфузия 1, 2, 3 и 4 дни.

Инфузия 3.000 мл/м<sup>2</sup>/д и контроль электролитов.

*Ифосфамид (IFO):* 2000 мг/м<sup>2</sup>/д ифосфамида в/в 3-часовая инфузия 1, 2, 3 и 4 дни.

Параллельно месна 3000 мг/м<sup>2</sup>/д 1-4 дни и дополнительно 48 часов после окончания введения IFO, 20% месны необходимо вводить в/в струйно.

Лечение проводить на фоне антиэметиков.

МРТ головного мозга и КТ органов грудной клетки повторить после 2 циклов ПХТ.

При достижении эффекта проводится 2 цикла А (карбоплатин + этопозид), 1 цикл В (этопозид + ифосфамид), 1 цикл А (карбоплатин+этопозид) и 2 цикла С (карбоплатин+ифосфамид).