

**Кондиционирование и посттрансплантационная фармакологическая профилактика РТПХ у пациентов с гемобластозами при выполнении ТГСК он неродственного и гаплоидентичного донора с TCRαβ-деплецией.**

Данная схема действительна с 22.02.2013 по 31.08.2013.

Кондиционирование			
Препарат	Курсовая доза	Дни введения	Порядок введения
<b>Треосульфат</b>	42 г/м <sup>2</sup>	-5,-4,-3	Инфузия за 2 часа
<b>Мельфалан</b>	140 мг/м <sup>2</sup>	-2	Инфузия за 1 час
<b>Флударабин</b>	150 мг/м <sup>2</sup>	-6,-5,-4,-3,-2	Инфузия за 1 час
<b>АТГАМ</b>	50 мг/кг	-5,-4	Инфузия за 6 часов

Профилактика РТПХ	
Препарат	Доза и режим введения
<b>Метотрексат</b>	5 мг/м <sup>2</sup> в/в в дни +1,+3,+6 лейковорин 5 мг/м <sup>2</sup> в/в в дни +2, +4, +7 через 24 часа после каждого введения метотрексата
<b>Такролимус</b>	0,02 мг/кг/сутки постоянной инфузией с дня -1 до возможности возобновления перорального приема, затем перорально до дня + 30. Целевая концентрация Tss 8-12 ng/ml