

9.1 N4 цикл

9.1.1 Критерии для начала N4 цикла

- Прогрессирование у пациентов из группы наблюдения или наличие жизнеугрожающих симптомов у пациентов группы наблюдения при первичной диагностике
- Дети до 6 месяцев, классифицированные как средняя или высокая группа риска
- ОАК: Лейкоциты $>2000/\text{мкл}$, гранулоциты $> 500/\text{мкл}$, тромбоциты $>50.000/\text{мкл}$

| | | | | |
|--|--|--|--------------|----------|
| | Доксорубицин | 15 мг/м ² х день | Дни 1,3, и 5 | 30 минут |
| | Винкристин | 0,75 мг/м ² х день | Дни 1,3, и 5 | струйно |
| | циклофосфан | 300 мг/м ² х день | Дни с 1 по 7 | 30 минут |
| | месна | 3 х 60 мг/м ² х день 0,4,8 час от начала циклофосфана | Дни с 1 по 7 | струйно |
| | Дозы для детей старше 1 года, для новорожденных смотри текст | | | |

9.1.2 Дозы для новорожденных и детей младшего возраста

| | Дети до 1 года и дети <10 кг веса | Дети ≥ 1 года | |
|--------------|--|--|---|
| Доксорубицин | 0,5 мг/кг х день | 15 мг/м ² х день | Дни 1,3, и 5 – 30 минутная инфузия |
| Винкристин | 0,025 мг/кг х день | 0,75 мг/м ² х день Максимум 2 мг | Дни 1,3, и 5 в/в струйно |
| циклофосфан | 10 мг/кг х день | 300 мг/м ² х день | Дни с 1 по 7 30 минутная инфузия |
| месна | 3 х 2 мг/кг | 3 х 60 мг/м ² х день | Дни с 1 по 7 в/в струйно 0,4,8 час от начала циклофосфана |
| Гидратация | 50 мл мг/кг х день Плюс через рот неограниченно | 2000 мл/м ² х день | Дни 1-7 |