

Предфаза

Этот курс лечения должен быть начат сразу как только подтвержден диагноз.

Дни	1	2	3	4	5
Дексаметазон	•	•	• •	• •	• •
Циклофосфамид	•	•			
Инtrateкальное введение	•				

ДЕКСАМЕТАЗОН

5 мг/м²/день в одной суточной дозе в/в или перорально в дни 1 и 2

10 мг/м²/день (за 2 введения) в/в или перорально в дни с 3 по 5

ЦИКЛОФОСФАМИД

200 мг/м² 60-тиминутной инфузией в дни 1 и 2

ИНТРАТЕКАЛЬНО

День 1

MTX	ARA-C	PRED	ВОЗРАСТ
6mg	16 mg	4 mg	<1 года
8 mg	20 mg	6 mg	1 - <2 лет
10 mg	26 mg	8 mg	2 - < лет
12 mg	30 mg	10 mg	> 3 лет

ИНФУЗИЯ

3000 мл/м²/день в/в

У пациентов с большой опухолевой массой имеется риск возникновения метаболических проблем связанных с опухолевым лизисом. В таких случаях может потребоваться защелачивание.

Аллопуринол 300 мг/м² ежедневно

Не менее одного раза в день оценивать б/х крови (электролиты, кальций, фосфор, мочевины), в зависимости от размеров опухоли.