

MINE – 21 – 28 – I

День 1	День 2	День 3	День 4
Дексаметазон 8 мг в/в	Дексаметазон 8 мг в/в	Дексаметазон 8 мг в/в	Дексаметазон 8 мг в/в струйно или per os
5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	
Этопозид 300 мг/м ² 60 минутная инфузия	Этопозид 300 мг/м ² 60 минутная инфузия	Этопозид 300 мг/м ² 60 минутная инфузия	
Ифосфамид 3300 мг/м ² + месна 3300 мг/м ² – 24-х часовая инфузия	Ифосфамид 3300 мг/м ² + месна 3300 мг/м ² – 24-х часовая инфузия	Ифосфамид 3300 мг/м ² + месна 3300 мг/м ² – 24-х часовая инфузия	
Гидратация для поддержания диуреза 100 мл/час.	Гидратация для поддержания диуреза 100 мл/час.	Гидратация для поддержания диуреза 100 мл/час.	

Если не получена полная ремиссия после первого курса, то второй курс:

День 1	День 2	День 3	День 4
Дексаметазон 8 мг в/в	Дексаметазон 8 мг в/в	Дексаметазон 8 мг в/в	Дексаметазон 8 мг в/в струйно или per os
5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	
Митоксантрон 20 мг/м ² в/в струйно, медленно (в течение			

10 мин) или капельно (в течение 30 мин).			
Ифосфамид 3300 мг/м ² + месна 3300 мг/м ² – 24-х часовая инфузия	Ифосфамид 3300 мг/м ² + месна 3300 мг/м ² – 24-х часовая инфузия	Ифосфамид 3300 мг/м ² + месна 3300 мг/м ² – 24-х часовая инфузия	
Гидратация для поддержания диуреза 100 мл/час.	Гидратация для поддержания диуреза 100 мл/час.	Гидратация для поддержания диуреза 100 мл/час.	

Интервал между курсами 21 – 28 дней (отсчет от первого дня химиотерапии)

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

- При использовании антрациклинов возможно развитие кумулятивной кардиотоксичности. В случае, если больной ранее получал антрациклины необходим контроль Эхо-КГ (фракция выброса левого желудочка).
- В остальном рекомендации аналогичны таковым при режиме ICE.