


Интенсификация



Консолидация II (Интенсификация)



При полном восстановлении гемопоэза (критерии те же, что для консолидации 1) и констатации гематологической ремиссии по данным миелограммы начинается 3-й курс химиотерапии:

- АТРА 25 мг/м²/сутки per os в капсулах по 10 мг в 2 приема – 14 дней.
- С 1 по 4 дни курса – цитозар 1000 мг/м² в/в в виде 2-часовой инфузии каждые 12 часов, всего 8 введений
- С 1 по 3 дни даунорубицин 30 мг/м² в/в в виде 30-минутной инфузии один раз в день, всего 3 введения.

Сопроводительная терапия проводится с учетом применения высоких доз цитазара (профилактика конъюнктивита – глазные капли с дексаметазоном (софрадекс), витамин В6 300 мг/м²/сут в/в перед каждым введением цитозара; при развитии «цитозарового легкого» - респираторного дистресс-синдрома взрослого типа: терапия метилпреднизолон (Солу-медрол, Пфайзер) в дозе 10-30 мг/кг/сутки в/в капельно за 1 час + ванкомицин 40 мг/кг/сутки в/в. Антиэметическая терапия – по общим правилам.

Суммарная доза даунорубицина составляет 405 мг/м²

При проведении курсов консолидации и особенно - интенсификации с целью снижения кардиотоксичности рекомендуется применение кардиопротектора – препарата дексразоксан (кардиоксана) в дозе 900 мг/м² (не более 1000 мг) перед каждым введением антрациклинового препарата.

В случае использования орунгала (итраконазол), вифенда (вориконазол) или ноксафила (позаконазол) для профилактики (лечения) грибковой инфекции обязательно указывать это в учетной карте (не исключено изменение фармакокинетики АТРА при совместном использовании).