

ДехаBEAM

День 1	День 2	День 3	День 4	День 5	День 6	День 7	Дни с 8 по 10
Дексаметазон 24 мг р.о.	Дексаметазон 24 мг р.о.	Дексаметазон 24 мг р.о.	Дексаметазон 24 мг р.о.	Дексаметазон 24 мг р.о.	Дексаметазон 24 мг р.о.	Дексаметазон 24 мг р.о.	Дексаметазон 24 мг р.о.
	5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	
	Кармустин 60 мг/м ² 60-миутная инфузия	Мелфалан 20 мг/м ² 30 минутная инфузия					
			Этопозид 75 мг/м ² 60 минутная инфузия	Этопозид 75 мг/м ² 60 минутная инфузия	Этопозид 75 мг/м ² 60 минутная инфузия	Этопозид 75 мг/м ² 60 минутная инфузия	
			Цитарабин 200 мг/м ² 60 минутная инфузия x 2 с интервалом 12 часов	Цитарабин 200 мг/м ² 60 минутная инфузия x 2 с интервалом 12 часов	Цитарабин 200 мг/м ² 60 минутная инфузия x 2 с интервалом 12 часов	Цитарабин 200 мг/м ² 60 минутная инфузия x 2 с интервалом 12 часов	

Интервал между курсами 21 – 28 дней (отсчет от первого дня химиотерапии)

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

- Режим вызывает тяжелую гемодепрессию у большинства больных в связи с чем должен использоваться в стационарах, обеспеченных компонентами крови и противоинфекционными препаратами. Рекомендуется проведение первичной профилактики нейтропенической инфекции с использованием Г-КСФ (филграстим или пэгфилграстим).
- Рекомендации по профилактики токсичности дексаметазона аналогичны таковым при режиме DHAP.