

День 1	День 2	День 3	День 4
Дексаметазон 8 мг в/в	Дексаметазон 8 мг в/в	Дексаметазон 8 мг в/в	Дексаметазон 8 мг в/в струйно или per os
5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	5НТЗ антагонист	
Этопозид 150 мг/м ² 60 минутная инфузия	Этопозид 150 мг/м ² 60 минутная инфузия	Этопозид 150 мг/м ² 60 минутная инфузия	
Эпирубицин 100 мг/м ² в/в медленно (3-5 минут)			
Ифосфамид 2500 мг/м ² + месна 2500 мг/м ² – 24-х часовая инфузия	Ифосфамид 2500 мг/м ² + месна 2500 мг/м ² – 24-х часовая инфузия	Ифосфамид 2500 мг/м ² + месна 2500 мг/м ² – 24-х часовая инфузия	
Гидратация для поддержания диуреза 100 мл/час.	Гидратация для поддержания диуреза 100 мл/час.	Гидратация для поддержания диуреза 100 мл/час.	

Интервал между курсами 21 день (отсчет от первого дня химиотерапии)

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

- При использовании антрациклинов возможно развитие кумулятивной кардиотоксичности. В случае, если больной ранее получал антрациклины необходим контроль Эхо-КГ (фракция выброса левого желудочка).
- В остальном рекомендации аналогичны таковым при режиме ICE