

Курс I³VE

Ифосфамид (IFO): 3000 мг/м² ифосфамида вводится в виде 3-часовой в/в инфузии в дни 1, 2 и 3 каждого курса I³VE. Параллельное введение месны 3000 мг/м²/сут до момента времени через 12-48 ч после окончания инфузии IFO. 20% всей дозы месны должно даваться в виде начального болюсного введения. Рекомендуется гидратация по меньшей мере 3000 мл/м²/сут, начиная за 3 часа до и заканчивая через 24-48 ч после введения IFO.

Винкристин (VCR): 1.5 мг/м² винкристина вводится в виде единичной болюсной инъекции в день 1 каждого курса I³VE (максимальная разовая доза 2 мг).

Этопозид (ETO): 150 мг/м² этопозид вводится в виде 2–4-часовой в/в инъекции в дни 1, 2 и 3 каждого курса I³VE.

Курс терапии I³VE

День	Ифосфамид	Винкристин	Этопозид	Месна	Дата
1	3000 мг/м ²	1.5 мг/м ² в/в болюс	150 мг/м ² в/в	3000 мг/м ²	
2	3000 мг/м ²		150 мг/м ² в/в	3000 мг/м ²	
3	3000 мг/м ²		150 мг/м ² в/в	3000 мг/м ²	
Итого	9000 мг/м ²	1.5 мг/м ²	450 мг/м ²		