

Курс I²VAd

Ифосфамид (IFO): 3000 мг/м² ифосфамида вводится в виде 3-часовой в/в инфузии в дни 1 и 2 каждого курса I²VAd. Параллельное введение месны 3000 мг/м²/сут до момента времени через 12-48 ч после окончания инфузии IFO. 20% всей дозы месны должно даваться в виде начального болюсного введения. Рекомендуется гидратация по меньшей мере 3000 мл/м²/сут, начиная за 3 часа до и заканчивая через 24-48 ч после введения IFO.

Винкристин (VCR): 1.5 мг/м² винкристина вводится в виде единичной болюсной инъекции в день 1 каждого курса I²VAd (максимальная разовая доза 2 мг). Курс 1: интенсификация благодаря дополнительному введению 1.5 мг/м² VCR в 1-й день недель 2 и 3.

Адриамицин (ADR): 40 мг/м² адриамицина в виде двух отдельных в/в инфузий (2 x 20 мг/м²/сут – 3-часовые инфузии с интервалом 8–12 часов) в дни 1 и 2 каждого курса I²VAd.

Курс терапии I²VAd

День	Ифосфамид	Винкристин	Адриамицин	Месна	Дата
1	3000 мг/м ²	1.5 мг/м ² в/в болюс	2 x 20 мг/м ²	3000 мг/м ²	
2	3000 мг/м ²		2 x 20 мг/м ²	3000 мг/м ²	
3				3000 мг/м ²	
8		1.5 мг/м ² в/в болюс (Не во всех курсах – см. протокол)			
15		1.5 мг/м ² в/в болюс (Не во всех курсах – см. протокол)			
Итого	6000 мг/м ²	4.5 мг/м ² (Номера курсов – см. протокол) 1.5 мг/м ² (Номера курсов – см. протокол)	80 мг/м ²		