

### Блок терапии $I^2VAd$

День	Ифосфамид	Адриамицин	Винкристин	Месна	Дата
1	3000 мг/м <sup>2</sup> (инфузия 3 ч)	2 x 20 мг/м <sup>2</sup> (инфузия по 3 ч)	1.5 мг/м <sup>2</sup> (болюс)	3000 мг/м <sup>2</sup> /день	
2	3000 мг/м <sup>2</sup> (инфузия 3 ч)	2 x 20 мг/м <sup>2</sup> (инфузия по 3 ч)		3000 мг/м <sup>2</sup> /день	
3				3000 мг/м <sup>2</sup> /день	
8			1.5 мг/м <sup>2</sup> (только блок 1)		
15			1.5 мг/м <sup>2</sup> (только блок 1)		
Итого	6000 мг/м <sup>2</sup>	80 мг/м <sup>2</sup>	4.5 мг/м <sup>2</sup> (блок 1) 1.5 мг/м <sup>2</sup> (блоки 3, 4 и 6)		

Ифосфамид (IFO):	3000 мг/м <sup>2</sup> ифосфамида вводится в виде 3-часовой в/в инфузии в 1 и 2 дни блока. Параллельное введение месны 3000 мг/м <sup>2</sup> /сут длительной инфузией до момента времени через 48 ч после окончания инфузии IFO. При этом количество, эквивалентное 20% дозы ифосфамида, должно вводиться в ходе начального болюсного введения. Предусмотрена в/в гидратация (с месной) по меньшей мере 2500 мл/м <sup>2</sup> /сут, начиная как минимум за 3 часа до и заканчивая как минимум через 48 ч после введения IFO.
Винкристин (VCR):	1.5 мг/м <sup>2</sup> в форме медленной болюсной в/в инъекции в 1 день блока. Первый блок дополнительно интенсифицируется 1.5 мг/м <sup>2</sup> VCR в дни 8 и 15. Не превышать максимальной разовой дозы, равной 2 мг VCR.
Адриамицин (ADR):	Адриамицин вводится в дозе 40 мг/м <sup>2</sup> в/в в виде двух разовых доз с интервалом в 12 ч, инфузия по 3 ч в 1 и 2 дни.