

**R-GIFOX - 21**

День 1	День 2	День 3	День 4
Ритуксимаб 375 мг/м <sup>2</sup> в/в			
	Дексаметазон 8 мг в/в	Дексаметазон 8 мг в/в	Дексаметазон 8 мг р.о.
	Гемцитабин 1 г/м <sup>2</sup> 30-минутная инфузия	5НТ3 антагонист	
		Оксалиплатин 130 мг/м <sup>2</sup> 2-х часовая инфузия	
		Ифосфамид 5000 мг/м <sup>2</sup> + месна 5000 мг/м <sup>2</sup> – 24-х часовая инфузия	
		В/в гидратация.	

Интервал между курсами 21 день (отсчет от первого дня химиотерапии)

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

- Введение ритуксимаба может сопровождаться развитием реакции гиперчувствительности и «цитокинового взрыва» (редко). При проведении лечения необходимо предусмотреть необходимость борьбы с подобными реакциями (наличие антигистаминных препаратов, кортикостероидов, катехоламинов и, при необходимости, проведения интенсивной терапии в отделении ОРИТ).
- Рекомендации по введению Ифосфамида и профилактике его токсичности аналогичны таковым при режиме ICE.
- Остальные рекомендации аналогичны таковым при курсе GEMOX