

Modelação de Sistemas Físicos

9ª Aula Teórica

Sumário:



Cap. 7 Oscilações

Oscilador Harmónico Simples

Bibliografia:

Cap. 7: Serway, cap. 15;

Sistema mola-massa



<https://youtu.be/FJBPNJR2QJU?t=210> (3' 30'')




Medições: O período T é proporcional à raiz quadrada da massa M

$$T = C\sqrt{M}$$

Período: intervalo de tempo para o movimento se repetir

Período do movimento da Terra à volta do Sol: 1 ano

As forças são obtidas por realização de experiências e medições.



Robert Hooke 1635-1703

$$\begin{cases} F_x = -k x \\ F_y = -k y \\ F_z = -k z \end{cases} \Leftrightarrow \vec{F} = -k\vec{r}$$


Lei de Hooke:

A extensão de uma mola (a partir do ponto de equilíbrio) é proporcional à força aplicada

\Leftrightarrow A força gerada pela mola é proporcional ao deslocamento do ponto de equilíbrio

Aplica-se à deformação elástica de vários corpos \Rightarrow **força elástica**

A 1D (segundo OX)



Por medições:

$$T = C\sqrt{m}$$


$$F_x = -k x$$

$$\vec{F}(t) = m \vec{a}(t) \quad \Rightarrow \quad \vec{a}(t) \quad \Rightarrow \quad \vec{v}(t) \quad \Rightarrow \quad \vec{r}(t)$$

$$\text{Com } F_x = -k x \quad \Rightarrow \quad a_x = -\frac{k}{m} x \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x(t) = A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \phi\right) \\ v_x(t) = -A \sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \phi\right) \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x(t) = A \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \phi\right), \\ v_x(t) = A \sqrt{\frac{k}{m}} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \phi\right) \end{cases}$$

A 1D (segundo OX)

$$a_x = -\frac{k}{m}x \Rightarrow \begin{cases} x(t) = A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi\right) \\ v_x(t) = -A\sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi\right) \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x(t) = A \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi\right), \\ v_x(t) = A\sqrt{\frac{k}{m}} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi\right) \end{cases}$$



SOLUÇÕES IGUAIS (só a expressão matemática é diferente) $\cos\left(x \pm \frac{\pi}{2}\right) = \mp \sin(x)$


Outras expressões matemáticas que representam a mesma solução:

$$\begin{cases} x(t) = C \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + D \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) \\ v_x(t) = -C\sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + D\sqrt{\frac{k}{m}} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) \end{cases}$$

Qualquer destas 3 expressões matemáticas concordam com a equação fundamental da dinâmica, na forma:

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$$

A 1D (segundo OX)



$$\begin{cases} x(t) = A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi\right) \\ v_x(t) = -A\sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi\right) \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x(t) = A \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi\right), \\ v_x(t) = A\sqrt{\frac{k}{m}} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi\right) \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x(t) = C \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + D \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) \\ v_x(t) = -C\sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + D\sqrt{\frac{k}{m}} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) \end{cases}$$

As constantes A , ϕ , φ , C e D dependem das condições iniciais: $x(t = 0)$ e $v_x(t = 0)$


Qualquer das três expressões matemáticas:


Com:

$$x(t = 0) = 4 \text{ m}$$

$$v_x(t = 0) = 0$$

$$\sqrt{\frac{k}{m}} = 1 \text{ rad/s}$$





A 1D (segundo OX)

$$\begin{cases} x(t) = A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \phi\right) \\ v_x(t) = -A \sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \phi\right) \end{cases}$$


Com:


$$x(t = 0) = 4 \text{ m}$$

$$v_x(t = 0) = 0$$

$$\sqrt{\frac{k}{m}} = 1 \text{ rad/s}$$

Determine A e ϕ





A 1D (segundo OX)

$$\begin{cases} x(t) = A \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi\right), \\ v_x(t) = A\sqrt{\frac{k}{m}} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi\right) \end{cases}$$


Com:

$$x(t = 0) = 4 \text{ m}$$


$$v_x(t = 0) = 0$$

$$\sqrt{\frac{k}{m}} = 1 \text{ rad/s}$$

Determine A e φ



A 1D (segundo OX)



$$\begin{cases} x(t) = C \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right) + D \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right) \\ v_x(t) = -C \sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right) + D \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right) \end{cases}$$


Com:


$$x(t = 0) = 4 \text{ m}$$

$$v_x(t = 0) = 0$$

$$\sqrt{\frac{k}{m}} = 1 \text{ rad/s}$$

Determine C e D






$$\begin{cases} x(t) = A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi\right) \\ v_x(t) = -A \sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi\right) \end{cases}$$

Determine A e ϕ

Sistema Mola-Corpo



A : Amplitude


ϕ : Fase inicial

Cap. 7 Oscilações

$$\begin{cases} x(t) = A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi\right) \\ v_x(t) = -A \sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi\right) \end{cases}$$

A : Amplitude

ϕ : fase inicial



Período T

$$x(t + T) = x(t)$$

$$A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}(t + T) + \phi\right) = A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi\right)$$


$$\sqrt{\frac{k}{m}}(t + T) + \phi = \left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi\right) + 2\pi$$

$$\sqrt{\frac{k}{m}}T = 2\pi$$


$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{k}} \sqrt{m} \quad \text{de acordo com as medições}$$

Sistema Mola-Corpo




Cap. 7 Oscilações



$$\begin{cases} x(t) = A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi\right) \\ v_x(t) = -A \sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi\right) \end{cases}$$

A : Amplitude

ϕ : fase inicial



Frequência: número de repetições por unidade de tempo

$$f = \frac{1}{T}$$

1 repetição - leva 1 T

f repetições - leva 1 s $\Rightarrow fT = 1$


unidade: 1/s = Hz

Como $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Ou $\sqrt{\frac{k}{m}} = 2\pi f$: **frequência angular** ω

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$




Movimento Harmónico Simples


$$F_x = -k x$$

$$\begin{cases} x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \\ v_x(t) = -A \omega \sin(\omega t + \phi) \end{cases}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$



Movimento Harmónico Simples – Energia Mecânica



$$F_x = -k x$$

$$F_x = -\frac{dE_p}{dx}$$

$$\Rightarrow E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

$$k = m \omega^2$$

$$E = E_c + E_p = \frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

$$\begin{cases} x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \\ v_x(t) = -A \omega \sin(\omega t + \phi) \end{cases}$$


$$\begin{aligned} E &= E_c + E_p \\ &= \frac{1}{2} m [A \omega \sin(\omega t + \phi)]^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 [A \cos(\omega t + \phi)]^2 \\ &= \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \phi) + \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \phi) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 [\sin^2(\omega t + \phi) + \cos^2(\omega t + \phi)]$$


$$E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$$

Movimento Harmónico Simples – Energia Mecânica


$$E_p = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \quad \text{e} \quad E = E_c + E_p = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$$



$$\begin{cases} x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \\ v_x(t) = -A \omega \sin(\omega t + \phi) \end{cases}$$



<https://www.geogebra.org/m/EGg2Pvhm>




Oscilador Harmónico Simples

Simple Harmonic Motion: Mass on a Spring

Autor: Alan Pacey, Tom Walsh

This simulation shows the oscillation of a box attached to a spring. Adjust the initial position of the box, the mass of the box, and the spring constant. Run, Pause, Reset, and Step buttons to examine the animation. Check or uncheck boxes to view/hide various information.



<https://www.geogebra.org/m/EGg2Pvhm>

Oscilador Harmónico Simples

Cap. 7 Problema 5:

Um objeto de 500g, preso a uma mola com $k=8\text{N/m}$, oscila num movimento com amplitude $A=10\text{cm}$.

Calcule:

- a) a velocidade e aceleração máximas.
- b) a velocidade e aceleração quando o objeto dista 6 cm da posição de equilíbrio.
- c) o tempo necessário para o objeto partir de $x=0$ e chegar a $x=8\text{ cm}$.

Formulário:

$$y(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{M}}$$