

# Exercices d'électromagnétisme

Martin ANDRIEUX

## Physique sur un lac

Les eaux d'un lac (de masse volumique  $\mu$ ) s'abaissent d'une hauteur  $h = 1$  m. Calculer la variation  $\Delta g$  qu'enregistre un gravimètre placé :

- Sur des pilotis, au milieu du lac, juste au dessus de la surface (avant qu'il ne baisse),
- à bord d'une barque ancrée au milieu du lac.

La rayon terrestre est  $R = 6400$  km, et le champ de pesanteur à l'altitude du lac est  $g = 9,8 \text{ m s}^{-2}$

$$\Delta g = -2\pi G\mu h = -0,42 \times 10^{-6} \text{ m s}^{-2}$$

$$\Delta g' = \Delta g + \frac{2gh}{R} = 2,64 \times 10^{-6} \text{ m s}^{-2}$$

## Cosmogonie du système solaire

Selon l'hypothèse de Laplace, le système solaire aurait été, à un moment de son évolution, constitué d'un tore fluide homogène de masse volumique  $\mu$  et d'axe (D), animé d'un mouvement de rotation uniforme de vitesse angulaire  $\omega$  autour de (D).

- On note  $\vec{h}$  le champ de gravitation,  $V$  le potentiel dont dérive  $\vec{h}$ , et  $G$  la constante de gravitation universelle. Quelle est l'équation locale vérifiée par  $V$  ?
- On note  $\vec{a}$  le champ (massique) des forces d'inerties d'entraînement dans le référentiel lié au fluide, et  $U$  le potentiel dont dérive  $\vec{a}$ . Calculer le laplacien  $\Delta U$ .
- On admet que la stabilité du système exige que, en tout point de la surface du tore, le champ total  $\vec{h} + \vec{a}$  soit dirigé vers l'intérieur de celui-ci. Montrer que  $\omega$  est nécessairement inférieur à une valeur que l'on calculera en fonction de  $G$  et  $\mu$ .

$$\Delta V - 4\pi G\mu = 0$$

$$\Delta U = -2\omega^2$$

$$\omega^2 < 2\pi G\mu$$

## Particules colloïdales dans un électrolyte

Dans un colloïde, des particules chargées sont en suspension dans un électrolyte. Pour étudier l'effet de ions sur le champ et le potentiel électrique, on considère en coordonnées sphériques une particule colloïdale de centre  $O$ , de rayon  $R$ , portant une charge  $Q$  uniformément répartie sur sa surface. Les ions de charge  $\pm e$  (cations ou anions), auraient en l'absence de particule colloïdale la même densité particulaire  $n_0$ . Soumis à un potentiel  $V(r)$ , un ion de charge  $a$  a (en raison de la loi de Boltzmann) la densité particulaire  $n_0 \exp\left(-\frac{qV(r)}{k_B T}\right)$ .

- Exprimer, pour  $r > R$ , la densité volumique de charge  $\rho(r)$  en fonction du potentiel  $V(r)$ , de  $n_0$ ,  $T$  et de constantes. Simplifier cette expression en faisant l'hypothèse que  $eV(r) \ll k_B T$  (cela signifie que l'agitation thermique est prépondérante).
- Dans ce cas, calculer le potentiel  $V(r)$ , en posant  $U(r) = rV(r)$  et  $\lambda^2 = \frac{\epsilon_0 k_B T}{2n_0 e^2}$ . On donne le laplacien

en coordonnées sphériques pour  $V(r)$  :

$$\Delta V = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{dV}{dr} \right)$$

- c) Quelle est la signification de  $\lambda$ , appelé *longueur de Debye* de la suspension colloïdale ? Que devient  $V(r)$  si  $\lambda$  tend vers zéro ou l'infini ? Calculer  $\lambda$  pour de l'eau pure à 300 K, et pour une solution molaire de NaCl. (On donne  $k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ )

Rappel : Un colloïde est une suspension d'une ou plusieurs substances dispersées régulièrement dans un liquide, formant un système à deux phases séparées.

a)  $\rho(r) \approx -2e^2 n_0 \frac{V(r)}{k_B T}$

- b) Avec l'équation de Poisson :  $V(r) = \frac{A}{r} \exp\left(\frac{-r}{\lambda}\right)$ . On trouve la constante  $A$  en écrivant le champ électrique pour  $r = R$ . Alors

$$V(r) = \frac{Q \exp\left(\frac{R-r}{\lambda}\right)}{4\pi\epsilon_0 r \left(1 + \frac{R}{\lambda}\right)}$$

- c) Pour l'eau pure,  $\lambda = 0,15 \mu\text{m}$  ; pour NaCl molaire,  $\lambda = 49 \text{ pm}$ , de l'ordre d'un rayon ionique.

### Distribution quadripolaire : molécule de dioxyde de carbone

Compte tenu des différences d'électronégativité de l'oxygène et du carbone, on peut schématiser la molécule de dioxyde de carbone, d'un point de vue électrostatique, par trois charges alignées sur un axe  $Oz$  :  $+2q$  en  $O$ ,  $-q$  aux points d'abscisse  $a$  et  $-a$ .

- a) Calculer le potentiel et le champ en un point  $M$  éloigné de  $O$  (on pose  $OM = r$  et  $(Oz, OM) = \theta$ ).  
 b) Quelle est l'équation des lignes de champ ?  
 c) Tracer l'allure de la carte de champ avec les équipotentiels.

$$V(M) = qa^2 \frac{1 - 3\cos^2(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$r = k|\sin(\theta)|\sqrt{|\cos(\theta)|}$$

### Répartition surfacique de dipôles sur un disque

Un disque de centre  $O$  et de rayon  $R$  porte, répartis uniformément sur sa surface, des dipôles électriques dont les moments dipolaires lui sont orthogonaux. Soit  $\mu = \frac{dp}{dS}$  la densité surfacique de moment dipolaire. Calculer le champ et le potentiel en tout point de l'axe de révolution  $Oz$  du disque (plusieurs méthodes sont possibles). Que deviennent ces résultats pour  $z \gg R$  ?

$$V(z) = \frac{\mu}{2\epsilon_0} \left( \frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$$

$$E(z) = \frac{\mu R^2}{2\epsilon_0} (r^2 + R^2)^{-\frac{3}{2}}$$

### Expérience de Nichols

Un métal contient par unité de volume lorsqu'il est immobile  $n_0$  ions positifs de charge  $e$  et  $n_0$  électrons libres de charge  $-e$  et de masse  $m$ . Un long cylindre de ce métal, de rayon  $a$ , est mis en rotation autour de

son axe de révolution  $Oz$  avec la vitesse angulaire constante  $\omega$ . À l'équilibre, les ions et les électrons sont entraînés à la vitesse de rotation  $\omega$ , et n'ont donc pas de mouvement par rapport au métal. À l'équilibre, il apparaît une densité volumique de charge  $\rho(r)$  dans le cylindre, ainsi qu'une densité surfacique  $\sigma$  à la surface de celui-ci. En coordonnées cylindriques, on a pour un champ radial :  $\text{div } \vec{E} = \frac{1}{r} \frac{d(rE_r)}{dr}$ .

- Calculer le champ électrique dans le métal, et en déduire la différence de potentiel  $U$  entre l'axe du cylindre et sa périphérie.
- En déduire la densité  $n(r)$  des électrons libres dans le volume du métal, et le charge surfacique  $\sigma$ .


$$U = \frac{m\omega^2 a^2}{2e}$$

$$n(r) = n_0 - \frac{2m\epsilon_0\omega^2}{e^2}$$

$$\sigma = -\frac{m\epsilon_0\omega^2 a}{e}$$

### Capacité d'un condensateur diédrique

On considère un condensateur dont les deux armatures, rectangulaires, sont situées dans deux plans verticaux faisant entre eux un angle  $\alpha$ . Les côtés verticaux de ces rectangles, de hauteur  $h$ , sont respectivement situés aux distances  $R_1$  et  $R_2$  de l'axe  $Oz$  (voir figure).




- Les deux armatures sont portées respectivement aux potentiels  $V_A = 0$  et  $V_B = V_0$ . Si l'on néglige les effets de bords, quelle est l'allure des équipotentiellles et des lignes de champ entre A et B ? En déduire le potentiel  $V(M)$  et le champ  $\vec{E}(M)$  en un point quelconque entre les armature.
- Retrouver l'expression de  $V(M)$  à partir du laplacien en coordonnées cylindriques.
- Calculer par deux méthodes la capacité de ce condensateur.

### Association de condensateurs et bilan d'énergie

On étudie le système représenté ci-contre, où tous les condensateurs ont même capacité  $C$ . Quelle est la charge de chacun d'entre eux ?

On introduit un quatrième condensateur de capacité  $C$  entre A et B. Il a été au préalable chargé sous la tension  $U$  positive et son armature chargée positivement est placée du côté de A. Quelles sont les nouvelles charges de chaque condensateur à l'équilibre ?

Faire un bilan d'énergie entre l'état initial de la question précédente et l'état final.



$$2q_1 = 2q_2 = q_3 = 2\frac{CU}{3}$$

$$q'_1 = q'_2 = \frac{CU}{4} \text{ et } q'_3 = q'_4 = 3\frac{CU}{4}$$

L'énergie électrostatique diminue de  $\frac{5CU^2}{24}$ , et les pertes par effet Joule valent  $\frac{CU^2}{24}$