

Probabilités

Nathan MAILLET

Définition

Tribus Soit Ω un ensemble. Une tribu sur Ω est une partie \mathcal{T} de $\mathcal{P}(\Omega)$ telle que :

- $\emptyset \in \mathcal{T}$
- $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), A \in \mathcal{T} \implies A^c \in \mathcal{T}$
- $\forall (A_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}, \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{T}$

Quand Ω est fini ou dénombrable, on choisira $\mathcal{P}(\Omega)$ comme tribu.

Les tribus sont stables par intersection.

Définition

Système complet d'évènements Soit $(A_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}$, c'est un système complet d'évènements si :

- Les A_i sont deux à deux disjoints
- $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = 1$
- $\forall i, P(A_i) \neq 0$

Formule des probabilités totales

Soit (A_i) un système complet d'évènements, on a :

$$\forall B, P(B) = \sum_i P(A_i)P_{A_i}(B)$$

Définition

Probabilités Une loi de probabilité sur (Ω, \mathcal{T}) est une application $P : \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{R}^+$ tel que :

- $P(\Omega) = 1$
- $\forall (A_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}, A_i \cap A_j = \emptyset,$

$$\sum_{i \geq 0} P(A_i) \text{ converge et } \sum_{i=0}^{+\infty} P(A_i) = P(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i)$$

Définition

Variable aléatoire Soit \mathcal{X} un ensemble fini ou dénombrable. Une variable aléatoire discrète de Ω dans \mathcal{X} est une application

$$X : \Omega \rightarrow \mathcal{X} / \forall A \subset \mathcal{X}, X^{-1}(A) \in \mathcal{T}$$

Continuité croissante et décroissante

Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}$ est croissante,

$$P(A_n) \xrightarrow{+\infty} P(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k)$$

Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}$ est décroissante,

$$P(A_n) \xrightarrow{+\infty} P(\bigcap_{k \in \mathbb{N}} A_k)$$

- Un couple de variables aléatoires est une variable aléatoire
- Les composantes d'une variable aléatoire sont des variables aléatoires
- X est une variable aléatoire, $f \circ X$ en est une
- On retrouve la même définition d'indépendance mutuelle avec les variables aléatoires

Définition

Indépendance mutuelle On dit que $(A_i)_{i \in I} \in \mathcal{T}^I$ sont mutuellement indépendants si $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall i_1, \dots, i_n$ éléments distincts de I , $P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_n}) = P(A_{i_1}) \times \dots \times P(A_{i_n})$

Lemme des coalitions

Soit $X_1 \dots X_n$ des variables aléatoires indépendantes, $\forall k \leq n-1, (X_1, \dots, X_k), (X_{k+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes

Théorème de transfert

Soit X une variable aléatoire de Ω dans \mathcal{X} et $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$. $f(x)$ a une espérance si et seulement si la famille $(f(x_i)P(X = x_i))_{i \in I}$ est sommable. Si $f(x)$ a une espérance, alors :

$$E(f(x)) = \sum_{i \in I} f(x_i)P(X = x_i)$$

Espérance

L'espérance est linéaire et si X, Y possèdent un moment d'ordre 1 et sont indépendants,

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

Inégalité de Markov

Inégalité de Markov : Soit X une variable aléatoire réelle positive qui possède un moment d'ordre 1 :

$$\forall a > 0, P(X \geq a) \leq \frac{E(|X|)}{a}$$

Définition

Variance, écart-type et covariance Soient (X, Y) deux variables aléatoires discrètes qui possèdent un moment d'ordre 2, on a :

- $X - E(X)$ possède un moment d'ordre 2 appelé variance de X
- $V(X) = E((X - E(X))^2)$
- On appelle écart-type de X : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$
- On appelle covariance de (X, Y) : $\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$

-
- $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$
 - $\forall \alpha \in \mathbb{R}, V(X + \alpha) = V(X)$ et $V(\alpha X) = \alpha^2 V(X)$
 - La variable aléatoire $\frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$ est dite centrée réduite
 - $V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2 * \text{Cov}(X, Y)$ et si X, Y sont indépendants, $\text{Cov}(X, Y) = 0$
 - $\sqrt{V(X + Y)} \leq \sqrt{V(X)} + \sqrt{V(Y)}$
 - Définition : $\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$

Inégalité de Cauchy-Swarz

Soient (X, Y) deux variables aléatoires discrètes qui possèdent un moment d'ordre 2, on a :

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$$

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Soit X une variable aléatoire réelle possédant un moment d'ordre 2, on a :

$$\forall a > 0, P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}$$

Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ une variable aléatoire.

Définition

Série génératrice La série génératrice de X est la série entière $G_X(z) = \sum_{n \geq 0} P(X = n)z^n$. Son noyau est au moins 1 et il y a convergence normale pour $z \in \mathbb{C}, |z| \leq 1$.

Application des série génératrice

X possède une espérance finie si et seulement si G_X est dérivable en 1^- , avec :

$$E(X) = G'_X(1)$$

-
- En dérivant G_X on retrouve facilement que X possède un moment d'ordre 2 si et seulement si G_X est 2 fois dérivable en 1 et $V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2$
 - Soit $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ une variable aléatoire indépendante de X . On a : $G_{X+Y} = G_X G_Y$