UNIVERSITAT DE BARCELONA

Universitat Oberta de Catalunya

MÁSTER EN BIOINFORMÁTICA Y BIOESTADÍSTICA

M0.155

Primera Prueba de Evaluación Contínua

Inferencia Estadística

Autora: Dra. Marta Barea Sepúlveda

Fecha: 7 de abril de 2026

Índice

1. Ejercicio 1 **1**

1.1. Enunciado 1

1.2. Resolución 1

2. Ejercicio 2 **3**

2.1. Enunciado 3

2.2. Resolución 4

3. Ejercicio 3 **8**

3.1. Enunciado 8

3.2. Resolución 8

1. Ejercicio 1

1.1. Enunciado

En un ensayo clínico de un nuevo fármaco oncológico, se estudia el número de efectos adversos leves que presenta un paciente durante el primer ciclo de tratamiento. Se propone el siguiente modelo:

$$\bar{p}(x) = K(x+3), \quad x = 0, 1, 2, 3, 4$$

1. Determinar el valor de K para que $p(x)$ sea una función de probabilidad.
2. Calcular la esperanza y la varianza del número de efectos adversos por paciente.
3. Calcular:
   a) La probabilidad de que un paciente presente exactamente 1 efecto adverso.
   b) La probabilidad de que presente al menos 2 efectos adversos.
   c) La probabilidad de que presente como máximo 3 efectos adversos.

1.2. Resolución

1. **Determinar el valor de K para que $p(x)$ sea una función de probabilidad.**

   Nos encontramos ante una función de probabilidad discreta, por lo que debemos asegurarnos de que la suma de las probabilidades para todos los valores posibles de x sea igual a 1. Dado que x puede tomar los valores $0, 1, 2, 3$ y 4, tenemos:

   $$\sum_{x=0}^{4} p(x) = \sum_{x=0}^{4} K(x+3) = K \sum_{x=0}^{4} (x+3)$$

   Calculamos la suma dentro del paréntesis:

   $$\sum_{x=0}^{4} (x+3) = (0+3) + (1+3) + (2+3) + (3+3) + (4+3) = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 25$$

   Entonces, la suma de las probabilidades es:

   $$\sum_{x=0}^{4} p(x) = K \cdot 25$$

   Como debe cumplirse que esta suma sea igual a 1, tenemos:

   $$K \cdot 25 = 1 \implies K = \frac{1}{25} = 0.04$$

   Por tanto, para que $p(x)$ sea una función de probabilidad, el valor de K debe ser 0.04. Además, debe cumplirse que $p(x) \geq 0$ para todos los valores de x. Dado que K es positivo y $x + 3$ es siempre positivo para $x \geq 0$, esta condición también se cumple.

2. **Calcular la esperanza y la varianza del número de efectos adversos por paciente.**

La **esperanza** $E[X]$ de una variable aleatoria discreta se calcula como:

$$E[X] = \sum_{x=0}^{4} x \cdot p(x)$$

Calculamos $E[X]$:

$$E[X] = \sum_{x=0}^{4} x \cdot p(x) = \sum_{x=0}^{4} x \cdot 0.04(x+3) = 0.04 \sum_{x=0}^{4} x(x+3)$$

Calculamos la suma dentro del paréntesis:

$$\sum_{x=0}^{4} x(x+3) = \sum_{x=0}^{4} (x^2 + 3x) = \sum_{x=0}^{4} x^2 + 3 \sum_{x=0}^{4} x$$

Calculamos cada suma por separado:

$$\sum_{x=0}^{4} x^2 = 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30$$

$$\sum_{x=0}^{4} x = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

Entonces:

$$\sum_{x=0}^{4} x(x+3) = 30 + 3 \cdot 10 = 60$$

Por lo tanto:

$$E[X] = 0.04 \cdot 60 = 2.4$$

La **varianza** $Var(X)$ se calcula como:

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Primero calculamos $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \sum_{x=0}^{4} x^2 \cdot p(x) = \sum_{x=0}^{4} x^2 \cdot 0.04(x+3) = 0.04 \sum_{x=0}^{4} x^2(x+3)$$

Calculamos la suma dentro del paréntesis:

$$\sum_{x=0}^{4} x^2(x+3) = \sum_{x=0}^{4} (x^3 + 3x^2) = \sum_{x=0}^{4} x^3 + 3 \sum_{x=0}^{4} x^2$$

Calculamos cada suma por separado:

$$\sum_{x=0}^{4} x^3 = 0^3 + 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 100$$

$$\sum_{x=0}^{4} x^2 = 30$$

Entonces:

$$\sum_{x=0}^{4} x^2(x+3) = 100 + 3 \cdot 30 = 190$$

Por lo tanto:

$$E[X^2] = 0.04 \cdot 190 = 7.6$$

Finalmente:

$$Var(X) = 7.6 - (2.4)^2 = 7.6 - 5.76 = 1.84$$

3. **Calcular:**

   a) **La probabilidad de que un paciente presente exactamente 1 efecto adverso.**

   Evaluamos la función de probabilidad en $x = 1$:

   $$P(X = 1) = p(1) = 0.04(1 + 3) = 0.16$$

   b) **La probabilidad de que presente al menos 2 efectos adversos.**

   Sumamos las probabilidades para $x \geq 2$:

   $$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) \\ &= 0.04(2 + 3) + 0.04(3 + 3) + 0.04(4 + 3) \\ &= 0.20 + 0.24 + 0.28 = 0.72 \end{aligned}$$

   c) **La probabilidad de que presente como máximo 3 efectos adversos.**

   Sumamos las probabilidades para $x \leq 3$:

   $$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\ &= 0.12 + 0.16 + 0.20 + 0.24 = 0.72 \end{aligned}$$

2. Ejercicio 2

2.1. Enunciado

En un reciente estudio sobre la incidencia de ceguera en personas con diabetes insulinodependiente (DID), se reportó una tasa anual de ceguera del 0.67 % entre hombres de 30 a 39 años con DID, y del 0.74 % entre mujeres de 30 a 39 años con DID.

a) Si se selecciona un grupo de 200 hombres DID de 30 a 39 años, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 se vuelvan ciegos en un año?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer DID de 30 años se vuelva ciega en los próximos 10 años? ¿Y cuál es la probabilidad en el caso de un hombre?

c) Supón que se tienen 10 hombres DID de 30 a 39 años y 10 mujeres DID de 30 a 39 años. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 3 personas con DID se vuelvan ciegas en 10 años?

d) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 de las 20 personas se vuelvan ciegas en 10 años?

2.2. Resolución

a) **Calcular la probabilidad de que exactamente 2 de 200 hombres DID de 30-39 años se vuelvan ciegos en un año.**

La tasa anual de ceguera en hombres DID de 30-39 años es del 0.67 %. Expresado como probabilidad, esto equivale a:

$$p_h = \frac{0.67}{100} = 0.0067$$

Nos encontramos ante un experimento compuesto por un número fijo de ensayos independientes, donde cada individuo puede presentar o no el evento de interés (ceguera), con probabilidad constante. Por tanto, modelamos la variable aleatoria como una **distribución binomial**:

$$X \sim \text{Bin}(n = 200,\, p = 0.0067)$$

La función de probabilidad de una distribución binomial viene dada por:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

En este caso queremos calcular la probabilidad de que exactamente 2 hombres se vuelvan ciegos en un año, es decir:

$$P(X = 2) = \binom{200}{2} (0.0067)^2 (1 - 0.0067)^{200-2}$$

Sustituyendo:

$$P(X = 2) = \binom{200}{2} (0.0067)^2 (0.9933)^{198}$$

Calculamos el coeficiente binomial:

$$\binom{200}{2} = \frac{200 \cdot 199}{2} = 19900$$

Entonces:

$$P(X = 2) = 19900 \cdot (0.0067)^2 \cdot (0.9933)^{198} \approx 0.2360$$

Por tanto, la probabilidad de que exactamente 2 de los 200 hombres se vuelvan ciegos en un año es aproximadamente 0.2360.

b) **Calcular la probabilidad de que una mujer DID de 30 años se vuelva ciega en los próximos 10 años, y compararla con la de un hombre.**

Según el enunciado, la tasa anual de ceguera es:

- En mujeres DID de 30-39 años: 0.74 %
- En hombres DID de 30-39 años: 0.67 %

Expresadas como probabilidades:

$$p_m = \frac{0.74}{100} = 0.0074 \qquad p_h = \frac{0.67}{100} = 0.0067$$

Queremos calcular la probabilidad de que una persona se vuelva ciega en los próximos 10 años. Para ello, resulta más sencillo calcular primero la probabilidad complementaria, es decir, la probabilidad de que no se vuelva ciega en ninguno de esos 10 años.

Si p es la probabilidad anual de ceguera, entonces:

$$P(\text{no ceguera en 1 año}) = 1 - p$$

Suponiendo independencia entre años, la probabilidad de no presentar ceguera en 10 años es:

$$P(\text{no ceguera en 10 años}) = (1-p)^{10}$$

Por tanto, la probabilidad de presentar ceguera al menos una vez en ese periodo será:

$$P(\text{ceguera en 10 años}) = 1 - (1-p)^{10}$$

Para una mujer:

$$P(\text{ceguera en 10 años}) = 1 - (1-0.0074)^{10}$$

$$= 1 - (0.9926)^{10} \approx 0.0716$$

Para un hombre:

$$P(\text{ceguera en 10 años}) = 1 - (1-0.0067)^{10}$$

$$= 1 - (0.9933)^{10} \approx 0.0650$$

Por tanto, la probabilidad de que una mujer DID de 30 años se vuelva ciega en los próximos 10 años es aproximadamente 0.0716, mientras que para un hombre es aproximadamente 0.0650.

c) **Calcular la probabilidad de que exactamente 3 de las 20 personas se vuelvan ciegas en 10 años.**

En este apartado se consideran 10 hombres DID de 30-39 años y 10 mujeres DID de 30-39 años. A partir del apartado anterior, hemos obtenido las probabilidades de que una persona se vuelva ciega en 10 años:

$$p_h = 1 - (1-0.0067)^{10} \approx 0.0650$$

$$p_m = 1 - (1 - 0.0074)^{10} \approx 0.0716$$

Definimos las variables aleatorias:

$$X_h \sim \text{Bin}(10, 0.0650), \qquad X_m \sim \text{Bin}(10, 0.0716)$$

donde:

- X_h representa el número de hombres que se vuelven ciegos en 10 años.
- X_m representa el número de mujeres que se vuelven ciegas en 10 años.

La variable total será:

$$X = X_h + X_m$$

Queremos calcular:

$$P(X = 3)$$

Como X_h y X_m son independientes, aplicamos la convolución de probabilidades:

$$P(X = 3) = \sum_{k=0}^{3} P(X_h = k)\, P(X_m = 3 - k)$$

Es decir:

$$\begin{aligned} P(X = 3) = {} & P(X_h = 0)P(X_m = 3) \\ & + P(X_h = 1)P(X_m = 2) \\ & + P(X_h = 2)P(X_m = 1) \\ & + P(X_h = 3)P(X_m = 0) \end{aligned}$$

Calculamos cada término con la fórmula de la distribución binomial:

$$P(X_h = k) = \binom{10}{k}(0.0650)^k(0.9350)^{10-k}$$

$$P(X_m = k) = \binom{10}{k}(0.0716)^k(0.9284)^{10-k}$$

Sustituyendo y sumando los cuatro casos posibles, obtenemos:

$$P(X = 3) \approx 0.1091$$

Por tanto, la probabilidad de que exactamente 3 de las 20 personas se vuelvan ciegas en 10 años es aproximadamente 0.1091.

d) **Calcular la probabilidad de que al menos 2 de las 20 personas se vuelvan ciegas en 10 años.**

Seguimos considerando las mismas probabilidades obtenidas en el apartado anterior:

$$p_h \approx 0.0650, \qquad p_m \approx 0.0716$$

y la variable total:

$$X = X_h + X_m$$

Queremos calcular:

$$P(X \geq 2)$$

Resulta más sencillo usar el complemento:

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$$

Primero, calculamos la probabilidad de que ninguna de las 20 personas se vuelva ciega:

$$P(X = 0) = P(X_h = 0)\, P(X_m = 0)$$

$$P(X = 0) = (1 - 0.0650)^{10}(1 - 0.0716)^{10} \approx 0.2429$$

Ahora calculamos la probabilidad de que exactamente una persona se vuelva ciega. Esto puede ocurrir de dos formas:

- X_h que exactamente 1 hombre se vuelva ciego y ninguna mujer,
- X_m que ningún hombre se vuelva ciego y exactamente 1 mujer se vuelva ciega.

$$P(X = 1) = P(X_h = 1)P(X_m = 0) + P(X_h = 0)P(X_m = 1)$$

$$P(X = 1) = \binom{10}{1}(0.0650)(0.9350)^9(0.9284)^{10} + (0.9350)^{10}\binom{10}{1}(0.0716)(0.9284)^9 \approx 0.3562$$

Entonces:

$$P(X \geq 2) = 1 - 0.2429 - 0.3562 = 0.4009$$

Por tanto, la probabilidad de que al menos 2 de las 20 personas se vuelvan ciegas en 10 años es aproximadamente 0.4009.

3. Ejercicio 3

3.1. Enunciado

El peso de los individuos de una población sigue una distribución normal distinta según el sexo:

- Hombres: $P_h \sim N(78, 8)$ kg
- Mujeres: $P_m \sim N(65, 7)$ kg

En la población se sabe que el 40 % son hombres y que el 10 % de los individuos realiza deporte intenso.

a) Si se selecciona un hombre al azar, ¿cuál es la probabilidad de que pese más de 86 kg?

b) Si se selecciona un individuo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que pese más de 70 kg?

c) Indica por qué es incorrecta la expresión siguiente y calcula el valor correcto:

$$P(\text{Hombre} \mid \text{peso} > 70) = P(\text{peso} > 70 \mid \text{Hombre})$$

Se selecciona un individuo y se observa que pesa más de 70 kg.

d) Indica si la afirmación siguiente es correcta y calcula el valor numérico:

¿Cuál es el percentil 95 del peso en hombres?

Un estudiante responde: "Es el valor que deja el 95 % de los datos por encima".

e) Una plataforma elevadora soporta 240 kg y suben 3 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que la plataforma aguante?

3.2. Resolución

a) **Calcular la probabilidad de que un hombre pese más de 86 kg.**

Dado que el peso de los hombres sigue una distribución normal $P_h \sim N(78, 8)$, queremos calcular:

$$P(P_h > 86)$$

Primero, estandarizamos la variable:

$$Z = \frac{P_h - \mu}{\sigma} = \frac{86 - 78}{8} = 1$$

Entonces:

$$P(P_h > 86) = P(Z > 1) = 1 - P(Z \leq 1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$$

Por tanto, la probabilidad de que un hombre pese más de 86 kg es aproximadamente 0.1587.

b) **Calcular la probabilidad de que un individuo pese más de 70 kg.**

Dado que el 40 % de la población son hombres y el 60 % son mujeres, la distribución del peso en la población general es una mezcla de las distribuciones de hombres y mujeres. Por tanto, la probabilidad de que un individuo pese más de 70 kg se calcula como:

$$P(P > 70) = P(P > 70 \mid \text{Hombre})P(\text{Hombre}) + P(P > 70 \mid \text{Mujer})P(\text{Mujer})$$

Calculamos cada término por separado:

$$P(P > 70 \mid \text{Hombre}) = P\left(Z > \frac{70 - 78}{8}\right) = P(Z > -1) = 0.8413$$

$$P(P > 70 \mid \text{Mujer}) = P\left(Z > \frac{70 - 65}{7}\right) = P(Z > 0.7143) = 0.2375$$

Entonces:

$$P(P > 70) = 0.8413 \cdot 0.4 + 0.2375 \cdot 0.6 = 0.3365 + 0.1425 = 0.479$$

Por tanto, la probabilidad de que un individuo pese más de 70 kg es aproximadamente 0.479.

c) **Indicar por qué es incorrecta la expresión $P(\textbf{Hombre} \mid \textbf{peso} > 70) = P(\textbf{peso} > 70 \mid \textbf{Hombre})$ y calcular el valor correcto.**

La expresión es incorrecta porque $P(\text{Hombre} \mid \text{peso} > 70)$ representa la probabilidad de que un individuo sea hombre dado que pesa más de 70 kg, mientras que $P(\text{peso} > 70 \mid \text{Hombre})$ representa la probabilidad de que un hombre pese más de 70 kg. Estas dos probabilidades no son iguales porque una se condiciona en el peso y la otra en el sexo. Para calcular $P(\text{Hombre} \mid \text{peso} > 70)$, utilizamos el teorema de Bayes:

$$P(\text{Hombre} \mid \text{peso} > 70) = \frac{P(\text{peso} > 70 \mid \text{Hombre})P(\text{Hombre})}{P(\text{peso} > 70)}$$

Sustituyendo los valores obtenidos en los apartados anteriores:

$$P(\text{Hombre} \mid \text{peso} > 70) = \frac{0.8413 \cdot 0.4}{0.479} \approx 0.7025$$

Por tanto, la probabilidad de que un individuo sea hombre dado que pesa más de 70 kg es aproximadamente 0.7025.

d) **Indicar si la afirmación sobre el percentil 95 del peso en hombres es correcta y calcular su valor numérico.**

La afirmación del estudiante es incorrecta. El percentil 95 de una distribución normal es el valor que deja el 95 % de los datos por debajo, no por encima. Para calcular el percentil 95 del peso en hombres, utilizamos la fórmula:

$$P_{95} = \mu + z_{0.95} \cdot \sigma$$

Donde $z_{0.95}$ es el valor crítico de la distribución normal estándar correspondiente al percentil 95, que es aproximadamente 1.645. Entonces:

$$P_{95} = 78 + 1.645 \cdot 8 = 78 + 13.16 = 91.16$$

Por tanto, el percentil 95 del peso en hombres es aproximadamente 91.16 kg.

e) **Calcular la probabilidad de que una plataforma elevadora que soporta (240,kg) aguante el peso de 3 personas.**

Seleccionamos 3 personas al azar de la población. Sabemos que el 40 % son hombres y el 60 % mujeres, y que sus pesos siguen distribuciones normales distintas.

Una forma de resolver el problema sería intentar trabajar con una única distribución para la población, pero esto no es correcto, ya que el peso depende del sexo. Por tanto, es mejor separar los casos según cuántos hombres haya entre las 3 personas.

Hay cuatro posibilidades:

- 3 mujeres
- 1 hombre y 2 mujeres
- 2 hombres y 1 mujer
- 3 hombres

Para cada caso, la suma de los pesos sigue una distribución normal, porque la suma de variables normales independientes también sigue una distribución normal.

Caso 1: 3 mujeres

Media: $3 \cdot 65 = 195$

Varianza: $3 \cdot 7^2 = 147$

$$P(\text{suma} \leq 240) = P\left(Z \leq \frac{240 - 195}{\sqrt{147}}\right) = P(Z \leq 3.71) \approx 0.9999$$

Caso 2: 1 hombre y 2 mujeres

Media: $78 + 2 \cdot 65 = 208$

Varianza: $8^2 + 2 \cdot 7^2 = 162$

$$P(\text{suma} \leq 240) = P\left(Z \leq \frac{240 - 208}{\sqrt{162}}\right) = P(Z \leq 2.51) \approx 0.9940$$

Caso 3: 2 hombres y 1 mujer

Media: $2 \cdot 78 + 65 = 221$

Varianza: $2 \cdot 8^2 + 7^2 = 177$

$$P(\text{suma} \leq 240) = P\left(Z \leq \frac{240 - 221}{\sqrt{177}}\right) = P(Z \leq 1.43) \approx 0.9236$$

Caso 4: 3 hombres

Media: $3 \cdot 78 = 234$

Varianza: $3 \cdot 8^2 = 192$

$$P(\text{suma} \leq 240) = P\left(Z \leq \frac{240 - 234}{\sqrt{192}}\right) = P(Z \leq 0.43) \approx 0.6681$$

Ahora ponderamos cada caso según su probabilidad. Como cada persona tiene probabilidad 0.4 de ser hombre, el número de hombres entre las 3 sigue una binomial $B(3, 0.4)$:

$$P(0 \text{ hombres}) = 0.6^3 = 0.216$$

$$P(1 \text{ hombre}) = 3 \cdot 0.4 \cdot 0.6^2 = 0.432$$

$$P(2 \text{ hombres}) = 3 \cdot 0.4^2 \cdot 0.6 = 0.288$$

$$P(3 \text{ hombres}) = 0.4^3 = 0.064$$

Combinando todos los casos:

$$P(\text{suma} \leq 240) = 0.9999 \cdot 0.216 + 0.9940 \cdot 0.432 + 0.9236 \cdot 0.288 + 0.6681 \cdot 0.064 \approx 0.954$$

Por tanto, la probabilidad de que la plataforma aguante el peso de las 3 personas es aproximadamente 0.954.