

CONDOTRIL

SUPLEMENTO ALIMENTAR

30 SAQUETAS

O OUE É CONDOTRIL?

CONDOTRIL é um suplemento alimentar que contém Sulfato de Glucosamina, Sulfato de Condroitina, MSM e outros compostos como a Vitamina C e Manganês. A Vitamina C contribui para a normal formação de colagénio para o funcionamento normal dos ossos e das cartilagens. O Manganês contribui para a manutenção de ossos normais e a normal formação de tecidos conjuntivos.

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou a suplementar o regime alimentar normal não devendo ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado. Constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras, com efeito nutricional ou fisiológico. É importante um regime alimentar equilibrado e um modo de vida saudável.

Ingredientes: Agente de volume: Maltodextrina; Sulfato de glucosamina (marinho); Sulfato de condroitina; Agente de volume: Fosfato dicálcico; Cartilagem de tubarão; Aroma de laranja; Metilsulfonilmetano (MSM); Extrato seco de Bambusa vulgaris (Bambu), exsudado do caule, doseado a 75% de Sílica; Extrato seco de Harpagophytum procumbens (Harpago), raíz, doseado a 2% de Harpagósidos; Acidificante: Ácido cítrico; Colagénio hidrolisado tipo II; Vitamina C (Ácido L-ascórbico); Antiaglomerante: Dióxido de silício; Gluconato de manganês (Manganês); Hialuronato de sódio (Ácido hialurónico); Edulcorante: Sucralose.

Ingredientes	Quantidade diária	% VRN*
	(1saqueta)	
Sulfato de Glucosamina	750 mg	**
Sulfato de Condroitina	300 mg	**
Cartilagem de tubarão	150 mg	**
Metilsulfonilmetano (MSM)	120 mg	**
Sílica	90 mg	**
Extrato seco de Harpagophytum procumbens (Harpago)	75 mg	**
Colagénio Hidrolisado Tipo II	60 mg	**
Vitamina C	30 mg	38%
Manganês	1 mg	50%
Ácido hialurónico	6 mg	**

^{*}VRN: Valor de Referência do Nutriente segundo o Regulamento (UE) nº 1169/2011

^{**}n.d.: não definido

ATENÇÃO: Não exceder a toma diária recomendada salvo indicação de um profissional de saúde. O produto não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade, alergia e quando estejam descritas interações de outro produto com qualquer um dos constituintes da formulação. Não recomendado em crianças e adolescentes.

O produto não deve ser utilizado em caso de alergia ao marisco.

Se estiver a tomar anticoagulantes, consultar o seu médico ou farmacêutico antes da toma do produto.

Devido à falta de estudos que comprovem a segurança do seu uso durante a gravidez e aleitamento, este suplemento não deve ser utilizado nestas situações, salvo indicação médica.

Condições de armazenamento:

Conservar em local seco na embalagem original e a temperatura inferior a 25°C. Preservar da luz e do calor. Manter fora do alcance e da visão das crianças.

Dose diária recomendada: 1 saqueta por dia. Modo de tomar: Dissolva o conteúdo da saqueta em água ou noutro líquido. Número de doses por embalagem: 30.

Consumir de preferência antes do fim de...: Ver embalagem. Lote: Ver embalagem.

Representado e distribuído por: MYPHARMA S.A. Tv. António Ferreira Rito, 43 4705-112 Braga - PORTUGAL

geral@mypharma.pt www.mypharma.pt

