

Liste des différents types de handicaps et troubles DYS

Troubles DYS

Dyslexie : Trouble de l'apprentissage de la lecture, caractérisé par des difficultés à reconnaître les mots, à comprendre le sens de ce qui est lu et à orthographier correctement.

Dysgraphie : Trouble de l'écriture, marqué par des difficultés à produire une écriture lisible et cohérente, ainsi que des problèmes de syntaxe et d'organisation dans l'écriture.

Dyscalculie : Trouble de l'apprentissage des mathématiques, se manifestant par des difficultés à comprendre les concepts mathématiques, à effectuer des opérations arithmétiques de base et à résoudre des problèmes mathématiques.

Dyspraxie : Trouble du développement de la coordination motrice, caractérisé par des difficultés à planifier et à exécuter des mouvements volontaires, ce qui peut affecter les activités quotidiennes telles que l'écriture, la manipulation d'objets et la coordination des mouvements.

Dysphonie : Trouble de la voix, entraînant des difficultés à produire des sons vocaux clairs et articulés, ce qui peut affecter la communication verbale.

Dysorthographe : Trouble de l'orthographe, caractérisé par des difficultés à épeler correctement les mots, souvent lié à la dyslexie mais pouvant être un trouble distinct.

Dyspraxie verbale : Trouble de la production verbale, se manifestant par des difficultés à planifier et à coordonner les mouvements nécessaires à la parole fluide et intelligible.

Dysphasie : Trouble de l'expression orale, marqué par des difficultés à organiser et à structurer le langage verbal, ce qui peut entraîner des problèmes de grammaire, de syntaxe et de cohérence dans la parole.

Handicaps dits visuel

Cécité totale : Perte complète de la vision, où la personne ne peut pas percevoir la lumière ou les formes.

Cécité légale ou basse vision : Vision limitée qui ne peut pas être entièrement corrigée avec des lunettes ou des lentilles de contact, rendant difficile la réalisation de certaines activités quotidiennes.

Vision tunnel (ou vision réduite) : Perte de vision périphérique, où la vision centrale est maintenue mais la vision sur les côtés est altérée.

Hémianopsie : Perte de vision dans la moitié du champ visuel, que ce soit la moitié gauche ou droite, souvent due à des lésions cérébrales.

Vision floue ou déformée : Altération de la qualité de la vision, où les objets peuvent apparaître flous, déformés ou difficiles à distinguer.

Photophobie : Sensibilité accrue à la lumière, pouvant causer de l'inconfort ou une douleur lors de l'exposition à la lumière vive.

Nyctalopie (ou cécité nocturne) : Difficulté à voir dans des conditions de faible luminosité ou dans l'obscurité, même si la vision est normale pendant la journée.

Diplopie (vision double) : Perception de deux images distinctes d'un objet unique, ce qui peut rendre la vision difficile et fatigante.

Presbytie : Perte de la capacité à voir de près due au vieillissement, nécessitant souvent l'utilisation de lunettes de lecture ou d'autres aides visuelles.

Achromatopsie : Incapacité à percevoir les couleurs, ne voyant que en noir, blanc et gris.

Handicaps dits auditif

Surdité totale : Perte complète de l'audition dans les deux oreilles, où la personne ne peut pas percevoir les sons.

Surdité profonde : Perte importante de l'audition où la personne a une très faible perception des sons, nécessitant souvent l'utilisation d'aides auditives ou d'implants cochléaires.

Surdité sévère : Perte d'audition significative où la personne a du mal à entendre même avec des aides auditives et peut dépendre en grande partie de la lecture labiale et des signes.

Surdité légère à modérée : Perte d'audition légère à modérée où la personne peut avoir des difficultés à entendre les sons doux ou à distinguer les voix dans des environnements bruyants.

Hyperacousie : Sensibilité accrue aux sons, où les sons ordinaires peuvent sembler très forts, désagréables ou douloureux.

Acouphènes : Perception de bruits ou de sons dans les oreilles ou dans la tête en l'absence de stimuli sonores externes, souvent décrits comme des bourdonnements, des sifflements, des cliquetis ou des pulsations.

Presbyacousie : Perte auditive liée à l'âge, souvent due à une diminution de la fonction auditive causée par le vieillissement.

Phonophobie : Sensibilité exacerbée aux bruits, où les sons ordinaires peuvent provoquer de l'anxiété ou de la détresse.

Déficience auditive unilatérale : Perte d'audition dans une seule oreille, ce qui peut entraîner des difficultés de localisation des sons et de discrimination auditive dans certaines situations.

Diplacousie : Perception inégale des sons entre les deux oreilles, ce qui peut affecter la capacité à comprendre la parole et à localiser les sources sonores.

Handicaps dits moteur

Paraplégie : Paralysie des membres inférieurs due à une lésion de la moelle épinière, généralement résultant en une perte de sensation et de mouvement dans les jambes.

Tétraplégie (ou quadriplégie) : Paralysie partielle ou totale des quatre membres due à une lésion de la moelle épinière dans la région cervicale, affectant souvent également les fonctions respiratoires et d'autres fonctions corporelles.

Monoplégie : Paralysie d'un seul membre, généralement causée par une lésion nerveuse ou une maladie neuromusculaire.

Hémiplégie : Paralysie d'un côté du corps, souvent causée par une lésion cérébrale telle qu'un accident vasculaire cérébral (AVC) ou une lésion cérébrale traumatique.

Parésie : Affaiblissement partiel de la force musculaire, souvent résultant d'une lésion nerveuse ou d'une maladie neuromusculaire.

Ataxie : Trouble de la coordination des mouvements volontaires, généralement causé par des lésions cérébrales ou des affections neurologiques.

Dystonie : Mouvements musculaires involontaires et prolongés, entraînant souvent des postures anormales ou des torsions du corps.

Spasticité : Augmentation du tonus musculaire qui peut entraîner des raideurs, des spasmes et des mouvements involontaires, souvent observée chez les personnes atteintes de lésions cérébrales ou de troubles neurologiques.

Amyotrophie spinale : Maladie neurodégénérative affectant les motoneurones, entraînant une faiblesse musculaire progressive et une atrophie musculaire.

Myopathie : Groupe de maladies musculaires caractérisées par une faiblesse musculaire et une atrophie, pouvant être d'origine génétique ou acquise.

Paralysie cérébrale : Ensemble de troubles du mouvement et de la posture causés par des lésions cérébrales précoces, affectant souvent la mobilité et la coordination.