

Оценката Ви ще е равна на 2 + броя точки, които получите. Време за работа: 3 часа. Успех.
Ще считаме, че навсякъде работим върху вероятностно пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Задача 1. Резервоар се пълни в началото на седмицата със сл.вел. $X \in [0, 1]$ единици, а през седмицата се употребява сл.вел. Y . Нека съвместната плътност на тези две случайни величини е

$$f_{X,Y}(x,y) = 3x\mathbb{1}_{\{0 \leq y \leq x \leq 1\}} = \begin{cases} 3x, & \text{ако } 0 \leq y \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

1. (0.25 т.) Намерете вероятността в дадена седмица резервоарът да бъде запълнен с най-много 1/2 единици и да бъдат изразходвани повече от 1/4.

•

$$\mathbb{P}\left(X < \frac{1}{2}, Y > \frac{1}{4}\right) = \int_{1/4}^{1/2} \int_{1/4}^x 3x \, dy \, dx = \int_{1/4}^{1/2} 3x \left(x - \frac{1}{4}\right) \, dx = \frac{5}{128}.$$

2. (0.75 т.) Намерете $Cov(X, Y)$.

- За $x \in [0, 1]$

$$f_X(x) = \int_0^x 3x \, dy = 3x^2$$

и следователно

$$\mathbb{E}X = \int_0^1 x 3x^2 \, dx = \frac{3}{4}.$$

Аналогично за $y \in [0, 1]$

$$f_Y(y) = \int_y^1 3x \, dx = \frac{3}{2}(1 - y^2) \quad \text{и значи} \quad \mathbb{E}Y = \frac{3}{2} \int_0^1 y(1 - y^2) \, dy = \frac{3}{8}.$$

Последното нужно количество е

$$\mathbb{E}XY = \int_0^1 \int_0^x xy 3x \, dy \, dx = \int_0^1 \frac{3}{2} x^4 \, dx = \frac{3}{10}$$

и следователно отговорът е

$$Cov(X, Y) = \mathbb{E}XY - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y = \frac{3}{160}.$$

Задача 2. (1 т.) На спирките за градски транспорт се инсталират информационни табла с размери 10×100 диода. Доставени са качествени материали, като можем да моделираме времето на изправност на един диод чрез експоненциална сл. вел. със средно 10 години.

Опитът показва, че ако работят по-малко от 75% от диодите, информацията често е неразбираема и таблото трябва да се ремонтира. Каква е вероятността да трябва да бъде извършен ремонт след 3 години експлоатация?

- Всеки диод следва разпределението $Exp(1/10)$ и вероятността да работи поне три години е

$$\mathbb{P}(Exp(1/10) > 3) = \int_3^\infty \frac{1}{10} e^{-1/10x} \, dx = \left[-e^{-1/10x}\right]_3^\infty = e^{-3/10} =: p. \quad (1)$$

Следователно за $i = 1, 2, \dots, 1000$ случайните величини

$$X_i = \mathbb{1}_{\{\text{диод } i \text{ работи след три години}\}} = \begin{cases} 1, & \text{ако диод } i \text{ работи след три години;} \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

следват разпределение $Ber(p)$. Напомняме, че то има очакване p и дисперсия $p(1-p)$. Тъй като дисперсията е крайна, можем да използваме централната гранична теорема за много добро приближение, т.к. $n := 1000$ е "сравнително голямо":


$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 + \dots + X_n < 750) &= \mathbb{P}\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} < \frac{750 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \\ &\approx \mathbb{P}(N(0, 1) < 0.66) = \Phi(0.66) \approx 74.54\%. \end{aligned}$$

Задача 3. Да предположим, че можем да моделираме възвръщаемостите на три актива A, B и C като независими нормално разпределени случайни величини $N(3, 2), N(3, 3), N(1, 10)$ и че разполагате с 5 единици за инвестиции.

- (0.25 т.) Как бихте разпределили парите си, за да максимизирате очакваната печалба?
 - Всички комбинации от вида $x \cdot A + (5 - x) \cdot B$ за $x \in [0, 5]$ имат максималното очакване от 15.
- (0.25 т.) Между всички възможности от 1., един начин за избор е да предпочетем разпределението с най-малка дисперсия. Кое е то?
 - $D(xA + (5 - x)B) = 2x^2 + 3(5 - x)^2 = 5x^2 - 30x + 75$, чийто min се достига за $x = 30/10 = 3$.
- (0.5 т.) Рисков инвеститор залага 5-те си единици в независим актив $D \sim N(-2, 20)$. Каква е вероятността неговата инвестиция да е по-успешна от тази в 2.?
 - Портфолиото от 2. е $\sim N(15, 30)$.

$$\mathbb{P}(N(15, 30) < N(-10, 500)) = \mathbb{P}(N(25, 530) < 0) = \mathbb{P}\left(N(0, 1) < \frac{-25}{\sqrt{530}}\right) \approx \Phi(-1.09) \approx 13.79\%.$$

Задача 4. X и Y пътуват заедно от град A до B . След пристигането си, изчакват съответно автобуси до C и D . Предполагаме, че пътуванията траят съответно $T_{AB} \sim \text{Exp}(3)$, $T_{BC} \sim \text{Exp}(4)$ и $T_{BD} \sim \text{Exp}(5)$, а изчакванията в B са $T_C \sim \text{Exp}(1)$ и $T_D \sim \text{Exp}(2)$, като така дефинираните времена са независими. Нека ξ и η са времената на пътуване на X и Y .



- Намерете $\mathbb{P}(T_C + \ln(\mathbb{E}T_D) > 0)$.
 - Подобно на (1) и т.к. $\ln(1/2) = -\ln 2$, търсената вероятност е

$$\mathbb{P}(T_C > \ln 2) = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}.$$

- Намерете $\text{Cor}(\xi, \eta)$.

• $\xi = T_{AB} + T_C + T_{BC}$ и $\eta = T_{AB} + T_D + T_{BD}$. От независимостта, $D\xi = 1/9 + 1 + 1/16 = 169/144$ и $D\eta = 1/9 + 1/4 + 1/25 = 361/900$. Директно се проверява, че

$$\text{Cov}(X_1 + X_2, X_3) = \mathbb{E}((X_1 + X_2)X_3) - \mathbb{E}(X_1 + X_2)\mathbb{E}(X_3) = \text{Cov}(X_1, X_3) + \text{Cov}(X_2, X_3)$$

и следователно $\text{Cov}(\xi, \eta) = \text{Cov}(T_{AB}, T_{AB}) = DT_{AB} = 1/9$, което води до

$$\text{Cor}(\xi, \eta) = \frac{1/9}{\sqrt{D\xi D\eta}} = \frac{40}{247} \approx 0.1619.$$