



KANDIDAT

10208

PRØVE

MA0301 1 Elementær diskret matematikk

Emnekode	MA0301
Vurderingsform	Hjemmeeksamen
Starttid	18.05.2021 07:00
Sluttid	18.05.2021 11:00
Sensurfrist	09.06.2021 21:59
PDF opprettet	28.05.2021 10:12

Cover Letter

Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
---------	--------	-------	-------------

<input type="checkbox"/>			Dokument
--------------------------	--	--	----------

Logic - Multiple choice (5 points)

Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
---------	--------	-------	-------------

1	Riktig	5/5	Flervalg
---	--------	-----	----------

Compute negation (3 points)

Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
---------	--------	-------	-------------

2	Besvart	Rettes manuelt	Filopplasting
---	---------	----------------	---------------

New Logic Connective (12 points)

Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
---------	--------	-------	-------------

3	Besvart	Rettes manuelt	Filopplasting
---	---------	----------------	---------------

Multiple Choice (Relation) (5 points)

Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
---------	--------	-------	-------------

4	Feil	0/5	Flervalg
---	------	-----	----------

Equivalence relation (5 points)

Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
---------	--------	-------	-------------

5	Besvart	Rettes manuelt	Filopplasting
---	---------	----------------	---------------

Partial order (9 points)

Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
6	Besvart	Rettes manuelt	Filopplasting
Induction Part I (6 points)			
Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
7	Besvart	Rettes manuelt	Filopplasting
Induction Part II (6 points)			
Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
8	Ubesvart	Rettes manuelt	Filopplasting
Functions Part I (3 points)			
Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
9	Riktig	3/3	Flervalg
Functions Part II (5 points)			
Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
10	Besvart	Rettes manuelt	Filopplasting
Combinatorics I (5 points)			
Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
11	Besvart	Rettes manuelt	Filopplasting
Combinatorics II (6 points)			
Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
12	Besvart	Rettes manuelt	Filopplasting

Automata I (3 points)

Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
13	Riktig	3/3	Flervalg

Automata II (6 points)

Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
14	Besvart	Rettes manuelt	Filopplasting

Automata III (6 points)

Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
15	Besvart	Rettes manuelt	Filopplasting

Graph Theory I (5 points)

Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
16	Besvart	Rettes manuelt	Filopplasting

Graph Theory II (10 points)

Oppgave	Status	Poeng	Oppgavetype
17	Besvart	Rettes manuelt	Filopplasting

1 $(p \sqcup (p \sqcup q)) \sqcup q$ is

Select one alternative:

☐ neither a tautology nor a contradiction

☒ a tautology



☐ a contradiction

2 Compute the negation of $\forall x \forall y (\neg P(x, y) \sqcup Q(x, y))$



Din fil ble lastet opp og lagret i besvarelsen din.

~ Last ned

| Fjern

□ Erstatt

Filnavn:

Oppgave 2.pdf

Filtype:

application/pdf

Filstørrelse:

108.54 KB

Opplastingstidspunkt:

18.05.2021 09:18

Status:

Lagret

3 Consider the new logic connective \downarrow , where $p \downarrow q$ is logically equivalent to $\neg(p \sqcup q)$.

1. (3 points) Write down the truth table of this new connective \downarrow .
2. (3 points) Is $\neg p$ logically equivalent to $p \downarrow p$? Give an argument about your answer. (Either use a truth table or laws of logic).
3. (6 points) Is $p \sqcup q$ logically equivalent to $(p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$? Give an argument about your answer **using laws of logic**. No point will be given if you use a truth table.



Din fil ble lastet opp og lagret i besvarelsen din.

~ Last ned

| Fjern

□ Erstatt

Filnavn:

Oppgave 3.pdf

Filtype:

application/pdf

Filstørrelse:

263.14 KB

Opplastingstidspunkt:

18.05.2021 07:27

Status:

Lagret

- 4 (5 points) Consider the relation $R := \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x + y = 6\}$. Which of the following statements about R is true?

Select one alternative:

- ☐ None of the choices here
- ☐ It is reflexive, transitive, and not antisymmetric
- ☐ It is transitive, not reflexive, and antisymmetric
- ☒ It is symmetric, reflexive, and not antisymmetric



- 5 (5 points) Let $A := \{0, 1, 2, 3\}$. Define the relation

$$R := \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2)\}.$$

Is R an equivalence relation? If it is not, how to turn R into an equivalence relation by adding the minimum amount of elements?



Din fil ble lastet opp og lagret i besvarelsen din.

~ Last ned

| Fjern

□ Erstatt

Filnavn:

Oppgave 5.pdf

Filtype:

application/pdf

Filstørrelse:

139.02 KB

Opplastingstidspunkt:

18.05.2021 09:18

Status:

Lagret

- 6 (9 points) Let $A := \{3, 4, 6, 12, 20\}$ be ordered by divisibility. Compute the minimal and maximal elements. Moreover, draw the Hasse diagram.



Din fil ble lastet opp og lagret i besvarelsen din.

~ Last ned

| Fjern

□ Erstatt

Filnavn:	Oppgave 6.pdf
----------	---------------

Filtype:	application/pdf
----------	-----------------

Filstørrelse:	71.91 KB
---------------	----------

Opplastingstidspunkt:	18.05.2021 09:19
-----------------------	------------------

Status:	Lagret
---------	--------

7 (6 points) Use induction to show that for all integers $m > 0$

$$\sum_{i=1}^m 2i - 1 = m(m + 1) - 1$$



Din fil ble lastet opp og lagret i besvarelsen din.

~ Last ned

| Fjern

□ Erstatt

Filnavn:

Oppgave 7.pdf

Filtype:

application/pdf

Filstørrelse:

170.89 KB

Opplastingstidspunkt:

18.05.2021 10:52

Status:

Lagret

- 8 (6 points) Consider the sequence $\{a_n\}_{n \geq 0}$, where $a_1 = 3$, $a_2 = 6$ and, for integers $k > 2$, $a_k = a_{k-1} + a_{k-2}$.

Use induction to show that, for all integers $n > 0$, a_n can be divided by 3.




Upload your file here. Maximum one file.

Alle filtyper er tillatt. Maksimal filstørrelse er **50 GB**.

- 9 (3 points) Which of the following statements is true?

Select one alternative:

- ☒ If the functions $f : A \rightarrow B$ and $g : B \rightarrow C$ are injective, then the composite $g \circ f : A \rightarrow C$ is injective. 
- ☐ None of them
- ☐ If the functions $f : A \rightarrow B$ and $g : B \rightarrow C$ are injective, then the composite $f \circ g : B \rightarrow C$ is injective.
- ☐ If the functions $f : A \rightarrow B$ and $g : A \rightarrow B$ are injective, then the composite $g \circ f : A \rightarrow B$ is injective.

- 10** (5 points) Consider the function $f(x) = x - 7$ with integers as domain and codomain (namely, $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$). Is it injective, surjective, or bijective? Give an argument to justify your answer.



Din fil ble lastet opp og lagret i besvarelsen din.

~ Last ned

| Fjern

□ Erstatt

Filnavn:	Oppgave 10.pdf
----------	----------------

Filtype:	application/pdf
----------	-----------------

Filstørrelse:	78.89 KB
---------------	----------

Opplastingstidspunkt:	18.05.2021 10:53
-----------------------	------------------

Status:	Lagret
---------	--------

- 11 (5 points) According to the binomial formula, what is the coefficient of x^6y^6 in the expansion of $(3x^3 + 2y)^8$? What is the coefficient of x^4y^3 ?



Din fil ble lastet opp og lagret i besvarelsen din.

~ Last ned

| Fjern

□ Erstatt

Filnavn:

Oppgave 11.pdf

Filtype:

application/pdf

Filstørrelse:

121.47 KB

Opplastingstidspunkt:

18.05.2021 10:17

Status:

Lagret

- 12 (6 points) What is the number of permutations formed from the letters of "ALLTALK"? How about with the restriction that the two A's must be next to each other?



Din fil ble lastet opp og lagret i besvarelsen din.

~ Last ned

| Fjern

□ Erstatt

Filnavn: Oppgave 12.pdf

Filtype: application/pdf

Filstørrelse: 202.66 KB

Opplastingstidspunkt: 18.05.2021 10:17

Status: Lagret

- 13 (3 points) Let $\Sigma := \{0, 1, 2\}$. Which of the following words is **not** in the language $L(r)$ for the regular expression $r = 011^{\square}2^{\square}$?

Select one alternative:

☒ None of the choices here



☐ 0111

☐ 012

☐ 0112

14 (6 points) See the given PDF file.

Din fil ble lastet opp og lagret i besvarelsen din.

~ Last ned

| Fjern

□ Erstatt

Filnavn:	Oppgave 14.pdf
----------	----------------

Filtype:	application/pdf
----------	-----------------

Filstørrelse:	237.03 KB
---------------	-----------

Opplastingstidspunkt:	18.05.2021 08:21
-----------------------	------------------

Status:	Lagret
----------------	---------------

15 (6 points) See the given PDF file.



Din fil ble lastet opp og lagret i besvarelsen din.

~ Last ned

| Fjern

□ Erstatt

Filnavn:

Oppgave 15.pdf

Filtype:

application/pdf

Filstørrelse:

113.12 KB

Opplastingstidspunkt:

18.05.2021 09:19

Status:

Lagret

16 (5 points) See the given PDF file.



Din fil ble lastet opp og lagret i besvarelsen din.

~ Last ned

| Fjern

□ Erstatt

Filnavn:

Oppgave 16.pdf

Filtype:

application/pdf

Filstørrelse:

78.55 KB

Opplastingstidspunkt:

18.05.2021 08:21

Status:

Lagret

17 (10 points) See the given PDF file.



Din fil ble lastet opp og lagret i besvarelsen din.

~ Last ned

| Fjern

□ Erstatt

Filnavn:

Oppgave 17.pdf

Filtype:

application/pdf

Filstørrelse:

339.39 KB

Opplastingstidspunkt:

18.05.2021 08:20

Status:

Lagret


5

- It is symmetric
 - It is transitive
 - It is not reflexive
- = This means that it isn't a equivalence relation

If we add $(3,3)$ it becomes reflexive and it becomes an equivalence relation

6

$A = \{3, 4, 6, 12, 20\}$



Maximum : 12

Minimum : 3, 4

7

$$\sum_{i=1}^m 2^i - 1 = m(m+1) - 1 \quad m > 0$$

Base case

$$m = 1$$

$$m(m+1) - 1 \rightarrow 1(2) - 1 = \underline{1}$$

$$\sum_{i=1}^1 2^i - 1 = 2 \cdot 1 - 1 = \underline{1}$$

True

this implies \forall

$$1 + 3 + \dots + 2k-1 = k(k+1) - 1$$

$$k(k+1) - 1 + 2k+1 \neq (k+1)(k+2) - 1$$

It is not equal, which means
it doesn't hold for all $m > 0$

10

$$f(x) = x - 7$$

As the function is linear, for each y , there is only one x .

This means that it is

bijective

2

$$\neg [\exists x \forall y (\neg P(x,y) \wedge Q(x,y))]$$

$$\equiv \forall x [\neg \forall y (\neg P(x,y) \wedge Q(x,y))]$$

$$\equiv \forall x \exists y \neg (\neg P(x,y) \wedge Q(x,y))$$

$$\equiv \forall x \exists y (P(x,y) \vee \neg Q(x,y))$$

11

$$\binom{8}{6} (3x^2)^2 (2y)^6$$

↓

$$\frac{8!}{6! \cdot 2!} = \frac{8 \cdot 7}{2} = \underline{28}$$

$$28 \cdot 3^2 \cdot x^6 \cdot 2^6 \cdot y^6 = 28 \cdot 9 \cdot 64 \cdot x^6 \cdot y^6$$

$$= \underline{\underline{16128 x^6 y^6}}$$

There is no coefficient
for $x^4 y^3$

12

word : ALLTALK

n Letters = 7

$$\text{Permutations} = \frac{n!}{m_A! m_L! m_T! m_K!}$$

$$= \frac{7!}{2! \cdot 3!} = \frac{5040}{12} = \underline{\underline{420}}$$

With two A's next to each other;

- Put the two A's "into" one letter


$$\frac{6!}{3!} = 6 \cdot 5 \cdot 4 = \underline{\underline{120}}$$

- There are 2! permutations of "aa"

which gives us nPermutations : $120 \cdot 2 = \underline{\underline{240}}$

14

M	v			w		
	a	b	c	a	b	c
s ₀	s ₁	s ₂	s ₁	0	1	1
s ₁	s ₂	s ₀	s ₀	1	0	0
s ₂	s ₁	s ₀	s ₂	0	1	0



word: a c a b a c a b

state	s ₀	s ₁	s ₀	s ₁	s ₀	s ₁	s ₀	s ₁	s ₀
input	a	c	a	b	a	c	a	b	
output	0	0	0	0	0	0	0	0	

output is 00000000


15


s	a	b
s_0	s_0	s_1
s_1	s_1	s_2
s_2	s_2	s_1

The accepted language are words consisting of an even number of "b". The letter "a" won't have any impact.

16

	v_0	v_1	v_2	v_3	v_4
v_0	0	1	1	0	1
v_1	1	0	0	1	1
v_2	1	0	0	0	0
v_3	0	1	0	0	1
v_4	1	1	0	1	0





- 1) Choose $v_1 v_3$
- 2) Choose $v_7 v_8$
- 3) Choose $v_2 v_3$ $\rightarrow v_1 v_2$ would now form cycle
- 4) -||- $v_3 v_5$ $\rightarrow v_2 v_5$ would now form cycle
- 5) -||- $v_4 v_5$ $\rightarrow v_2 v_4$ would now form cycle
- 6) -||- $v_6 v_8$ $\rightarrow v_6 v_7$ would now form cycle
- 7) -||- $v_5 v_6$ \rightarrow There are already paths for $v_5 v_7$ and $v_4 v_6$ so we are finished

$$\{v_1 v_3, v_7 v_8, v_2 v_3, v_3 v_5, v_4 v_5, v_6 v_8, v_5 v_6\}$$

1)

P	q	$P \vee q$	$P \downarrow q$
0	0	0	<u>1</u>
0	1	1	<u>0</u>
1	0	1	<u>0</u>
1	1	1	<u>0</u>

2) $P \downarrow P \equiv \neg (P \vee P)$
 $\equiv \neg P \wedge \neg P$ D.M.G
 $\equiv \neg P$

P	$\neg P$	$\neg P \wedge \neg P$
0	1	1
1	0	0

They are logically equivalent

3) $(P \downarrow q) \downarrow (P \downarrow q)$
 $\equiv \neg (\neg (P \vee q) \vee \neg (P \vee q))$
 $\equiv \neg [\neg (P \vee q)] \wedge \neg [\neg (P \vee q)]$ D.M.G
 $\equiv (P \vee q) \wedge (P \vee q)$ Double negation
 $\equiv P \vee q$ As $r \wedge r \equiv r$

$P \vee q \equiv (P \downarrow q) \downarrow (P \downarrow q)$