

### Definizione 1

Una equazione di ordine  $n$  è una equazione del tipo:

$$F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x), y^{(n)}(x)) = 0$$

$$x \in I \subseteq \mathbb{R}$$

dove l'incognita è la qualunque  $y(x)$ .  $F$  è funzione di  $(n+2)$  variabili  $x, y(x), y'(x), \dots$

### Definizione: Soluzione (curva) integrale

La soluzione di una EDO di ordine  $n$  sull'intervallo  $I$

$$F(x, y(x), y'(x), \dots) = 0 \quad (1)$$

$$x \in I \subseteq \mathbb{R}$$

$\varphi(x)$  che sia definita (almeno) in  $I$  e ivi derivabile fino all'ordine  $n$  per cui valga 1, ovvero:

$$F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots) = 0$$

$$\forall x \in I$$

Chiaramente cambia a seconda dell'intervallo

### Definizione: Integrale Generale

Si chiama integrale **generale** di 1 in  $I$  l'insieme di tutte le soluzioni di 1 in  $I$

### Definizione: Forma normale

Una Equazione Differenziale Ordinaria (EDO) di ordine  $n$  si dice in forma normale se è in forma

$$y^{(n)} = f(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}), x \in I$$

Esempio:

$$y''' = -5y' + \sin x$$

Quella sopra è un EDO di III ordine normale.

**Definizione: EDO di ordine  $n$  lineare**

Una EDO di ordine  $n$  si dice lineare se è nella forma

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_2(x)y''(x) + a_1(x)y'(x) + a_0y(x) = f(x), x \in I$$

Dove le funzioni

$$a_0(x), a_1(x), a_2(x), \dots, a_n(x), f(x)$$

sono assegnate (continue) in  $I$

Esempio:

$$xy'' + 5y = \sin x$$

### Definizione: Funzione continua in più variabili

Sia una funzione e sia  $P_0$  un punto di accumulazione per  $A$ , si dice che la funzione è continua in  $P_0$  se:

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$$

se  $P_0$  è un punto isolato per  $A$  per convenzione  $f$  è continua

### Definizione 7

Limite per coordinate polari:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) = l$$

ovvero che:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \sigma > 0$$

per ogni:

$$\underbrace{0 < \rho < \sigma}_{\rho \rightarrow 0^+}, \forall \theta \in (0, 2\pi)$$

si ha:

$$|f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) - l| < \varepsilon$$

### Definizione: Curva

Una curva è un'applicazione continua:

$$\varphi : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

per  $I = [a, b]$ :

$$\bar{\varphi}(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t)) \in \mathbb{R}^n$$

Le equazioni parametriche sono:

$\varphi =$

$$\begin{cases} x_1(t) = \varphi_1(t) \\ x_2(t) = \varphi_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) = \varphi_n(t) \end{cases}$$

### Definizione: Curva regolare

Una curva si dice regolare se l'applicazione  $\varphi$  è di classe  $C^1$  (le derivate prime sono continue) e  $\varphi'(t) \neq 0$

In particolare  $\varphi'(t) \neq 0$  significa che il vettore:

$$(\varphi'_1(t), \dots, \varphi'_n(t)) = \varphi'(t)$$

non ha mai tutte le componenti contemporaneamente nulle.

### Definizione 10

Si dice che  $f$  è differenziabile in  $\bar{x} \in A$  se  $f$  è derivabile in  $\bar{x}$  ed inoltre vale la seguente relazione:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + \bar{h}) - f(\bar{x}) - \langle \nabla f(\bar{x}), \bar{h} \rangle}{|\bar{h}|} = 0$$

dove  $\bar{h} \in \mathbb{R}^n$  e in particolare  $|\bar{h}| = \sqrt{\sum_{i=1}^n h_i^2}$ , inoltre:

$$\langle \nabla f(\bar{x}), \bar{h} \rangle = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x})h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(\bar{x})h_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x})h_n$$

Se  $f$  è differenziabile in ogni punto di  $A$  si dice che  $f$  è differenziabile in  $A$

### Definizione 11

Definisco  $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  (funzione lineare) è l'applicazione che ad  $\bar{h}$  associa il prodotto scalare:

$$\langle \nabla f(\bar{x}), \bar{h} \rangle$$

si chiama differenziale di  $f$  in  $\bar{x}$  e si indica con  $df(x)$  è un'applicazione lineare da  $\mathbb{R}^n$  in  $\mathbb{R}$  della variabile  $\bar{h}$

$$df(\bar{x})(\bar{h}) = \langle \nabla f(\bar{x}), \bar{h} \rangle$$

### Definizione 12

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  con  $A$  aperto,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione e sia  $x_0 \in A$ . Si dice che  $f$  è differenziabile in  $x_0$  se  $\exists L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  funzione lineare t.c.:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - L(h)}{|h|} = 0$$

dove  $L(h) = \langle \nabla f(x_0), h \rangle$

### Definizione: Derivate seconde

Se  $\exists$  sono della forma:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = f_{x_i x_j}$$

e si ottengono al variare di  $i, j$  da 1 ad  $n$ .

### Definizione: Matrice Hessiana

Attraverso le derivate seconde si ottiene una matrice  $n \times n$  che ha come elementi tutte le derivate seconde. Questa è chiamata matrice Hessiana, e si indica come:

$$Hf = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{x_1 x_1} & f_{x_1 x_2} & \cdots & f_{x_1 x_n} \\ f_{x_2 x_1} & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{x_n x_1} & \cdots & \cdots & f_{x_n x_n} \end{bmatrix}$$

### Definizione: Derivate Pure

Sono quelle che derivano per la stessa variabile (stanno sulla diagonale della matrice Hessiana):

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_i} = \frac{\partial^2 f}{(\partial x_i)^2}$$

#### Definizione: Derivate Miste

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$$

#### Definizione: Formula di Taylor con resto di Lagrange

Sia  $f \in \mathbb{C}^k(A)$ , scriviamo la formula di Taylor di ordine  $k - 1$  con **resto di Lagrange**

Osserviamo che  $F(0) = f(x)$ ,  $F(1) = f(x + h)$ . Esiste  $\theta \in (0, 1)$  tale che:

$$\begin{aligned} F(1) &= F(0) + F'(0)(1 - 0) + \frac{F''(0)}{2}(1 - 0)^2 + \dots + \frac{F^k(\theta)}{k!}(1 - 0)^k = \\ &= F(0) + F'(0) + \frac{F''(0)}{2} + \dots + \underbrace{\frac{F^k(\theta)}{k!}}_{\text{resto di Lagrange}} \end{aligned}$$

#### Definizione 18

$f \in \mathbb{C}^2(A)$ , stesse ipotesi di sopra. Allora:

$$f(x + h) = f(x) + \langle \nabla f(x), h \rangle + \frac{1}{2} \langle Hf(x) \cdot h, h \rangle + o(|h|)$$

#### Definizione: Resto di Peano in due variabili

Dati  $\bar{x} = (x_0, y_0)$ ,  $\bar{h} = (h, k)$ :

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) &= f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k + \\ &+ \frac{1}{2} \left[ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x}(x_0, y_0)h^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)hk + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y}(x_0, y_0)k^2 \right] + o(h^2 + k^2) \end{aligned}$$

Il pezzo tra parentesi quadre si verifica facendo i conti espliciti (prodotto scalare tra matrice per vettore e un vettore) considerando che  $f_{xy} = f_{yx}$  perché  $f \in \mathbb{C}^2$  (per il teorema di Schwarz).

#### Definizione: Massimo e minimo locale

$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $D$  dominio (cioè aperto insieme alla sua frontiera). Si dice che  $x_0 \in D$  è un punto di minimo locale se esiste un intorno sferico  $B(x_0, \sigma)$  tale che:

$$f(x_0) \leq f(x)$$

$$\forall x \in D \cap B(x_0, \sigma)$$

La definizione è analoga per il punto di massimo locale.

#### Definizione: Massimo/Minimo stretto

Il punto di minimo o massimo locale si dice stretto se la disuguaglianza è stretta.

#### Definizione: Massimo/Minimo globale

Se la disuguaglianza vale per tutto il dominio  $\forall x \in D$  e non solo per la palla

#### Definizione: Punti stazionari

I punti  $x_0 \in A$  tali che  $\nabla f(x_0) = 0$  si dicono **punti stazionari** (o **critici**).

#### Definizione: Sella

L'essere punto stazionario è condizione necessaria ma non sufficiente per essere punto di estremo: in una variabile un punto stazionario che non era un punto di estremo si diceva flesso, in più variabili si parla di **sella**.

#### Definizione 25

$q(\bar{h})$  si dice **definita positiva** se  $\forall h \neq 0$  si ha  $q(\bar{h}) > 0$



### Definizione 26

$q(\bar{h})$  si dice **definita negativa** se  $\forall h \neq 0$  si ha  $q(\bar{h}) < 0$

### Definizione 27

$q(\bar{h})$  si dice **indefinita** se  $\exists \bar{h}_1, \bar{h}_2 \in \mathbb{R}^2$  t.c.  $q(\bar{h}_1) < 0 < q(\bar{h}_2)$  cioè cambia segno

### Definizione: Somma inferiore

Definiamo somma inferiore di  $f$  rispetto a  $D$ :

$$s(f, D) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m_{ij} \cdot A_{ij}$$

cioè la somma dei parallelepipedi piccoli (vedi figura)

### Definizione: Somma superiore

Definiamo somma superiore di  $f$  rispetto a  $D$ :

$$S(f, D) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{ij} \cdot A_{ij}$$

cioè la somma dei parallelepipedi grandi (vedi figura)

### Definizione: Funzione integrabile secondo Riemann

Sia  $f : R = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$  limitata, si dice integrabile secondo Riemann se:

$$\sup s(f, D) = \inf S(f, D)$$

In tal caso il valore comune si dice **integrale** di  $f$  su  $R$  si indica in vari modi:

$$\int_R f$$

$$\iint_R f$$

$$I(f, R)$$

$$\iint_R f(x, y) dx dy$$

$$\int_b^a \int_d^c f(x, y) dx dy$$

### Definizione 31

$f$  è limitata su  $D \subset \mathbb{R}^2$  con  $D$  insieme limitato di  $\mathbb{R}^2$ .

Diciamo che  $f$  è integrabile (secondo Reimann) su  $D$ , se la  $\bar{f}$  è integrabile su  $R$  (secondo Reimann) e in tal caso si scrive:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_R \bar{f}(x, y) dx dy$$

### Definizione: Insieme numerabile (Peano-Jordan)

Un sottoinsieme limitato del piano  $D \subset \mathbb{R}^2$  si dice misurabile (secondo Peano-Jordan) se la funzione  $f(x, y) = 1$  è integrabile su  $D$

In tal caso poniamo:

$$Area(D) = \underbrace{|D|}_{\text{area}} = \iint 1 dx dy$$

e dunque ogni rettangolo  $R = [a, b] \times [c, d]$  è misurabile secondo Peano-Jordan:

$$|R| = \int_a^b \int_c^d 1 dx dy = (b - a)(d - c)$$

### Definizione: Vettore

Il vettore  $n \in \mathbb{R}^n$  è una n-pla  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

### Definizione: Norma

Il numero reale (non negativo)

$$|x| := \sqrt{x \bullet x} = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

si chiama **lunghezza** o **norma** del vettore

### Definizione: Disuguaglianza triangolare

La disuguaglianza triangolare si definisce come:

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

se  $|x + y| = |x| + |y| \rightarrow y = 0 \vee x = \lambda y$  con  $\lambda \geq 0$ :

### Definizione: Distanza Euclidea

Distanza Euclidea si definisce come  $d(x, y)$ :

$$d(x, y) := |x - y| = \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \geq 0$$

questa è la norma

### Definizione: Spazio metrico

Uno spazio metrico è un insieme  $X$  dotato di un'applicazione definita:  $X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  che verifica le proprietà sopra:

$$(\mathbb{R}^n, \underbrace{d}_{\text{distanza euclidea}}) \text{ spazio metrico}$$

esistono altre distanze che ci definiscono relative metriche equivalenti

### Definizione: Successione

Una successione è un elenco ordinato di numeri  $\{x_n\} \subset \mathbb{R}^n$  (gli elementi della successione sono elementi di  $\mathbb{R}^n$  ovvero n-ple di reali)

$$x_n = (x_n^1, x_n^2, \dots, x_n^n)$$

si dice che converge a  $x \in \mathbb{R}^n$  se:

$$d(x_n, x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

cioè:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \bar{N} \in \mathbb{N}$$

$$d(x_n, x) < \varepsilon, \forall n \geq \bar{N}$$

$$|x_n - x| = \sqrt{(x_n^1 - x^1)^2 + \dots + (x_n^n - x^n)^2}$$

### Definizione 39

Si definisce palla aperta, disco aperto, intorno sferico di centro  $x_0$  e raggio  $r$  l'insieme e che si indica con  $B(x_0, r)$  l'insieme:

$$B(x_0, r) := \{x \in \mathbb{R}^n, d(x, x_0) < r\} \subset \mathbb{R}^n$$

praticamente un intorno di  $x_0$  in  $\mathbb{R}^n$

### Definizione: Sottoinsieme limitato

$A \subset X$  si dice limitato se esiste una palla aperta in cui  $A$  risulta interamente contenuto:

$$\exists r > 0, \exists x_0 \in X \text{ t.c. } A \subset B(x_0, r)$$

### Definizione: Punto interno

Un punto di  $x_0 \in X$  si dice interno ad  $A$  dove  $A \subset X$  e non solo  $x_0 \in A$  ma esiste (almeno) un suo intorno sferico interamente contenuto in  $A$ :

$$\exists r > 0 \ B(x_0, r) \subset A$$

$\dot{A}$  insieme di punti interni ad  $A$

**Definizione: Punto esterno**

$x_0 \in X$  si dice esterno ad  $A$  ( $A \subset X$ ) se non solo  $x_0$  non appartiene ad  $A$  ma vi è almeno un suo intorno sferico completamente disgiunto ad  $A$

$$x_0 \in A \text{ e } \exists r > 0 \ B(x_0, r) \cap A = \emptyset$$

### **Definizione: Insieme aperto**

$A \subset X$  si dice aperto se  $A = \emptyset$  oppure se ogni punto è un punto interno di  $A$  (ovvero per ogni punto di  $A$  c'è un intorno sferico tutto contenuto in  $A$ )

### **Definizione: Insieme chiuso**

Un insieme  $C \subset X$  si chiuso se il suo complementare è un insieme aperto:

$$X \setminus C = A$$

### **Definizione: Punto di accumulazione**

Un punto  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  di accumulazione per  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  si dice punto di accumulazione se in ogni intorno circolare di  $x_0$  c'è almeno un punto di  $A$  diverso da  $x_0$

### **Definizione: Convergenza in $\mathbb{R}^n$**

Data una successione  $\{x_n\} \in \mathbb{R}^n$  questa si dice che converge a  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  se:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, x_0) = 0$$

questo equivale a dire  $\forall \varepsilon > 0, \exists \bar{N} \in \mathbb{N}$  e  $\forall n \geq \bar{N}$  si ha:

$$d(x_n, x_0) < \varepsilon$$

### **Definizione: Punto di accumulazione con limiti**

$x_0$  è di accumulazione per  $A \Leftrightarrow x_0$  è il limite di una successione di elementi di  $A$  tutti diversi da  $x_0$

### **Definizione: Chiusura di un insieme $A \subset \mathbb{R}^n$**

Si indica con  $\bar{A}$  è un sottoinsieme di  $\mathbb{R}^n$  dato dall'unione di  $A$  e dei suoi punti di accumulazione ( $DA$ )

$\bar{A}$  è un insieme chiuso. Lo si può pensare come l'intersezione dei chiusi contenenti  $A$ .

Si può inoltre dimostrare che:

$$\bar{A} = A \cup \delta A$$

### Definizione: Dominio

Un dominio  $D$  in  $\mathbb{R}^n$  è la chiusura di un insieme aperto:

$$D = \bar{A} = A \cup \delta A$$

### Definizione: Limite di funzioni in più variabili

Sia  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  un punto di accumulazione per  $A$

Si dice che  $f(\bar{x})$  tende (ha limite) a  $l$  per  $\bar{x}$  che tende a  $x_0$ :

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow x_0} f(\bar{x}) = l$$

scrivendolo tramite gli intorno: se  $\forall$  intorno  $U \subset \mathbb{R}$  di  $l$  esiste un intorno di  $x_0$  (sferico)  $I(x_0, r)$  con  $r > 0$

tale che  $f(\bar{x}) \in U \quad \forall \bar{x} \in \underbrace{I(x_0, r)}_{B(x_0, r)} \cap (A \setminus \{x_0\})$

L'altra definizione con i delta:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$$

tale che

$$\underbrace{|f(\bar{x}) - l|}_{d(f(\bar{x}), l) \in \mathbb{R}} < \varepsilon$$

$\forall \bar{x} \in A \setminus \{x_0\}$  con  $|\bar{x} - x_0| < \delta$