



# Trabajo Practico de Especificacion

## Especificacion y WP(Weakness Precondition)

14 de septiembre de 2024

Algoritmos y Estructuras de Datos 1

**pesutipolimardiano**

Integrante	LU	Correo electrónico
Nievas, Martin	453/24	tinnivas@gmail.com
Bercovich, Maximo	504/24	maximobercovich@gmail.com
Apellido, Nicolas	003/01	email3@dominio.com
Pomsztein, Andy	624/24	pomszteinandy@gmail.com



**Facultad de Ciencias Exactas y Naturales**  
Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (+54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

# 1. Enunciados

## 1.1. Especificacion

**1. grandesCiudades:** A partir de una lista de ciudades, devuelve aquellas que tienen más de 50.000 habitantes.  
**proc grandesCiudades** (in ciudades:  $\text{seq}\langle \text{Ciudad} \rangle$ ) :  $\text{seq}\langle \text{Ciudad} \rangle$

**2. sumaDeHabitantes:** Por cuestiones de planificación urbana, las ciudades registran sus habitantes mayores de edad por un lado y menores de edad por el otro. Dadas dos listas de ciudades del mismo largo con los mismos nombres, una con sus habitantes mayores y otra con sus habitantes menores, este procedimiento debe devolver una lista de ciudades con la cantidad total de sus habitantes.  
**proc sumaDeHabitantes** (in menoresDeCiudades:  $\text{seq}\langle \text{Ciudad} \rangle$ , in mayoresDeCiudades:  $\text{seq}\langle \text{Ciudad} \rangle$ ) :  $\text{seq}\langle \text{Ciudad} \rangle$

**3. hayCamino:** Un mapa de ciudades está conformado por ciudades y caminos que unen a algunas de ellas. A partir de este mapa, podemos definir las distancias entre ciudades como una matriz donde cada celda  $i, j$  representa la distancia entre la ciudad  $i$  y la ciudad  $j$  (Fig. 2). Una distancia de 0 equivale a no haber camino entre  $i$  y  $j$ . Notar que la distancia de una ciudad hacia sí misma es cero y la distancia entre A y B es la misma que entre B y A.

**proc hayCamino** (in distancias:  $\text{seq}\langle \text{seq}\langle \mathbb{Z} \rangle \rangle$ , in desde:  $\mathbb{Z}$ , in hasta:  $\mathbb{Z}$ ) : Bool

**4. cantidadCaminosNSaltos:** Dentro del contexto de redes informáticas, nos interesa contar la cantidad de “saltos” que realizan los paquetes de datos, donde un salto se define como pasar por un nodo. Así como definimos la matriz de distancias, podemos definir la matriz de conexión entre nodos, donde cada celda  $i, j$  tiene un 1 si hay un único camino a un salto de distancia entre el nodo  $i$  y el nodo  $j$ , y un 0 en caso contrario. En este caso, se trata de una matriz de conexión de orden  $n$ , ya que indica cuáles pares de nodos poseen 1 camino entre ellos a 1 salto de distancia. Dada la matriz de conexión de orden  $n$ , este procedimiento debe obtener aquella de orden  $n$  que indica cuántos caminos de  $n$  saltos hay entre los distintos nodos. Notar que la multiplicación de una matriz de conexión de orden 1 consigo misma nos da la matriz de conexión de orden 2, y así sucesivamente.

**proc cantidadNSaltos** (inout conexion:  $\text{seq}\langle \text{seq}\langle \mathbb{Z} \rangle \rangle$ , in n:  $\mathbb{Z}$ )

**5. caminoMínimo:** Dada una matriz de distancias, una ciudad de origen y una ciudad de destino, este procedimiento debe devolver la lista de ciudades que conforman el camino más corto entre ambas. En caso de no existir un camino, se debe devolver una lista vacía.

**proc caminoMinimo** (in origen:  $\mathbb{Z}$ , in destino:  $\mathbb{Z}$ , in distancias:  $\text{seq}\langle \text{seq}\langle \mathbb{Z} \rangle \rangle$ ) :  $\text{seq}\langle \mathbb{Z} \rangle$

## 1.2. WP (Weakest Precondition)

La funcion poblacionTotal recibe una lista de ciudades donde al menos una de ellas es grande (es decir, supera los 50.000 habitantes) y devuelve la cantidad total de habitantes. Dada la siguiente especificacion:

**proc poblacionTotal** (in ciudades :  $\text{seq}\langle \text{Ciudad} \rangle$ ) :  $\mathbb{Z}$   
 $\text{requiere } \{(\exists i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < |\text{ciudades}| \wedge_L \text{ciudades}[i].\text{habitantes} > 50,000 \wedge (\forall i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < |\text{ciudades}| \rightarrow_L \text{ciudades}[i].\text{habitantes} \geq 0) \wedge (\forall i, j : \mathbb{Z}) (0 \leq i < j \rightarrow_L \text{ciudades}[i].\text{nombre} \neq \text{ciudades}[j].\text{nombre}))\}$   
 $\text{asegura } \{res = \sum_{i=0}^{|\text{ciudades}|-1} \text{ciudades}[i].\text{habitantes}\}$

Con la siguiente implementacion:

```
1 | res := 0;  
2 | i := 0;  
3 | while (i < ciudades.lenght()) do  
4 |   res := res + ciudades[i].habitantes;  
5 |   i := i + 1  
6 | endwhile
```

- 1. Demostrar que la implementacion es correcta con respecto a la especificacion.
- 2. Demostrar que el valor devuelto es mayor a 50.000.

## 2. Predicados Reutilizables

**pred todosPositivos** (s :  $\text{seq}\langle \mathbb{Z} \rangle$ ) {

```

  ( $\forall i : \mathbb{Z}$ ) ( $0 \leq i < |s| \longrightarrow_L s[i] \geq 0$ )
}

pred distanciasValidas (distancias : seq⟨seq⟨ $\mathbb{Z}$ ⟩⟩) {
  ( $\forall i : \mathbb{Z}$ ) ( $0 \leq i < |distancias| \longrightarrow_L todosPositivos(distancias[i])$ )
}

pred diagonalEnCeros ( s : seq⟨seq⟨ $\mathbb{Z}$ ⟩⟩) {
  ( $\forall i, j : \mathbb{Z}$ ) ( $0 \leq i < |s| \wedge 0 \leq j < s[i] \wedge i = j \longrightarrow_L s[i][j] = 0$ )
}

pred esMatrizSimetrica ( s : seq⟨seq⟨ $\mathbb{Z}$ ⟩⟩) {
  ( $\forall i, j : \mathbb{Z}$ ) ( $0 \leq i < |s| \wedge 0 \leq j < |s[i]| \longrightarrow_L s[i][j] = s[j][i]$ )
}

pred esMatrizCuadrada ( s : seq⟨seq⟨ $\mathbb{Z}$ ⟩⟩) {
  ( $\forall i : \mathbb{Z}$ ) ( $0 \leq i < |s| \longrightarrow_L |s[i]| = |s|$ )
}

pred esCamino ( distancias : seq⟨seq⟨ $\mathbb{Z}$ ⟩⟩, c : seq⟨ $\mathbb{Z}$ ⟩, d :  $\mathbb{Z}$ , h :  $\mathbb{Z}$ ) {
  ( $esMatrizCuadrada(distancias) \wedge |c| \geq 2$ )  $\wedge_L$  ( $\forall e : \mathbb{Z}$ ) ( $e \in c \longrightarrow_L 0 \leq e < |distancias| \wedge (c[0] = d \wedge c[|c|-1] = h) \wedge (\forall i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < |c| - 1 \longrightarrow_L distancias[c[i]][c[i+1]] > 0)$ )
}

pred ciudadesValidas (ciudades : seq⟨Ciudad⟩) {
  ( $\forall i : \mathbb{Z}$ ) ( $0 \leq i < |ciudades| \longrightarrow ciudades[i].habitantes \geq 0$ )
}

```

### 3. Resolucion de Ejercicios

#### 3.1. Especificacion

**Ejercicio 1:**

```

proc grandesCiudades (in ciudades : seq⟨Ciudad⟩) : seq⟨Ciudad⟩
  requiere {ciudadesDistintas(ciudades)  $\wedge$  ciudadesValidas(ciudades)}
  asegura {|res| = cantidadCiudadesGrandes(ciudades)  $\wedge$  sonTodasCiudadesGrandes(res)  $\wedge$  ( $\forall c : Ciudad$ ) ( $c \in res \longrightarrow_L c \in ciudades$ )}

pred sonTodasCiudadesGrandes ( ciudades : seq⟨Ciudad⟩) {
  (( $\forall i : \mathbb{Z}$ ) ( $0 \leq i < |ciudades| \longrightarrow_L ciudades[i].habitantes > 50000$ ))
}

aux cantidadCiudadesGrandes ( ciudades : seq⟨Ciudad⟩) :  $\mathbb{Z} = \sum_{i=0}^{|s|-1} (\text{if } s[i].habitantes > 50000 \text{ then } 1 \text{ else } 0 \text{ fi})$ ;

```

**Ejercicio 2:**

```

proc sumaDeHabitantes (in menoresDeCiudades : seq⟨Ciudad⟩, in mayoresDeCiudad : seq⟨Ciudad⟩) : seq⟨Ciudad⟩

  requiere {|menoresDeCiudades| = |mayoresDeCiudades|  $\wedge$ 
    mismasCiudades(menoresDeCiudades, mayoresDeCiudades)  $\wedge$ 
    ciudadesDistintas(menoresDeCiudades)  $\wedge$  ciudadesDistintas(mayoresDeCiudades)  $\wedge$ 
    ciudadesValidas(menoresDeCiudades)  $\wedge$  ciudadesValidas(mayoresDeCiudades)}

  asegura {|res| = |menoresDeCiudades|  $\wedge$  esLaSuma(res, menoresDeCiudades, mayoresDeCiudades)  $\wedge$ 
    mismasCiudades(res, menoresDeCiudades)  $\wedge$  mismasCiudades(res, mayoresDeCiudades)}

pred mismasCiudades ( s : seq⟨Ciudad⟩, l : seq⟨Ciudad⟩) {
  ( $\forall i : \mathbb{Z}$ ) ( $0 \leq i < |s| \longrightarrow_L (\exists j : \mathbb{Z}) (0 \leq j < |l| \wedge_L s[i].nombre = l[j].nombre)$ )
}

```

```

}

pred esLaSuma ( res : seq⟨Ciudad⟩, s: seq⟨Ciudad⟩, l: seq⟨Ciudad⟩) {
  (∀i : ℤ) (0 ≤ i < |res| →L (∃j, k : ℤ) (0 ≤ j < |s| ∧ 0 ≤ k < |l| ∧L s[j].nombre = l[k].nombre ∧
    res[i].habitantes = s[j].habitantes + l[k].habitantes))
}

pred ciudadesDistintas ( ciudades : seq⟨Ciudad⟩) {
  (∀i : ℤ) (0 ≤ i < |ciudades| →L ¬(∃j : ℤ) (0 ≤ j < |ciudades| ∧ i ≠ j ∧L ciudades[i].nombre =
    ciudades[j].nombre))
}

```

### Ejercicio 3:

```

proc hayCamino (in distancias : seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, in desde : ℤ, in hasta : ℤ) : Bool
  requiere {esMatrizCuadrada(distancias) ∧ diagonalEnCeros(distancias) ∧ esMatrizSimetrica(distancias) ∧
    distanciasValidas(distancias) ∧ (0 ≤ desde < |distancias| ∧ 0 ≤ hasta < |distancias|)}
  asegura {res = true ↔ (∃c : seq⟨ℤ⟩) (esCamino(distancias, c, desde, hasta))}

```

### Ejercicio 4:

```

proc cantidadDeCaminosNSaltos (inout conexion : seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, n : ℤ)
  requiere {conexion = conexion0 ∧ esMatrizCuadrada(conexion) ∧ cerosEnLaDiagonal(conexion) ∧
    esMatrizSimetrica(conexion) ∧ esMatrizConCerosYUnos(conexion)}
  asegura {|conexion| = |conexion0| ∧L (∀i : ℤ) (0 ≤ i < |conexion0| →L |conexion[i]| = |conexion0| ∧
    esMatrizDeOrdenN(conexion, conexion0, n))}

pred esMatrizConCerosYUnos (conexion : seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩) {
  (∀i, j : ℤ) (0 ≤ i < |conexion| ∧ 0 ≤ j < |conexion[i]| →L (conexion[i][j] = 0 ∨ conexion[i][j] = 1))
}

pred esIdentidad (m : seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩) {
  (esMatrizCuadrada ∧L (∀i, j : ℤ) (0 ≤ i < |m| ∧ 0 ≤ j < |m[i]| →L ((i = j ∧ m[i][j] = 1) ∨ (i ≠ j ∧ m[i][j] =
    0))))
}

pred esProducto (m : seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, n : seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, o : seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, n : ℤ) {
  (∀i, j : ℤ) (0 ≤ i < |m| ∧ 0 ≤ j < |m[i]| →L m[i][j] = ∑k=0|n|-1 n[i][k] * o[k][j])
}

pred esMatrizDeOrdenN (s : seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, l : seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩) {
  (∃lista : seq⟨seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩⟩) ((|lista| = n + 1 ∧ esIdentidad(lista[0]) ∧ lista[1] = l ∧ lista[n] = s) ∧ (∀i : ℤ) (1 ≤
    i ≤ n →L (esProducto(lista[i], lista[i - 1], lista[1]))))
}

```

### Ejericio 5:

```

proc caminoMinimo (in origen : ℤ, in destino : ℤ, in distancias : seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩) : seq⟨ℤ⟩
  requiere {(diagonalEnCeros(distancias) ∧ esMatrizCuadrada(distancias) ∧ esMatrizSimetrica(distancias) ∧
    distanciasValidas(distancias) ∧ (0 ≤ origen < |distancias| ∧ 0 ≤ destino < |distancias|))}
  asegura {(esCamino(res) ∧L (∀c : seq⟨ℤ⟩) (esCamino(c) →L distanciaRecorrida(distancias, res) ≥
    distanciaRecorrida(distancias, c))) ∨ (res = []) ↔ ¬(∃c : seq⟨ℤ⟩) (esCamino(distancias, c, origen, destino))}

aux distanciaRecorrida (distancias : seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, c : seq⟨ℤ⟩) : ℤ = ∑i=0|c|-2 distancias[c[i]][c[i + 1]];

```

## 4. WP (Weakest Precondition)

### Primer item:

Para demostrar la correctitud de la implementación del programa con respecto a su especificación, debemos ver los siguientes puntos:

- 1. **Precondicion, guarda y postcondicion del ciclo**
- 2.  $P \longrightarrow P_c \iff P \longrightarrow \text{Wp}(\text{res} := 0; \text{Wp}(i := 0, P_c))$  (La precondición de la especificación implica la precondición del ciclo.)
- 3. **Correctitud parcial del ciclo**
- 4. **Terminación del ciclo**

### 4.1. Precondicion, guarda y postcondicion del ciclo

#### Precondicion del ciclo:

$P_c \equiv \{(P \wedge i = 0 \wedge \text{res} = 0)\}$  (Donde P es la precondicion de la especificacion).

#### Guarda del ciclo:

$B \equiv \{(i < |\text{ciudades}|)\}$

#### Postcondicion del ciclo:

$Q_c \equiv \{(\text{res} = \sum_{i=0}^{|\text{ciudades}|-1} \text{ciudades}[i].\text{habitantes})\}$

Una vez definido la precondicion, guarda y postcondicion ahora veamos si P (la precondicion de la especificacion) implica la  $P_c$  (la precondicion de ciclo) eso lo vamos a hacer calculando la  $\text{Wp}(\text{res} := 0; \text{Wp}(i := 0, P_c))$

### 4.2. $P \longrightarrow P_c$ .

#### Cálculo de la $\text{Wp}(\text{res} := 0; \text{Wp}(i := 0, P_c))$ :

llamemos ① a  $\text{Wp}(i := 0, P_c)$  y ②  $\text{Wp}(\text{res} := 0, \text{①})$  (utilizo el axioma 3)

#### Calculamos ①:

$\text{Wp}(i := 0, P_c) \equiv (\text{def}(i) \wedge_L P \wedge 0 = 0 \wedge \text{res} = 0) \equiv (P \wedge \text{true} \wedge \text{res} = 0) \equiv (P \wedge \text{res} = 0)$

Una vez calculado ① lo reemplazamos en ② y nos queda  $\text{Wp}(\text{res} := 0, P \wedge \text{res} = 0)$

#### Calculamos ②

$\text{Wp}(\text{res} := 0, P \wedge \text{res} = 0) \equiv (\text{def}(\text{res}) \wedge_L P \wedge 0 = 0) \equiv (P \wedge \text{true}) \equiv P$

Por lo tanto, como  $\text{Wp}(\text{res} := 0; \text{Wp}(i := 0, P_c)) \equiv P$ , podemos concluir que  $P \longrightarrow P_c$ . El siguiente paso en la demostración de correctitud consiste en verificar si el ciclo es parcialmente correcto. Para ello, aplicaremos el teorema del invariante, el cual nos permitirá demostrar que una propiedad invariante se mantiene a lo largo de cada iteración del ciclo, garantizando así la correctitud parcial.

### 4.3. Correctitud parcial del ciclo mediante teorema del invariante.

Para demostrar la correctitud parcial del ciclo necesitamos declarar el invariante, el cual explicado en palabras va a consistir en mantener a i en un rango adecuado para evitar la indefinición y que res sea la suma hasta cierto i

**Obs:** el invariante debe valer antes de cada iteracion y al finalizar cada iteracion.

#### Sea I el invariante definido de la siguiente manera:

$I \equiv (0 \leq i \leq |\text{ciudades}| \wedge \text{res} = \sum_{j=0}^{i-1} \text{ciudades}[j].\text{habitantes})$

Los siguientes axiomas son los que se deben corroborar para verificar que el ciclo es paracialmente correcto:

- ①.  $P_c \longrightarrow I$
- ②.  $\{I \wedge B\} S \{I\}$
- ③.  $\{I \wedge \neg B\} \longrightarrow Q_c$

①.  $P_c \longrightarrow I$  (La precondición del ciclo implica el invariante)

Entonces, tenemos que  $(P \wedge \text{res} = 0 \wedge i = 0) \longrightarrow (0 \leq i \leq |\text{ciudades}| \wedge \text{res} = \sum_{j=0}^{i-1} \text{ciudades}[j].\text{habitantes})$ . Como  $i = 0$ , se cumple que  $0 \leq i \leq |\text{ciudades}|$ . Además, como consecuencia,  $\text{res} = \sum_{j=0}^{0-1} \text{ciudades}[j].\text{habitantes} =$

$\sum_{j=0}^{-1} ciudades[j].habitantes = 0$ . Por lo tanto, queda demostrado que  $P_c \rightarrow I$ .

②.  $\{I \wedge B\} S \{I\} \leftrightarrow (\{I \wedge B\} \rightarrow Wp(S_c, I))$

Calculemos el  $Wp(S_c, I)$  (donde  $S_c$  es el cuerpo del ciclo). Por lo tanto, según el axioma 3, sería equivalente calcular  $Wp(res := res + ciudades[i].habitantes, Wp(i := i + 1, I))$ .

Llamemos  $\textcircled{A}$  a  $Wp(i := i + 1, I)$  y  $\textcircled{B}$  a  $Wp(res := res + ciudades[i].habitantes, \textcircled{A})$ .

**Cálculo de  $\textcircled{A}$ :**

$$Wp(i := i + 1, I) \equiv (def(i) \wedge (0 \leq i + 1 \leq |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{(i+1)-1} ciudades[j].habitantes)) \equiv (0 \leq i + 1 \leq |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^i ciudades[j].habitantes).$$

Una vez calculado  $\textcircled{A}$ , reemplazamos en  $\textcircled{B}$ , que queda de la siguiente manera:  $Wp(res := res + ciudades[i].habitantes, 0 \leq i + 1 \leq |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^i ciudades[j].habitantes)$ .

**Cálculo de  $\textcircled{B}$ :**

$$Wp(res := res + ciudades[i].habitantes, 0 \leq i + 1 \leq |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^i ciudades[j].habitantes) \equiv ((def(i) \wedge def(ciudades) \wedge 0 \leq i < |ciudades|) \wedge (0 \leq i + 1 \leq |ciudades| \wedge res + ciudades[i].habitantes = \sum_{j=0}^i ciudades[j].habitantes)).$$

Ahora, podemos comprimir el rango y restar  $ciudades[i].habitantes$  de la sumatoria, que sería el último término. Entonces, obtenemos:

$$Wp(res := res + ciudades[i].habitantes, \textcircled{A}) \equiv (0 \leq i < |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} ciudades[j].habitantes).$$

Ahora, veamos si  $\{I \wedge B\} \rightarrow Wp(S_c, I)$ . Donde  $\{I \wedge B\} \equiv (0 \leq i \leq |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} ciudades[j].habitantes \wedge i < |ciudades|)$ . Comprimimos el rango de  $i$  y obtenemos  $(0 \leq i < |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} ciudades[j].habitantes)$ . Como  $\{I \wedge B\} \equiv Wp(S_c, I)$ , entonces la implicación es válida y la tripla de Hoare es correcta.

③.  $\{I \wedge \neg B\} \rightarrow Q_c$

primero que nada definamos  $\{I \wedge \neg B\}$

$$\{I \wedge \neg B\} \equiv (0 \leq i \leq |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} ciudades[j].habitantes \wedge i \geq |ciudades|) \text{ (como } i \text{ es mayor o igual que la longitud de ciudades y menor o igual a la vez me queda lo siguiente)}$$

$$\equiv (i = |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{|ciudades|-1} ciudades[j].habitantes) \equiv Q_c$$

Por lo tanto queda desmstrado que  $\{I \wedge \neg B\} \rightarrow Q_c$  y como consecuencia el ciclo resulta parcialmente correcto. Ahora lo siguiente es verificar que el ciclo termina mediante el teorema de la terminacion.

#### 4.4. Terminación del ciclo (mediante el teorema de la terminación).

Para verificar que el ciclo concluye, debemos verificar los siguientes axiomas del teorema:

- ④.  $\{I \wedge B \wedge f_v = v_0\} S \{f_v < v_0\}$
- ⑤.  $\{I \wedge f_v \leq 0\} \rightarrow \neg B$

Aclaraciones:  $f_v$  es la función variante, la cual defino como  $f_v = (|ciudades| - i)$ . Dado que  $f_v$  debe ser una función decreciente y la longitud de ciudades es constante mientras que  $i$  crece con cada iteración, se trata de una función decreciente.

Para ejemplificar, supongamos que la lista de ciudades es  $ciudades = [(\text{"Buenos Aires"}, 60000), (\text{"Santa Rosa"}, 15000), (\text{"Rosario"}, 25000), (\text{"Jujuy"}, 20000)]$ . La siguiente tabla muestra una visualización de la evolución de los valores en cada iteración:

Cuando  $i = 4$ , la guarda  $B \equiv (i < |ciudades|)$  deja de cumplirse, y se sale del ciclo, lo que confirma que  $f_v \leq 0$ .

④.  $\{I \wedge B \wedge f_v = v_0\} S \{f_v < v_0\}$

Primero, definamos  $\{I \wedge B \wedge f_v = v_0\}$ :

$$\{I \wedge B \wedge f_v = v_0\} \equiv (0 \leq i \leq |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} ciudades[j].habitantes \wedge i < |ciudades| \wedge v_0 = |ciudades| - i)$$

Iteración	i	res	$f_v$
0	0	0	4
1	1	60000	3
2	2	75000	2
3	3	100000	1
4	4	120000	0

Tabla 1: Visualización de la evolución de los valores en cada iteración.

$$\equiv (0 \leq i < |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} ciudades[j].habitantes \wedge v_0 = |ciudades| - i)$$

(Se ha comprimido el rango de  $i$ ).

Para probar que la tripla de Hoare es válida:

(Se utiliza el axioma 3 de WP).

$$\{I \wedge B \wedge f_v = v_0\} \longrightarrow Wp(res := res + ciudades[i].habitantes, Wp(i := i + 1, |ciudades| - i < v_0))$$

Llamemos ① a  $Wp(i := i + 1, |ciudades| - i < v_0)$  y ② a  $Wp(res := res + ciudades[i].habitantes, ①)$ .

**Calculamos ①:**

$$Wp(i := i + 1, |ciudades| - i < v_0) \equiv (def(i) \wedge_L |ciudades| - (i + 1) < v_0) \equiv (|ciudades| - i - 1 < v_0)$$

Ahora, reemplazamos el valor calculado de ① en ② y obtenemos:

$$Wp(res := res + ciudades[i].habitantes, |ciudades| - i - 1 < v_0)$$

**Calculamos ②:**

$$Wp(res := res + ciudades[i].habitantes, |ciudades| - i - 1 < v_0) \equiv (def(i) \wedge def(res) \wedge def(ciudades) \wedge 0 \leq i < |ciudades| \wedge_L |ciudades| - i - 1 < v_0) \equiv (0 \leq i < |ciudades| \wedge |ciudades| - i - 1 < v_0)$$

Luego, verificamos si  $\{I \wedge B \wedge f_v = v_0\} \longrightarrow Wp(S_c, f_v < v_0)$ . Esto es claramente cierto, ya que  $v_0 = |ciudades| - i$  y sabemos que  $v_0 > |ciudades| - i - 1$ , lo que implica que  $|ciudades| - i > |ciudades| - i - 1$ , y por lo tanto la desigualdad  $(0 > -1)$  siempre es verdadera.

$$\textcircled{5}. \{I \wedge f_v \leq 0\} \longrightarrow \neg B$$

Primero definamos  $\{I \wedge f_v \leq 0\}$ :

$$\{I \wedge f_v \leq 0\} \equiv (0 \leq i \leq |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} ciudades[j].habitantes \wedge |ciudades| \leq i) \equiv (i = |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{|ciudades|-1} ciudades[j].habitantes)$$

Desarrollando la negación de la guarda:

$$\neg B \equiv (i \geq |ciudades|)$$

Entonces,  $(i = |ciudades|) \longrightarrow (i \geq |ciudades|)$ .

En conclusión, la correctitud de la implementación del programa ha sido demostrada mediante todo lo detallado anteriormente. Además, se ha comprobado que el ciclo es parcialmente correcto utilizando el teorema del invariante y que termina en una cantidad finita de pasos aplicando el teorema de la terminación.

**Segundo ítem:**

Como segundo punto, debemos demostrar que la suma de todos los habitantes es mayor a 50,000. Definimos  $P$  como la precondition requerida en la especificación y  $Q_0$  como la nueva postcondición:

$$P \equiv (\exists i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < |ciudades| \wedge_L ciudades[i].habitantes > 50,000 \wedge (\forall i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < |ciudades| \longrightarrow_L ciudades[i].habitantes \geq 0) \wedge (\forall i, j : \mathbb{Z}) (0 \leq i < j \longrightarrow_L ciudades[i].nombre \neq ciudades[j].nombre))$$

$$Q_0 \equiv (res = \sum_{i=0}^{|ciudades|-1} ciudades[i].habitantes \wedge res > 50,000)$$

Ahora, lo que tenemos que demostrar es que la tripla de Hoare es válida  $\{P\}S\{Q_0\}$ . Para eso, haremos la demostración inversa siguiendo los pasos indicados a continuación, utilizando lo demostrado en el punto anterior:

- ①  $Q_c \longrightarrow Q_0$
- ②  $\{I \wedge \neg B\} \longrightarrow Q_c$

- ③  $\{I \wedge B\}S\{I\}$
- ④  $P_c \longrightarrow I$
- ⑤  $P \longrightarrow P_c$

Comenzamos con ①. Definimos  $Q_c$  de la siguiente manera:

$$Q_c \equiv (res = \sum_{i=0}^{|ciudades|-1} ciudades[i].habitantes \wedge res > 50,000)$$

Es trivial que  $Q_c \longrightarrow Q_0$ , ya que ambas expresiones son equivalentes.

A continuación, debemos probar ②. Como modificamos  $Q_c$ , también debemos modificar el invariante para asegurarnos de que sigue cumpliéndose. Definimos entonces el nuevo invariante ( $I_n$ ) de la siguiente manera:

$$I_n \equiv (0 \leq i \leq |ciudades| \wedge_L res = \sum_{j=0}^{i-1} ciudades[j].habitantes \wedge (\exists k : \mathbb{Z}) (0 \leq k < |ciudades| \wedge_L ciudades[k].habitantes > 50,000) \wedge (\forall k : \mathbb{Z}) (0 \leq k < |ciudades| \longrightarrow_L ciudades[k].habitantes \geq 0))$$

Ahora, con el nuevo invariante, la demostración es casi trivial. Sabemos que  $\neg B \equiv (i \geq |ciudades|)$  sigue siendo la misma. Dado el rango de  $i$  en  $I_n$  y el rango de  $i$  en  $\neg B$ , podemos determinar que  $i = |ciudades|$ . Luego, la sumatoria queda como  $\sum_{j=0}^{|ciudades|-1} ciudades[j].habitantes$ , y como el invariante establece que existe al menos una ciudad con más de 50,000 habitantes, y el resto de las ciudades tiene 0 o más habitantes, se cumple  $Q_c$ .

El agregado al invariante ( $I_n$ ) no modifica la demostración de ③, por lo que sigue siendo válida.

En cuanto al punto ④, recordemos que  $P_c$  estaba definido de la siguiente manera:

$$P_c \equiv (P \wedge i = 0 \wedge res = 0) \text{ (donde } P \text{ es la precondition de la especificación).}$$

Lo que tenía el invariante anterior sigue siendo válido, como se demostró en el punto 2.1. Ahora debemos verificar si  $P_c$  implica lo que fue modificado.

Como  $P$  forma parte de  $P_c$ , es fácil ver que:

$$P_c \longrightarrow (\exists k : \mathbb{Z}) (0 \leq k < |ciudades| \wedge ciudades[k].habitantes > 50,000)$$

$$P_c \longrightarrow (\forall k : \mathbb{Z}) (0 \leq k < |ciudades| \longrightarrow_L ciudades[k].habitantes \geq 0)$$

Por último, en cuanto al punto ⑤, dado que ni  $P$  ni  $P_c$  se modificaron, sigue siendo válido, como se demostró en el ejercicio 2.1.

- ①  $Q_c \longrightarrow Q_0 \checkmark$
- ②  $\{I \wedge \neg B\} \longrightarrow Q_c \checkmark$
- ③  $\{I \wedge B\}S\{I\} \checkmark$
- ④  $P_c \longrightarrow I \checkmark$
- ⑤  $P \longrightarrow P_c \checkmark$

Con todo esto, podemos afirmar que la tripla de Hoare  $\{P\}S\{Q_0\}$  es válida, y queda demostrado que la suma de todos los habitantes es siempre mayor a 50,000.