

SCHEMA ALLERGOLOGICA - 診断書

Ambulatorio di Allergologia | Higashiyama-ku, Kyoto

PAZIENTE TANAKA Kazuo (田中一夫)	DATA DI NASCITA 8 marzo 1936 - 61 anni	CARTELLA N. HMC-1978-04825
DIAGNOSI Ipersensibilità ai salicilati (Tipo I)	DATA VALUTAZIONE 15 maggio 1997	MEDICO Dott. MORIMOTO Hiroshi (森本浩)

ANAMNESI

Allergia ai salicilati diagnosticata in età pediatrica (1944) in seguito a reazione orticarioide da aspirina. Episodio severo nel 1961 da contatto con prodotto topico a base di olio di wintergreen - ricovero con broncospasmo e edema laringeo iniziale. Ultimo episodio nel 1978 da contatto con cosmetico contenente acido salicilico (reazione moderata, trattamento ambulatoriale). Negli anni successivi: nessun episodio acuto grazie all'aderenza al protocollo di evitamento.

SOSTANZE E PRODOTTI DA EVITARE

FARMACI

- Aspirina (acido acetilsalicilico)
- Farmaci a base di salicilato di sodio
- Preparati topici con acido salicilico
- Unguenti e balsami con metil-salicilato
- Collutori con derivati salicilici

COSMETICI E PRODOTTI PER IL CORPO

- Creme e lozioni con acido salicilico
- Saponi o detergenti con wintergreen
- Prodotti antiacne (spesso a base salicilica)
- Dentifrici con olio di wintergreen
- Oli da massaggio con metil-salicilato

OLI ESSENZIALI E AROMI

- Olio di wintergreen (Gaultheria)
- Olio di betulla (contiene metil-salicilato)
- Incensi o profumi con wintergreen
- Potpourri e diffusori con derivati salicilici

ALIMENTI AD ALTO CONTENUTO DI SALICILATI

- Frutti di bosco (fragole, lamponi, mirtilli)
- Albicocche, ciliegie, arance, prugne
- Pomodori e concentrato di pomodoro
- Peperoni, olive, cetrioli sottaceto
- Mandorle, arachidi, pinoli
- Spezie: curry, curcuma, paprika, cannella
- Miele (contenuto variabile)
- Tè verde e tè nero
- Aceto di vino e mele
- Gomme da masticare alla menta

ALIMENTI GENERALMENTE TOLLERATI

- Riso, pasta, pane bianco
- Carne, pesce, uova, tofu
- Latte, formaggi freschi
- Patate, cavolo, lattuga
- Banana, pera pelata

TERAPIA IN CORSO

- Cetirizina 10 mg 1 compressa/die - ore 21:00 - uso continuativo
- Autoiniettore epinefrina 0,3 mg - uso d'emergenza - da portare sempre con sé
- Prednisone 25 mg Scorta d'emergenza - uso esclusivo su indicazione medica

NOTE CLINICHE

Il paziente presenta una sensibilizzazione progressiva documentata nell'arco di 35 anni. La soglia di reazione si è abbassata significativamente dai primi episodi. Si raccomanda la massima attenzione nell'evitare tutte le fonti di esposizione, incluse quelle ambientali e alimentari.

Si ricorda che il consumo di bevande alcoliche può influenzare la capacità dell'organismo di tollerare i salicilati. Si raccomanda moderazione.

In caso di reazione: somministrare immediatamente l'autoiniettore e chiamare il 119. Non attendere la progressione dei sintomi.

Prossimo controllo: novembre 1997.

Dott. MORIMOTO Hiroshi - 森本浩
Specialista in Allergologia - Reg. 京都府医 第4825号

ACQUISITO - Fascicolo 97-KPD-1114 - 14/11/1997