

Rua C-148, nº 854, Jardim América, Goiânia-GO Fone: (62) 3259 8010 Fax: (62) 3933 1762 www.hospitaljardimamerica.com.br hmja.lab@hmja.com.br

> LABORATÓRIO **ACREDITADO**

Paciente : MARZO BENTO DE SOUZA Médico : DOUGLAS VALIATI BRIDI

: AMERICA PLANOS

: 05/09/2017 15:00 Impressão: 06/09/2017 10:23:00

DN: 01/09/1972 / 45a Página: 1 de 1 Protocolo: 1703.034.814-0

Licença Sanitária: 255392.

PERFIL LIPIDICO

Soro

Cadastro

Categoria

Colesterol 186 mg/dL Colesterol HDL 46 mg/dL 109 mg/dL Colesterol LDL Não-HDL-C 140 mg/dL 190 mg/dL **Triglicerides**

"A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas".

VALORES REFERENCIAIS E DE ALVO TERAPÊUTICO CONFORME AVALIAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR DO PERFIL LIPÍDICO PARA ADULTOS > 20 ANOS

Lípides	Com jejum (mg/dL)	Sem jejum (mg/dL)	Categoria referencial
Colesterol Total*	< 190	< 190	Desejável
HDL	> 40	> 40	Desejável
Triglicerides**	< 150	< 175	Desejável
			Categoria de Risco
	< 130	< 130	Baixo
LDL	< 100	< 100	Intermediário
	< 7 0	< 7 0	Alto
	< 50	< 50	Muito alto
	< 160	< 160	Baixo
Não-HDL	< 130	< 130	Intermediário
	< 100	< 100	Alto
	< 80	< 80	Muito alto

^{*}CT > 310 mg/dL há probabilidade de Hipercolesterolemia Familiar (Europen Heart Journal, doi:10.1093/eurheartj/eht273).

TG com jejum de 12h e será considerado um novo exame de triglicérides pelo laboratório clínico. VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS DO PEREIL LIPÍDICO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES < 20 anos

VALORES REI ERENCIAIS DESENAVEIS DO FERT IL EIFIDICO FARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 120 altos			
Lípides	Com jejum (mg/dL)	Sem jejum (mg/dL)	
Colesterol Total*	< 170	< 170	
HDL	> 45	> 45	
Triglicerides (0-9anos)**	< 75	< 85	
Triglicerides (10-19anos)**	< 90	< 100	
LDL	< 110	< 110	

^{*} CT > 230 mg/dL há probabilidade de Hipercolesterolemia Familiar (Europen Heart Journal, doi:10.1093/eurheartj/eht273). HDL Não Colesterol o consenso não define valor de referência.

Nota: LDL calculado a partir da Fórmula de Martin.

Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico divulgado em novembro de 2016.

Método : Bioquímica enzimática automatizada.

Coleta: 05/09/2017 15:07 Liberação: 05/09/2017 17:00

Laudo assinado digitalmente por: Dr. DANILO CÉSAR RETUCCI RODRIGUES. CRBM 2639

Nº: 3569101005EF82B06656E18004A

^{**}Quando os níveis de triglicérides estiverem acima de 440 mg/dL (sem jejum), o médico fará outra prescrição d e

^{**} Quando os niveis de triglicerides estiverem acima de 440 mg/dL (sem jejum) o médico solicitante fará outra prescrição para a avaliação de TG com jejum de 12 h e será considerado um novo exame de triglicerides pelo laboratorio clinico.