

In questa nota sono raccolti alcuni dei risultati proposti durante le lezioni di questo anno accademico riguardo allo studio dei sistemi lineari omogenei su un campo  $K$ .

Sia  $\Sigma_O : AX = \mathbf{0}$  un sistema lineare omogeneo di  $m$  equazioni in  $n$  incognite su un campo  $K$  e sia  $\mathcal{S}_O$  l'insieme delle sue soluzioni.

**Proposizione.** *L'insieme  $\mathcal{S}_O$  è un sottospazio vettoriale dello spazio vettoriale numerico  $K^n$ .*

*Dim.* Si osservi prima di tutto che l'insieme  $\mathcal{S}_O$  non è vuoto perché contiene il vettore nullo  $(0, \dots, 0)$ . Siano  $(z_1, \dots, z_n)$  e  $(y_1, \dots, y_n) \in \mathcal{S}_O$  due soluzioni di  $\Sigma_O$ . Vediamo che la loro somma è una soluzione di  $\Sigma_O$ . Infatti, ricordando che il prodotto righe per colonne gode della proprietà distributiva rispetto all'addizione, si ha

$$A \left( \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right) = A \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} + A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Sia  $\alpha \in K$  uno scalare. Posto  $A = (a_j^i)$ , vediamo che  $\alpha(z_1, \dots, z_n)$  è una soluzione di  $\Sigma_O$ , usando le proprietà della moltiplicazione esterna di uno scalare per una matrice:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a_1^1 & a_2^1 & \dots & a_n^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^m & a_2^m & \dots & a_n^m \end{pmatrix} \left( \alpha \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \right) &= \begin{pmatrix} a_1^1 & a_2^1 & \dots & a_n^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^m & a_2^m & \dots & a_n^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha z_1 \\ \vdots \\ \alpha z_n \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} a_1^1(\alpha z_1) + a_2^1(\alpha z_2) + \dots + a_n^1(\alpha z_n) \\ a_1^2(\alpha z_1) + a_2^2(\alpha z_2) + \dots + a_n^2(\alpha z_n) \\ \vdots \\ a_1^m(\alpha z_1) + a_2^m(\alpha z_2) + \dots + a_n^m(\alpha z_n) \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} a_1^1 z_1 + a_2^1 z_2 + \dots + a_n^1 z_n \\ a_1^2 z_1 + a_2^2 z_2 + \dots + a_n^2 z_n \\ \vdots \\ a_1^m z_1 + a_2^m z_2 + \dots + a_n^m z_n \end{pmatrix} = \alpha \mathbf{0} = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

**Proposizione.** *Sia  $W \subseteq K^n$  un sottospazio vettoriale dello spazio vettoriale numerico di dimensione  $n$  sul campo  $K$ . Esiste un sistema  $\Sigma_O$  di equazioni lineari omogenee in  $n$  incognite su  $K$  tale che il suo insieme delle soluzioni  $\mathcal{S}_O$  coincide con  $W$ .*

*Dim.* Sia  $\mathcal{B} = \{w_1, \dots, w_h\}$  una base di  $W$ , con  $w_1 = (a_1^1, a_2^1, \dots, a_n^1)$ ,  $\dots$ ,  $w_h = (a_h^1, a_h^2, \dots, a_h^n)$ , per cui  $W$  è la chiusura lineare  $\mathcal{L}(\mathcal{B}) = \mathcal{L}(w_1, \dots, w_h)$  dei vettori di  $\mathcal{B}$ . Allora, un vettore  $u = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  di  $K^n$  appartiene a  $W$  se e solo se si può esprimere come combinazione lineare dei vettori della base  $\mathcal{B}$ , ossia

$$u \in W \Leftrightarrow \text{rango} \begin{pmatrix} a_1^1 & \dots & a_h^1 & x_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1^n & \dots & a_h^n & x_n \end{pmatrix} = \dim(W) = h.$$

Riducendo a gradini si ottiene una matrice del seguente tipo

$$\begin{pmatrix} p_1^1 & \dots & p_h^1 & b_1^1 x_1 + \dots + b_n^1 x_n \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & p_h^h & b_1^h x_1 + \dots + b_n^h x_n \\ 0 & \dots & 0 & b_1^{h+1} x_1 + \dots + b_n^{h+1} x_n \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & b_1^n x_1 + \dots + b_n^n x_n \end{pmatrix},$$

dove gli elementi  $p_i^i$  sono non nulli, per ogni  $i \in \{1, \dots, h\}$ , in quanto il sottospazio vettoriale  $W$  ha dimensione  $h$ . Inoltre la matrice deve avere rango  $h$  e questo accade se e solo se

$$\begin{cases} b_1^{h+1}x_1 + \dots + b_n^{h+1}x_n = 0 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \vdots \\ b_1^n x_1 + \dots + b_n^n x_n = 0 \end{cases}$$

**Esempio.** Si consideri il sottospazio vettoriale  $W = \mathcal{L}((2, -1, 1, 0, 1), (4, 1, 2, 2, 1))$  di  $\mathbb{R}^5$ . Riduciamo a gradini la seguente matrice:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & x_1 \\ -1 & 1 & x_2 \\ 1 & 2 & x_3 \\ 0 & 2 & x_4 \\ 1 & 1 & x_5 \end{pmatrix}$$

ottenendo:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & x_1 \\ 0 & 3 & x_2 + \frac{1}{2}x_1 \\ 0 & 0 & x_3 - \frac{1}{2}x_1 \\ 0 & 2 & x_4 \\ 0 & -1 & x_5 - \frac{1}{2}x_1 \end{pmatrix}$$

e poi

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & x_1 \\ 0 & 3 & x_2 + \frac{1}{2}x_1 \\ 0 & 0 & x_3 - \frac{1}{2}x_1 \\ 0 & 0 & x_4 - \frac{2}{3}(x_2 + \frac{1}{2}x_1) \\ 0 & 0 & x_5 - \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{3}(x_2 + \frac{1}{2}x_1) \end{pmatrix}.$$

Quindi,  $W$  coincide con l'insieme delle soluzioni del seguente sistema lineare omogeneo:

$$\begin{cases} x_3 - \frac{1}{2}x_1 = 0 \\ x_4 - \frac{2}{3}(x_2 + \frac{1}{2}x_1) = 0 \\ x_5 - \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{3}(x_2 + \frac{1}{2}x_1) = 0 \end{cases}$$