

BOYUN ÖN -YAN BÖLGELERİ
ve
PLEXUS CERVICALIS ANATOMİSİ


Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Tüm hakları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD'na aittir. Kopyalanamaz. Çoğaltılamaz



DERİ
DERİ ALTI TABAKA
Fascia superficialis=
Yağ tabakası
Platysma


Yağ tabakası kaldırılmış
platysma
platysma



Sol tarafta platysma kaldırılmış…M. sternocleidomastoideus görünür durumda

BOYUN SAĞ TARAFI



V. jugularis externa


Platysma altında,
scm'nin üzerinde

M. sternocleidomastoideus

Clavicula

BOYUN SOL TARAFI


Vena jugularis externa
(cilt altı yerleşimlidir)
m. sternocleidomastoideus'un üzerinde olmasına *dikkat edin*



BOYUN SAĞ TARAFI

Boyun bölgesinde bulunan sinirler;
Bu bölgede bulunan ve yüzey anatomisi bilinmesi gereken sinirler;

1) **Plexus cervicalis;**
a. Duyu dalları; (n. auricularis magnus, n. occipitalis minor, n. cervicalis transversus ve nn. supraclaviculares)
b. Motor ve duyu dalı (n. phrenicus; diaframa motor ve duyu, perikarda, pleuraya duyu innervasyonu)
2) Plexus brachialis kökleri
3) N. accesorius




Erb noktası= punctum nervosum= Plexus cervicalis kaynaklı duyu (sensitif)sinirlerinin

SCM arkasından çıkış noktası (sinir noktası).

BOYUN SAĞ TARAF

v. jugularis externa

(scm kasının yüzeyelinde yer alır)



v. jugularis interna


***Boynun alt bölümlerinde SCM'nin altında**, carotid arterin lateralinde seyreder*


BOYUN KASLARI

HYOID ÜSTÜ *KAS BÖLGESİ*


Os hyoideum


HYOID ALTI *KAS BÖLGESİ*





Os hyoideum
M. omohyoideus
venter superior
M. sternohyoideus
M. sternocleidomastoideus
V. jugularis anterior

HYOID ALTI KASLAR




Gl. submandibularis
M. omohyoideus
venter superior
Cartilago thyroidea
M. sternohyoideus
M. sternocleidomastoideus
M. sternothyroideus




Sol boyun yarımında
m. sternohyoideus kaldırılmış.
Kasın altında iki farklı hyoid altı kas yerleşir.
M. sternothyroideus *ve*
M. thyrohyoideus


M. thyrohyoideus

M. sternothyroideus


M. OMOHYOIDEUS





M. mylohyoideus
M. digastricus
venter anterior
M. omohyoideus
venter superior
M. omohyoideus
venter inferior


M. digastricus venter anterior
M. mylohyoideus
Gl. parotidea
Gl. submandibularis
A. carotis communis dextra
M. sternoclaidomatoideus (SOLDA KESİLMİŞ)

BOYUN SAĞ TARAFI




BOYUN SAĞ TARAF



SOL TARAF

BOYUN DAMAR SİNİR PAKETİ



BOYUN DAMAR SİNİR PAKETİ



A. Carotis EXTERNA

A. Carotis INTERNA

ARTER (A. carotis COMMUNIS)

SİNİR (N. VAGUS)

VEN (V. JUGULARIS INTERNA)


m. omohyoideus


m. omohyoideus, venter superior
m. scalenus anterior
n. phrenicus
m. scalenus anterior üzerindeki seyri önemlidir


n. phrenicus
m. scalenus anterior üzerindeki seyri önemlidir
m. scalenus anterior

m. scalenus anterior


Vena subclavia m. scalenus anterior'un önünde (daha yüzeyel yerleşimli)
Arteria subclavia m. scalenus anterior'un arkasında (daha derin yerleşimli)




*Skalenus anterior kasının **<u>arkasında kalan</u>** önemli yapılar…..*



KADAVRAYI GÖRDÜĞÜNÜZ AÇI




M. scalenus anterior.
M. scalenus MEDİUS



1: A. carotis communis
2: N. vagus
3: V. jugularis interna

M. Sternocleidomastoideus kesilerek kaldırılmış

m. omohyoideus
(damar sinir paketi oluşumlarının üzerinde yer alır)


M. scalenus anterior arkasında ***<u>plexus brachialis kökleri</u>***

m. scalenus anterior

BOYUN SİNİR YAPILARI

n. hypoglossus








N. VAGUS

<u>plexus brachialis kökleri</u>


n. hypoglossus


A. Carotis externa
(Damarın dallar verdiğine dikkat)
A. Carotis interna

A. CAROTIS COMMUNIS
-A. CAROTIS EXTERNA
-A. CAROTIS INTERNA



a. carotis externa'nın boyunda pek çok dal verdiğine dikkat edin. (küçük kırmızı oklar)
Bu dalları mutlaka bilin


<u>A. subclavia'nın tüm dallarını teorik olarak</u> mutlaka bilin.


Kadavra ve modellerde
a. subclavia'nın dallarını
farklı nedenler
(derin oluşumlar ulaşılamamıştır,
kopmuştur vs vs ile görmek
her zaman mümkün değildir?



BOYUN SOL TARAF

A. CAROTİS COMMUNIS (PERİFERİK NABIZ TAKİBİ YAPILIR)









KONTROL LİSTESİ

• BÖLGE KASLARI

- M. platysma
- M. sternocleidomastoideus
- M. sternohyoideus
- M. omohyoideus
- M. sternothyroideus
- M. thyrohyoideus
- M. digastricus venter anterior
- M. mylohyoideus
- M. digastricus venter posterior
- M. stylohyoid
- M. scalenus anterior
- M. scalenus medius
- M. scalenus posterior

• BÖLGE BEZLERİ

- Glandula submandibularis
- Glandula thyroidea
- Glandula parotidea

• BÖLGE ARTERLERİ

- A. carotis communis
- A. carotis interna
- A. carotis externa
- A. thyroidea superior
- A. laryngea superior*
- A. lingualis
- A. facialis
- A. pharyngea ascendens*
- A. subclavia
- A. vertebralis
- A. truncus thyrocervicalis*
- A. thyroidea inferior

• BÖLGE VENLERİ

- V. jugularis externa
- V. jugularis anterior
- V. jugularis interna
- V. thyroidea superior
- V. subclavia
- V. thyroidea inferior
- V. lingualis

• BÖLGE SİNİRLERİ

- *Plexus cervicalis*
- N. auricularis magnus
- N. transversus colli
- N. supraclavicularis
- N. occipitalis minor
- Ansa cervicalis (C1-C3)*

- *Kranial Sinirler*
- N. accessorius (XI)
- N. hypoglossus (CN XII)
- N. vagus (X)

• DİĞER OLUŞUMLAR

- Trigonum cervicale anterius
- Trigonum cervicale posterius

*: Bu yapıları kadavralarda net olarak göremeyebilirsiniz.