

**Name: Chen Chen**  
**UID: 004710308**  
**Dis 2A**

8

4.1

21

$$\begin{bmatrix} t^2 & t|t| \\ 2t & 2|t| \end{bmatrix} = 2|t|t^2 - 2tt|t| = 0$$

So, it is linear dependent.

14

22

$$\begin{bmatrix} e^t & e^{-3t} \\ e^t & -3e^{-3t} \end{bmatrix} = -4e^{-2t}$$

$$y(0) = 1 = C_1e^0 + C_2e^{-3 \times 0} = C_1 + C_2 = 1$$

$$y'(0) = -2 = C_1e^0 - C_23e^{-3 \times 0} = C_1 - (-3)C_2$$

$$C_1 = \frac{1}{4}, C_2 = \frac{3}{4}$$

16

$$\lambda^2 + 2\lambda + 3 = 0$$

$$\lambda = -1 \pm \sqrt{2}i$$

$$y(t) = e^{-t}(C_1 \cos \sqrt{2}t + C_2 \sin \sqrt{2}t)$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$$

$$\lambda = -1 \pm i$$

$$y(t) = e^{-t}(C_1 \cos t + C_2 \sin t)$$

27

$$y_2(t) = y_1(t)x = xt$$

$$(xt)' = x't + x, (x't + x)' = x''t + 2x'$$

$$t^2(x''t + 2x') - 2t(x't + x) + 2xt = 0$$

$$\Rightarrow t^3x'' = 0 \Rightarrow x'' = 0 \Rightarrow x = t \Rightarrow y_2(t) = t^2$$

$$t^2(2) - 2t(2t) + 2t^2 = 0$$

$$y = C_1t + C_2t^2$$

4.3

6

$$6\lambda^2 + \lambda - 1 = 0 = (3\lambda - 1)(2\lambda + 1)$$

$$\lambda_1 = \frac{1}{3}, \lambda_2 = -\frac{1}{2}$$

$$y(t) = C_1e^{\frac{1}{3}} + C_2e^{-\frac{1}{2}}$$