

सजीवों का वर्गीकरण (Classification of Living Organism)

सजीवों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है-

- (1) जन्तु जगत
- (2) पादप जगत

जन्तु जगत का वर्गीकरण (Classification of Animal Kingdom) :-

इसके जन्मदाता (Father of Taxonomy) 'लीनियस' हैं। इन्होंने द्वि-नाम पद्धति (binomial nomenclature) स्थापित की, जिसमें किसी प्राणी को उसके (Generic) नाम तथा स्पेसिज (species) नाम से सम्बोधित किया जाता है।

जैसे-


मनुष्य (Human) - 'होमोसेपियन' (**Homosapien**)

मेढक (Frog) - रानाटेग्रिना (**Rana tigrina**)

हाथी (Elephant) - एलीफस इंडिकस (**Elephas indicus**)

आम (Mango) - मैंगीफेरा इण्डिका (**Magnifera indica**)

मटर (Pea)- पाइजम सेटाइवम (**Pisum sativum**)



Anemia (रूनीमा) → जन्तुओं का लाल रक्त
जिनमें (Red blood) का अभाव रहता है।

Endemia (रूनीमा) → जिनमें लाल रक्त
उपस्थित होता है।

★

जरायुज (viviparous) → वच्य जन्म
 देने वाला जन्तुओं की जरायुज
 उपलब्ध में रहता है।

★

अण्डयुज (Oviparous) → अण्ड देने वाला
 जन्तुओं की अण्डयुज उपलब्ध में रहता है।

Father of Modern Taxonomy

Carolus Linnaeus

કેરોલસ લિનિયસ

આવ્યુનિટ

વર્ગીકરણ
કે પેન્ડા

Systema Naturae book →

કેરોલસ લિનિયસ →

¹ પ્રાણી જગત્ ² ઓ ¹ દો ³ અજન્તુ જગત્
 ૩ વિચારિણ ક્રિયા ગયા હો

(1) Protoista (પ્રોટિસ્ટા)

(2) Metazoa (મેટાઝોઆ)

'Goldfuss' — protozoa word first used

Protozoa :-

Amoeba,

Entamoeba histolytica

Entamoeba gingivalis


Trypanosoma gambiense

Leishmania donovani

Paramecium

Plasmodium

- अमीबा' (Amoeba) कभी न मरने वाला(Immortal) जन्तु है।
- यूग्लीन (Euglena) ऐसा सजीव है जिसमें जन्तु (animal) एवं पादप (Plant) दोनों के गुण पाये जाते हैं। इसके अन्दर क्लोरोफिल (chlorophyll) पाया जाता है जो कि एक पादप का लक्षण है।



सम्पूर्ण जन्तु जगत (Animal Kingdom) को 2 उप-जगतों में विभाजित किया गया है।:-

1. 'प्रोटोजोआ' (Protozoa-एक कोशिकीय) तथा
2. 'मेटाजोआ' (Metazoa- बहुकोशिकीय)

प्रोटोजोआ के अन्तर्गत:-

- अमीबा/*Amoeba*
- पैरामिसियम/*Paramecium*
- एण्टअमीबा हिस्टोलिटिका /*Entamoeba hystolytica* (पेचिश Dysentery पैदा करता है)
- जिन्जीवालिस /*Gingivalis* (पायरिया पैदा करता है)
- प्लाज्मोडियम/*Plasmodium* (मलेरिया पैदा करता है)
- एण्टअमीबा कोलाइ/*Entamoeba Coli*
(हमारी आँत/intestine में अन्तः परजीवी/ *Endoparasites* के रूप में पाये जाते हैं तथा आंत्रीय/*Intestinal* जीवाणुओं/*bacteria* को मारने का काम एवं अपच्य/*undigested* भोजन को पचाने का कार्य करते हैं)

Metazoa
(मेटाजोआ)

मेरुरज्जु विहीन
(Non- Chordata)

1. पोरीफेरा (Porifera) Ex-Sponge/स्पंज
2. सीलेन्टरेटा (Coelentreta) Ex-Hydra/हाइड्रा
3. प्लेटीहेल्मिन्थीज (Platyhelminthes)
Ex-फीता कृमि/Tapeworms
4. एस्केल्मिन्थीज (Aschelminthes)
Ex-Ascaris/एस्केरिस
5. एनीलीडा (Annelida)
EX- Earthworm/केंचुआ, leech/जोंक
6. आर्थ्रोपोडा (Arthropoda) Ex-Mosquito/मच्छर, cockroach/काकरोच
7. मोलस्का (Molusca) Ex-Snail/घोंघा, Octopus/ऑक्टोपस
8. इकाइनोडर्मेटा (Echinodermata) Ex-तारा मछली/star fish

मेरुरज्जु युक्त
(Chordata)

1. मत्स्यवर्ग (Pisces) Ex-Fish/मछली
2. उभयचर (Amphibian) Ex-Frog/मेढ़क
3. सरीसृप (Reptile) Ex-Snake/सर्प
4. पक्षीवर्ग (Aves)
Ex-Pigeon/कबूतर, Peacock/मोर
5. स्तनधारी (Mammals)
Ex-whale/व्हेल


① पौरीफेरा (porifera) → बल नैप
लम्बी

जन्तु बहुकोशिकीय होते हैं।

इनमें उच्चक अनुपस्थित
होते हैं।

→ पूरे शरीर पर छोट-छोट
छिद्र पाये जाते हैं जिसे
ostia कहते हैं।

आन्तिका
(ostia)



पौरी करे

→ असममिति लक्षण होती है।
(unsymmetrical)

→ द्विकोशकी शरीर होती है।
Diploblastic

ए.ग. → प्लूटो
प्लूटो

Ectoderm
इक्टोडर्म

इन्डोडर्म

(Endoderm)


अणुजीय अवस्था

प्लूटो



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



नीहाकांड



बीद की हड्डी

↓ अरुणुकी
Chodates

नीहाकांड X — अरुणुकी



•••••
कोएलन्टेरा / नीडरिया →
(coelenterata) (nidaria)

→ इनमें उत्तक पाई जाती हैं।
(Tissue)

→ रेडियल सममिति पाई जाती है।
(Radial symmetry)

→ इनमें विशेष प्रकार के निहात्मक कोशिकाएँ
पाई जाती हैं।

→ नौसिंघास्ट काशिका इनमें (नौसिंघास्ट) (sensitivity) के लिए उत्तरदाई होती हैं।

→ Cnidoblast cells की सहायता से पकड़ते हैं।
अपने शिकार पकड़ पाते हैं।

Ex → जली फिश (आरलीया) एडमिलिया
हाइड्रा मुग्गा
लामुग्गी गीमान

●●●●●●●●
(प्लैटिहेल्मिन्थीज) → द्विलग्नमिति (Bilateral)
(Platyhelminthis)

उन्मूक के साथ अंग भी पाये जाते हैं।

इसमें विशेष प्रकार के उत्सर्जी
कोशिकाएँ पाये जाते हैं जिसे ज्वाला कोशिका
(Flame cell)

→ त्रिकोणी होते हैं।
(Triploblastic)

Ectoderm
Endoderm
Mesoderm

Class - Hydrozoa



Hydra




Rhizostoma



Metridium


Class - Scyphozoa



Obelia



Aurelia



Physalia



Pennatula

Class - Anthozoa

Fungia




६.७ (लेनरिया
 (Planaria)

(बड़े आकार के पुनरुद्भव)

(Regeneration)

की क्षमता होती है।

फीता कृमी (टिनीया)
 (Tape worm) (जालीयक)
 लिवर फ्लूक (liver fluke)



Aschelminths / Nematodes →

एस्केलमीन्थीस निमाटोड

- इनमें अंग तंत्र भी पाये जाते हैं।
- त्रिकांशकी होती हैं।

Triploblastic

- द्विलक्षमिति पाई जाती है।

Bilateral symmetry

- उत्सर्जी अंग (excretory organ) **रीनेट कोशिका (Renet cell)** | प्राचीनफ्रीडिया **प्रोतोनेफ्रीडिया (Protonephridia)** कहलाती हैं।



Ex. एस्केरीस (गोल कृमी)
(Ascaris)

एन्कालोस्टोमा
(Ancylostoma)

हुक कृमी
Hook worm

वाउचरिया
(Wucheria)

फाइलरिया कृमी

पराजीवी
(parasite)

Ascariasis

फाइलरिया

porotozo

लाल रक्त X

Nematoda

एनालिडा
(Annalida)

~~खरबू~~

पदतुआ

के शरीर में खंड पाये जाते हैं।
(segment)

इसमें कई प्रकार के तंत्र भी
उपस्थित होते हैं। (पाचन तंत्र,
परीलम्बण तंत्र,
नैत्रिक तंत्र)

~~2980~~ इनमें

लाल रक्त पाया जाता है।

इनके रक्त में हिमोग्लोबिन युक्त रहता है।

इन पशुओं का उत्सर्जन अंग → नेफ्रीडिया
(Nephridia)

इन पशुओं का उत्सर्जी पदार्थ → यूरिया

नीरिल → NH_3 (अमोनिया)
(यूरी जीव)





The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC




Phylum Nematoda








नीली



कृ-पुडा



कीट

PORIFERA पोरीफेरा	COELENTERATA सीलेन्टरेटा	PLATYHELMINTHES प्लेटीहेल्मिन्थेज	ASCHELMINTHES एस्केहेल्मिन्थीज	ANNELIDA एनीलीडा	ARTHROPODA आर्थ्रोपोडा	MOLUSCA मोलस्का	ECHINODERMATA इकाइनोडर्मटा
							
							 

परीफरा



No symmetry
(e.g. Porifera)

असममिति


नीडरीया



Radial symmetry
(e.g. Cnidaria)

रेडियल

आर्थापॉडा



Bilateral symmetry
(e.g. Arthropod)

द्विसममिति

