

केन्द्रक (Nucleus) -

खोज - : Robert Brown (1831)

- कोशिका का मुख्य भाग
- कोशिका विभाजन की क्रिया केन्द्रक में पूर्ण होती है
- केन्द्रक में DNA व RNA न्यूक्लिक अम्ल के रूप में उपस्थित होते हैं-

DNA

Deoxy Ribonucleic Acid



खोज - : फ्राइड्रिक मिशर

संरचना - : द्विकुण्डलित
(Double Helix)

↓
वाट्सन व क्रिक

→ आनुवांशिक पदार्थ

नाइट्रोजिनस क्षार
(Nitrogenous Base)



RNA



→ विषाणु आनुवांशिक पदार्थ
(Genetic Material Virus)

Ribonucleic Acid

खोज - : फ्राइड्रिक मिशर

संरचना - : एककुण्डलित
(Single Helix)

नाइट्रोजिनस क्षार
(Nitrogenous Base)



गाल्गी काय (Golgi Body)

खोज - : कैमिलो गाल्गी (Camilo Golgi)

- कोशिका का ट्रेफिक पुलिस कहते हैं।
- प्रोटीन पैक भी कहते हैं।
- कोशकीय स्त्रावण का कार्य करते हैं।
- शुक्राणु का एक्रोसोम, हर्मो स्त्रावण गाल्गी काय करते हैं।
- Mother of cell.

पादप कोशिका → Dictyosome (डिक्टीयोसोम)


राइबोसोम (Ribosome)

→ सबसे छोटे कोशिकांग (smallest cell organelles)

- प्रोटीन की फैक्ट्री (protein factory)

खोज (Discovery) - : पैलाडे (palade)

- दो प्रकार (Two Types)



कार्य (work) - :

Eukaryotic



प्रोटीन निर्माण
(protein formation)

अन्तःद्रव्य जालिका (Endoplasmic Reticulum)

खोज - : पोर्टर (porter)

- 2 प्रकार ⇒

कोमल (smooth) → राइबोसोम नहीं हैं
खुरदरी (Rough) → लिपिड संश्लेषण



लवक (plastid)

खोज - : हैकल (Haeckel) / Shimper

- केवल पादप कोशिका में उपस्थित
(present only in plant)

- रंग प्रदान करते हैं। (provide colour to the plant)

3 प्रकार $\rightarrow$ हरित लवक (Chloroplast)
 $\rightarrow$ क्रोमोप्लास्ट (वर्णिलवक)
 $\rightarrow$ अवर्णिलवक (Leukoplast)