



रुधिर (Blood)

- अध्ययन (study) :- Haematology
- मात्रा (Amount) :- 5-6 litre
- तरल संयोजी ऊतक (Liquid connective tissue)
- निर्माण (Formation) :- अस्थिमज्जा (Bone Marrow)





- भ्रूण रुधिर निर्माण (Fetus Blood Formation) :- यकृत (Liver)
- भ्रूणीय परत रुधिर निर्माण (Embryonic Layer Blood Formation) :-




निषेचन (fertilization)

युग्मनज (zygote)



- रुधिर का pH मान (value) :- 7.4 क्षारीय (alkaline)
- स्वाद (Taste) :- नमकीन (Salty) → (NaCl)
- कुल वजन का कितने % रुधिर होता है (% Blood) :- 7%

रुधिर के प्रमुख घटक (Components of Blood) → 100%



प्लाज्मा की प्रोटीन (Plasma Protein)

(सर्वाधिक) ↑ (नमक) → (1) एल्बुमीन (Albumin) → परासण दाब (Osmotic pressure) बनाती है।

Imp (2) ग्लोबुलीन (Globulin) → प्रतिरक्षा के समान कार्य (work as Antibody)

Imp (3) फाइब्रीनोजन (Fibrinogen) → रुधिर का थक्का जमाने में सहायक
(Help in Blood clotting)
→ [Hemostasis]

रुधिर स्कंदक कारक (Blood Clotting Factors)

(1) तत्व (Element) → Ca^{++} (कैल्शियम)

(2) विटामिन (vitamin) → K

(3) रुधिर कोशिका (Blood cells) → विम्बाणु (platelets)

(4) प्रोटीन (protein) → फाइब्रीनोजन (Fibrinogen)

NOTE मच्छर (Mosquito) (मादा) ⇒ सीरम एल्बुमीन (Serum Albumin)

→ अंडे को पोषण (Nutrition to Eggs)

→ plasma में % पानी (water) - 90-92%

→ plasma में % प्रोटीन (protein) - 7% (2-3% अन्य कार्बनिक पदार्थ)