

प्राकरीयातिक

(i) केंद्रक → विकीर्णित
(Nucleus) केंद्रक अनुपस्थित

(ii) झिल्ली → अनुपस्थित
युक्त
(कोशिकांग) होते हैं।

(iii) राइबोसोम → 70'S प्रकार
(Ribosome)

पु करीयातिक

उपस्थित होता है।

उपस्थित होते हैं।

70'S एवं 80'S
दोनों प्रकार के पाये जाते
हैं।

प्रौक्रीयातिक

(4) कोशिका → पॉलिडीग्लाइकन
मिति व म्यूकापोलीलकराइड
(cell wall) की बनी होती है।

(5) गुणसूत्र → 1 गुणसूत्र पाया
(chromosome) जाता है।


पुक्रीयातिक

जन्तु → अनुपस्थित
पादप → लेखलाप ले
बनी होती है।
कवक → कास्टीन ले बनी
होती है।
एक ले जीविक गुणसूत्र
हमेशा लग लैल्पा में
पाये जाते हैं।


प्रोकैरीयोटिक

यूकैरीयोटिक

(6) (प्लास्मिड) → उपस्थित होती हैं।



कोशिका




प्रोटोप्लाज्म - (वॉट - 5) निर्जिन
 नामकरण - पुरस्तीनी
 जीवन का भौतिक आधार
 स्वस्थ

●●●●●
कौशिका मित्रि → बॉवट हुक के द्वारा खोदी गई।
(cell wall) मृत होती है।

ये पादप कौशिका, कवक एवं लम्बी प्राकैरीयोटिक
कौशिकाओं की बाहरी परत को बनाती है।

कौशिका मित्रि पदार्थ कौशिका में अनुपस्थित होती है।

→ कौशिका मित्रि पूर्ण पारगम्य (वभाव की होती है।
(Fully permeable)



कौशिका मिति कौशिका निश्चित आकार व
कुरसा प्रदान करता है।

कौशिका झिल्ली → प्रोटीन व लिपिड के दौरे परत है
" (माज्जा झिल्ली) बनी होती है। (protein → 52 %
lipid → 48 %)

इसकी संरचना की विशेष रूप है
Singer व Nicolson के Fluid Mosaic Model
है मसला जा सकता है।



① इनमें से कौन एक कृषिशील जीव है ?

(a) नील हरित शैवाल

(b) चील

(c) हिरण

~~(d) a & b~~

Q(3) इनमें से कौन परजीवी है ?

(a) केपूडा

(b) चील

(c) जीवाणु

Q(2) जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। ~~(d) नमी~~

(a) 1

(b) 3

(c) 2

~~(d) 0~~