


वायुमंडल की संरचना (Structure of Atmosphere)


①. क्षोभमंडल :- औसत ऊंचाई
धरातल से 13 km है तथा अधिकतम
ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 km
तथा ध्रुवों पर 8 km मिलती है।
इस परत में ऊपर की ओर चलने
पर सामान्य ताप पतन दर 165 मी
की ऊंचाई 1°C प्राप्त होती है।



- क्षौभमंडल में समस्त मौसमी घटनाएं घटित होती हैं जैसे चक्रवात, ओलावृष्टि, कोहरा इत्यादि।
- इस भाग में समस्त वायुमंडलीय द्रव्यमान का 75% केन्द्रित होता है।

②. समतापमंडल (Stratosphere) :- इसकी औसत ऊंचाई क्षौभमंडल के ऊपर 50 km तक मिलती है। इस भाग में कोई भी मौसमी घटना घटित नहीं होती है अतः इस परत में वायुयान उड़ाए जाते हैं। इस भाग में ओजोन परत की उपस्थिति होती है।

- इस परत में पक्षी बादल मिलते हैं, जिन्हें 'मदर ऑफ पल्स क्लाउड' कहा जाता है।



③. मध्य मंडल :- इसकी औसत ऊंचाई समतापमंडल के ऊपर 80 km तक मिलती है।

→ इस परत में तापमान घटकर -100°C तक चला जाता है।

→ इसी भाग उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं।

→ इस मंडल की ऊपरी सीमा (मध्यसीमा/मैसोपॉज) सम्पूर्ण वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग है।

④. आयनमंडल :- इसकी ऊंचाई मध्यमंडल के ऊपर 400 km तक मिलती है।

→ इस मंडल विद्युत आवेशित कण मिलते हैं, जिन्हें आयन कहा जाता है।

→ इस मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं।

⑤. बहिर्मंडल (एक्सोस्फीयर) :- आयनमंडल के ऊपर सम्पूर्ण भाग आता है।

↳ अपग्रह स्थापित

↳ यहाँ अरौरा की घटना घटित होती है।

↳ रंग-विरंगा प्रकाश

↳ उत्तरी ध्रुव पर इस घटना को अरौरा बोरियालिस व
दक्षिणी ध्रुव पर अरौरा आस्ट्रेलिस कहा जाता है।

ओजोन परत :- रासायनिक सूत्र : O_3

- O_3 के विनाश व निर्माण का चक्र चैपमैन चक्र कहलाता है।
- समतापमंडल में प्राप्त (12 से 35 km की ऊंचाई पर)
- जीवन रक्षक छतरी
- सर्वाधिक घातक - क्लोरीन गैस
- मापन की इकाई - डॉब्सन मीटर
- 16 सित. 1987 को O_3 के संरक्षण हेतु CFC को मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया अतः 16 सितम्बर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है।

